

Zeitschrift: Bollettino della Società ticinese di scienze naturali
Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali
Band: 81 (1993)
Heft: 1

Artikel: Elenco attuale degli eterotteri del canton Ticino, Svizzera meridionale (Insecta: heteroptera)
Autor: Rezbanyai-Reser, Ladislaus
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1003355>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ELENCO ATTUALE DEGLI ETEROTTERI DEL CANTON TICINO, SVIZZERA MERIDIONALE (INSECTA: HETEROPTERA)

LADISLAUS REZBANYAI-RESER

Natur-Museum Luzern, Kasernenplatz 6, CH - 6003 Luzern

ZUSAMMENFASSUNG

Aktuelle Liste der Wanzen des Tessin, Südschweiz (Insecta: Heteroptera). Der Verfasser legt die aktuelle Liste der aus dem Tessin bekannten Heteropteren vor, und zwar vor allem aufgrund dreier Publikationen (SERVADEI 1967, GÖLLNER-SCHIEDING & REZBANYAI-RESER 1992 und OTTO 1992). Es wird angegeben, in welcher dieser drei Publikationen die einzelnen Arten aus dem Tessin erwähnt sind. Da die Tessiner Wanzenfauna noch sehr ungenügend erforscht ist, enthält diese erste Synthese lediglich 307 Arten. In System und Nomenklatur wird der neuesten Liste der Wanzen Mitteleuropas (GÜNTHER & SCHUSTER 1990) gefolgt, mit einigen Schreibkorrekturen und mit Nachträgen von einigen südlichen Arten. Für die Hilfe beim Zusammenstellen der Liste dankt der Verfasser der international bekannten Wanzenspezialistin, Frau Dr. Ursula GÖLLNER-SCHIEDING, Berlin.

Di recente sono stati pubblicati due lavori importanti che trattano della fauna di Eterotteri di alcune zone del Ticino (GÖLLNER-SCHIEDING & REZBANYAI-RESER 1992 e OTTO 1992). Poiché prima di queste date era stato pubblicato relativamente poco sulla fauna ticinese di Eterotteri (i dati precedenti sono in gran parte riassunti in SERVADEI 1967), questi due lavori hanno considerevolmente ampliato le nostre conoscenze in proposito (195 risp. 24 specie nuove per il Ticino!). Per questi motivi una prima sintesi è divenuta possibile ed anche necessaria.

La sistematica e la nomenclatura di questo elenco provvisorio delle specie ticinesi seguono il più recente elenco degli Eterotteri europei (GÜNTHER & SCHUSTER 1990) con poche correzioni ortografiche e con l'aggiunta di alcune specie meridionali. Per ciascuna specie viene indicato in quale delle 3 pubblicazioni è riportata una segnalazione per il Ticino.

Questo elenco, che comprende in totale 307 specie, è ovviamente ben lungi dall'essere completo. Sono dunque necessarie ulteriori indagini, che però sono già in corso da anni e quindi dobbiamo attenderci in un prossimo futuro la pubblicazione di nuovi dati.

Benché l'Autore, in qualità di entomologo professionista del Natur-Museum di Lucerna e di collaboratore volontario del Museo cantonale di storia naturale di Lugano, da oltre 10 anni raccolga intensivamente, soprattutto nella Svizzera centrale e meridionale, anche Eterotteri, non è però uno specialista di questo gruppo. Per l'aiuto nella compilazione di questo elenco, per consigli e per la revisione dell'elenco egli ringrazia perciò la signora dott. Ursula GÖLLNER-SCHIEDING, di Berlino, specialista di fama internazionale.

- S = SERVADEI 1967
 G = GÖLLNER-SCHIEDING & REZBANYAI-RESER 1992
 (M. Generoso: Vetta, Bellavista, Somazzo)
 O = OTTO 1992 (Bolle di Magadino)

NEPOMORPHA

Notonectoidea

NOTONECTIDAE

Notonectinae

- S Notonecta g. glauca LINNAEUS, 1758

GERROMORPHA

Gerroidea

VELIIDAE

Veliinae

- S Velia (Plesiovelia) currens (FABRICIUS, 1794)

GERRIDAE

- S Gerris (Aquarius) najas (DE GEER, 1773)
 S G. (Gerris) c. costae (HERRICH-SCHÄFFER, 1853)
 S G. (G.) lacustris (LINNAEUS, 1758)

LEPTOPODOMORPHA

Leptopodoidea

SALDIDAE

Saldinae

- G Saldula orthochila (FIEBER, 1859)
 O S. pallipes (FABRICIUS, 1794)

LEPTOPODIDAE

Leptopus marmoratus (GOEZE, 1778)

CIMICOMORPHA

Tingoidea

TINGIDAE

Tinginac

- G Dictyonota strichnocera FIEBER, 1844
 G O Kalama tricornis (SCHRANK, 1801)
 G Derephysia (D.) sinuatocollis PUTON 1879
 S Stephanitis pyri (FABRICIUS, 1775)
 G Corythucha ciliata (SAY, 1832)
 G O Lasiacantha c. capucina (GERMAR, 1836)
 G Tingis (Tingis) cardui (LINNAEUS, 1758)
 O T. (T.) crispata (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)
 S T. (Tropidocheila) ajugarum (FREY-GESSNER, 1872)
 G T. (T.) reticulata (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
 G Copium c. clavicorne (LINNAEUS, 1758)
 S O Physatocheila costata (FABRICIUS, 1794)
 S Ph. dumetorum (HERRICH-SCHÄFFER, 1838) (= confinis HORVATH, 1905)
 O Ocochila simplex (HERRICH-SCHÄFFER, 1830)
 G O Dictyla echii (SCHRANK, 1782)
 D. humuli (FABRICIUS, 1794)

Miroidea

MICROPHYSIDAE

- G Loricula elegantula (BÄRENSPRUNG, 1858)

MIRIDAE

Deraecocorinae

(Deraecocorini)

- G Deraecocoris (D.) annulipes (HERRICH-SCHÄFFER, 1842)
 G D. (D.) flavilinea (A. COSTA, 1860)
 G D. (D.) morio (BOHEMAN, 1852)
 G O D. (D.) ruber (LINNAEUS, 1758)
 G O D. (Knightocapsus) lutescens (SCHILLING, 1836)
 O D. (Camptobrochis) serenus DOUGLAS & SCOTT, 1868
 G O D. (C.) punctulatus (FALLEN, 1907)
 G Alloetomus germanicus E. WAGNER, 1939

- Bryocorinae**
- G Monalocoris f. filicis (LINNAEUS, 1758)
G Bryocoris pteridis (FALLEN, 1807)
- Dicyphinae**
- G Macrolophus caliginosus WAGNER, 1952
G M. glaucescens FIEBER, 1858
G Dicyphus (D.) errans (WOLFF, 1804)
G D. (D.) flavoviridis TAMANINI, 1949
G D. (D.) hyalinipennis (BURMEISTER, 1835)
G D. (Brachyceroea) globulifer (FALLEN, 1829)
G Campyloneura virgula (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
- Mirinae**
(Pithanini)
- O Pithanus maerkeli (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)
- (Stenodemini)**
- G O Leptopterna dolobrata (LINNAEUS, 1758)
O Teratocoris antennatus (BOHEMAN, 1852)
S G O Stenodema (Brachystira) calcaratum (FALLEN, 1807)
G S. (Stenodema) algoviense K.SCHMIDT, 1934
S G S. (S.) holsatum (FABRICIUS, 1787)
S G S. (S.) laevigatum (LINNAEUS, 1758)
G S. (S.) sericans (FIEBER, 1861)
S O S. (S.) virens (LINNAEUS, 1767)
G Notostira elongata (GEOFFROY, 1785)
G N. erratica (LINNAEUS, 1758)
S G O Megaloceroea recticornis (GEOFFROY, 1785) (= linearis FÜSSLY)
G Trigonotylus caelestialium (KIRKALDY, 1902)
G O T. ruficornis (GEOFFROY, 1785)
- (Mirini)**
- G Phytocoris (Stictophytocoris) meridionalis HERRICH-SCHÄFFER, 1835
G Ph. (Exophytocoris) parvulus minor KIRSCHBAUM, 1856
G Ph. (Phytocoris) dimidiatus KIRSCHBAUM, 1856
G Ph. (Ph.) intricatus FLOR, 1860
G O Ph. (Ph.) longipennis FLOR, 1860
G Ph. (Ph.) pini KIRSCHBAUM, 1856 (= pseudopini E.WAGN., 1952 pro parte)
G Ph. (Ph.) populi (LINNAEUS, 1758)
G Ph. (Ph.) reuteri SAUNDERS, 1875 (= pseudopini E.WAGN., 1952 pro parte)
G Ph. (Ph.) t. tiliae (FABRICIUS, 1776)
G Ph. (Ktenocoris) austriacus E.WAGNER, 1954
G Ph. (K.) italicus WAGNER, 1954
G Ph. (K.) ulmi (LINNAEUS, 1758)
G Ph. (K.) varipes (BOHEMAN, 1852)
G Pantilius tunicatus (FABRICIUS, 1781)
S Adelphocoris detritus (FIEBER, 1861)
G O A. lineolatus (GOEZE, 1778)
G A. reicheli (FIEBER, 1836)
S G O A. seticornis (FABRICIUS, 1775)
S O A. ticinensis (MEYER-DÜR, 1843)
G A. vandalicus (ROSSI, 1790)
S G Calocoris (Trichocalocoris) lineolatus (A.COSTA, 1852)
G C. (Rhabdomiris) striatellus (F., 1794) (= ochromelas GM., 1789 = quadrip. VILL., 1789)
G C. (Closterotomus) b. biclavatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
G C. (C.) fulvomaculatus (DE GEER, 1773)
G C. (Calocoris) alpestris (MEYER-DÜR, 1843)
G Miris striatus (LINNAEUS, 1758)
S G O Stenotus binotatus (FABRICIUS, 1794)
S Dichrooscytus valesianus (FIEBER, 1861)
G O Lygocoris (Lygocoris) pabulinus (LINNAEUS, 1761)
G L. (Neolygus) contaminatus (FALLEN, 1829)
G L. (N.) viridis (FALLEN, 1807)
O L. (Apolygus) rhamnocola (REUTER, 1885)
G O L. (A.) spinolae (MEYER-DÜR, 1841)

- G Lygus adpersus (SCHILLING, 1837)
 G L. gemellatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
 S G O L. pratensis (LINNAEUS, 1758)
 G O L. rugulipennis POPPIUS, 1911 (= pubescens (REUTER))
 G L. wagneri REMANE, 1955
 G Orthops (O.) basalis (A.COSTA, 1852)
 O O. (O.) kalmii (LINNAEUS, 1758)
 G Pinalitus cervinus (HERRICH-SCHÄFFER, 1842)
 G P. rubricatus (FALLEN, 1807)
 O Agnocoris reclairei E.WAGNER, 1949
 S A. rubicundus (FALLEN, 1829)
 S G Liocoris tripustulatus (FABRICIUS, 1781)
 G O Charagochilus gyllenhalii (FALLEN, 1807)
 O Polymerus (P.) palustris REUTER, 1905
 G P. (P.) unifasciatus (FABRICIUS, 1794)
 G O Capsus ater (LINNAEUS, 1758)
- Halticinae**
(Halticini)
- G O Halticus apterus (LINNAEUS, 1761)
 S Orthocephalus brevis (PANZER, 1798)
 G O. saltator (HAHN, 1835)
- Orthotylinae**
- G Heterocordylus (H.) genistae (SCOPOLI, 1763)
 G H. (H.) t. tibialis (HAHN, 1831)
 G Pachylops prasinus (FIEBER, 1861)
 G Reuteria marqueti PUTON, 1875
 G Malacocoris chlorizans (PANZER, 1794)
 G Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens (KIRSCHBAUM, 1856)
 G O O. (Orthotylus) marginalis REUTER, 1884
 G O. (O.) nassatus (FABRICIUS, 1787)
 G O. (O.) prasinus (FALLEN, 1829)
 G O. (O.) viridinervis (KIRSCHBAUM, 1856)
 G O. (Neopachylops) concolor (KIRSCHBAUM, 1856)
 G O. (Melanotrichus) flavosparsus (C.SAHLBERG, 1842)
 G O. (Litocoris) e. ericetorum (FALLEN, 1807)
 G O Neomecomma bilineatum (FALLEN, 1807) (= bilineatus (FALLEN, 1807))
 G Mecomma (Mecomma) ambulans (FALLEN, 1807)
 G M. (Globicellus) dispar (BOHEMAN, 1852)
 G Globiceps (Paraglobiceps) cruciatus REUTER, 1879
 S G G. (P.) flavomaculatus (FABRICIUS, 1794)
 G G. (P.) juniperi REUTER, 1902 (= woodroffei E.WAGNER, 1960)
 G G. (Globiceps) sphegiformis (ROSSI, 1790)
 G Blepharidopterus angulatus (FALLEN, 1807) (= brevicornis E.WAGN., 1947)
 G Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (DE GEER, 1773)
 G Cyllecoris histrionicus (LINNAEUS, 1767)
- Pilophorinae**
- G Pilophorus clavatus (LINNAEUS, 1767)
 G P. perplexus (DOUGLAS & SCOTT, 1875) (= pusillus REUTER, 1878)
- Hallodapinae**
(Hallopadini)
- G Mimocoris rugicollis (COSTA, 1852)
- Phylinae**
(Phylini)
- G Harpocera thoracica (FALLEN, 1807)
 G Parapsallus vitellinus (SCHOLTZ, 1846)
 G O Plagiognathus (P.) arbustorum (FABRICIUS, 1794)
 G P. (P.) chrysanthemii (WOLFF, 1864)
 G P. (P.) arenicola E.WAGNER, 1941
 O Monosynamma bohemani (FALLEN, 1829) (= nigrifulum (ZETT., 1839))
 O Chlamydatus (Euattus) pulicarius (FALLEN, 1807)
 G O Ch. (E.) pullus REUTER, 1870
 G Criocoris crassicornis (HAHN, 1834)

- G Atractotomus (A.) kolenatii (FLOR, 1860)
 G A. (A.) magnicornis (FALLEN, 1807)
 G A. (A.) parvulus REUTER, 1878
 G Compsidolon (Coniortodes) salicellus (HERRICH-SCHÄFFER, 1841)
 G Psallus (Apocremnus) a. ancorifer FIEBER, 1858
 G P. (A.) b. betuleti (FALLEN, 1829)
 G O P. (Mesopsallus) ambiguus (FALLEN, 1807)
 G P. (Hylopsallus) variabilis (FALLEN, 1829)
 G P. (Psallus) falleni REUTER, 1883
 G P. (P.) flavellus STICHEL, 1933
 G P. (P.) haematodes (GMELIN, 1788) (= roseus (FABRICIUS, 1776))
 O P. (P.) lepidus FIEBER, 1858
 G P. (P.) mollis (MULSANT, 1852) (= diminutus KRSCH., 1856 = masseei WOOD., 1957)
 G P. (P.) salicis (KIRSCHB., 1856) (= alnicola DGL. & SC., 1871 = scholtzi FIEB., 1861)
 G P. (P.) v. varians (HERRICH-SCHÄFFER, 1842)
 G P. (Pityopsallus) luridus REUTER, 1878
 G P. (P.) pinicola REUTER, 1875
 G P. (P.) vittatus FIEBER, 1861
 G O Orthonotus rufifrons (FALLEN, 1807)
 G Phylus (Phylus) coryli (LINNAEUS, 1758)
 G Ph. (Ph.) melanocephalus (LINNAEUS, 1767)
 G Icodema infuscatum (FIEBER, 1861)
 G Lopus d. decolor (FALLEN, 1807)
 G Placochilus s. seladonicus (FALLEN, 1807)
 G Asciodema obsoletum (FIEBER, 1864)
- Cimicoidea**
NABIDAE
Prostemmatinae
- S Prostemma aeneicolle STEIN, 1857
- Nabinae**
- G Himacerus apterus (FABRICIUS, 1798)
 G O Aptus mirmicoides (A. COSTA, 1834)
 S O Nabis (N.) brevis SCHOLTZ, 1847
 N. (N.) ericetorum SCHOLTZ, 1846
 G O N. (N.) punctatus A. COSTA, 1847
 G N. (N.) rugosus (LINNAEUS, 1758)
- ANTHOCORIDAE**
Anthocorinae
- G Temnostethus (T.) gracilis HORVATH, 1907
 G T. (T.) pusillus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
 G Anthocoris amplicollis HORVATH, 1893
 G A. confusus REUTER, 1884
 G A. gallarumulmi (DE GEER, 1773)
 G A. minki DOHRN, 1860
 G A. nemoralis (FABRICIUS, 1794)
 G A. nemorum (LINNAEUS, 1761)
 G A. sarothamni DOUGLAS & SCOTT, 1865
 G Acomporis alpinus REUTER, 1875
 G Tetrableps bicuspis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
 G O Orius (O.) niger (WOLFF, 1811)
 G O. (Heterorius) horvathi (REUTER, 1884)
 G O O. (H.) l. laticollis (REUTER, 1884) (= brevicollis (REY, 1888))
 O O. (H.) majusculus (REUTER, 1879)
 G O. (H.) minutus (LINNAEUS, 1758)
 G O O. (H.) vicinus (RIBAUT, 1923)
- CIMICIDAE**
Cimicinae
- S Cimex lectularius LINNAEUS, 1758
- REDUVIDAE**
Peiratinae (non Piratinae!)
- S Peirates hybridus (SCOPOLI, 1763) (non Pirates!)
 P. stridulus (FABRICIUS, 1787)

- Harpactorinae**
- S Coranus subapterus (DE GEER, 1773)
- S Rhynocoris annulatus (LINNAEUS, 1758)
- S G Rh. iracundus iracundus (PODA, 1761)
- Reduviinae**
- G Reduvius personatus (LINNAEUS, 1758)
- Phymatinae**
- G Phymata crassipes (FABRICIUS, 1775)
- PENTATOMOMORPHA**
- Aradoidea**
- ARADIDAE**
- Aradinae**
- G Aradus versicolor HERRICH-SCHÄFFER, 1839
- Aneurinae**
- G Aneurus laevis (FABRICIUS, 1775)
- Coreoidea**
- LYGAEIDAE**
- Lygacinae**
- S Arocatus roeselii (SCHILLING, 1829)
- G Lygaeus equestris equestris (LINNAEUS, 1758)
- S G Spilostethus saxatilis (SCOPOLI, 1763)
- G Tropidothorax leucopterus (GOEZE, 1778)
- Orsillinae**
- G Nithecus jacobaeae (SCHILLING, 1829)
- G O Nysius (N.) thymi (WOLFF, 1804)
- G N. (Macroparius) cymoides (SPINOLA, 1837)
- G Orsillus depressus DALLAS, 1852
- Ischnorhynchinae**
- G O Kleidocerys resedae (PANZER, 1797)
- Cyminae**
- G O Cymus clavicularis (FALLEN, 1807)
- O C. melanocephalus FIEBER, 1861
- Blissinae**
- O Dimorphopterus s. spinolae (SIGNORET, 1857)
- Geocorinae**
- G Geocoris (G.) pallidipennis (CORTI, 1843)
- Oxycareninae**
- G Macroplax preysleri (FIEBER, 1836)
- S G Oxycarenus lavaterae (FABRICIUS, 1787)
- Heterogastrinae**
- G Heterogaster urticae (FABRICIUS, 1775)
- S O Platyplax salviae (SCHILLING, 1829)
- Rhyparochrominae**
- (Plinthisini)**
- G Plinthisus (Plinthisomus) pusillus (SCHOLTZ, 1846)
- P. (Plinthisus) putoni HORVATH, 1876
- (Antillocorini)**
- S Tropistethus h. holosericeus (SCHOLTZ, 1845)
- (Drymini)**
- S Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus (FABRICIUS, 1775)
- G Scolopostethus thomsoni REUTER, 1874
- (Stygnocorini)**
- O Stygnocoris rusticus (FALLEN, 1807)
- G S. sabulosus (SCHILLING, 1829) (pedestris FALLEN, 1807)
- S Acompus rufipes (WOLFF, 1804)
- (Myodochini)**
- O Pachybrachius fracticollis (SCHILLING, 1829)
- (Rhyparochromini)**
- S O Beosus maritimus (SCOPOLI, 1763)
- S B. quadripunctatus (MÜLLER, 1766)
- S Graptopeltus lynceus (FABRICIUS, 1775)

- S G Raglius alboacuminatus (GOEZE, 1778)
S G R. vulgaris (SCHILLING, 1829)
S G Rhyparochromus pini (LINNAEUS, 1758)
S G Xanthochilus quadratus (FABRICIUS, 1798) (= immaculatus ROYER, 1920)
G Peritrechus geniculatus (HAHN, 1831)
G P. gracilicornis PUTON, 1877
S P. lundii (GMELIN, 1789)
S P. nubilus (FALLEN, 1807)
(Megalonotini)
G Megalonotus ch. chiragra (FABRICIUS, 1794)
G M. p. praetextatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
(Gonianotini)
S Emblethis verbasci (FABRICIUS, 1803)
G Pterotmetus staphiliniiformis (SCHILLING, 1829)
G Trapezonotus (T.) arenarius (LINNAEUS, 1758)
PYRRHOCORIDAE
S G Pyrrhocoris apterus (LINNAEUS, 1758)
STENOCEPHALIDAE
S Dicranocephalus agilis (SCOPOLI, 1763)
S D. albipes (FABRICIUS, 1781)
O D. medius (MULSANT & REY, 1870)
COREIDAE
Coreinae
S G Gonocerus j. juniperi (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)
S G Syromastus rhombeus (LINNAEUS, 1767)
S G O Coreus marginatus (LINNAEUS, 1758)
Spathocerinae
G Spathocera laticornis (SCHILLING, 1829)
Pseudophloeinae
O Arenocoris fallenii (SCHILLING, 1829)
S Ulmicola spinipes (FALLEN, 1807)
S G O Coriomeris denticulatus (SCOPOLI, 1763)
S C. hirticornis (FABRICIUS, 1794)
C. scabricornis (PANZER, 1809)
ALYDIDAE
Alydinae
S G O Alydus calcaratus (LINNAEUS, 1758)
S Camptopus lateralis (GERMAR, 1817)
RHOPALIDAE
Rhopalinae
(Rhopalini)
S G Corizus h. hyoscyami (LINNAEUS, 1758)
G O Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus (FIEBER, 1837)
G Rh. (Rhopalus) conspersus (FIEBER, 1837)
G Rh. (Rh.) distinctus (SIGNORET, 1859)
S G Rh. (Rh.) parumpunctatus SCHILLING, 1829
S G Rh. (Rh.) subrufus (GMELIN, 1790)
(Chorosomini)
G O Myrmus m. miriformis (FALLEN, 1807)
G Stictopleurus abutilon (ROSSI, 1790)
G O St. punctatonervosus (GOEZE, 1778)
Pentatomoidea
PLATASPIDAE (Plataspidae)
G Coptosoma scutellatum (GEOFFROY, 1785)
CYDNIDAE
Schirinae
S Sehirus morio (LINNAEUS, 1761)
G Canthophorus impressus HORVATH, 1881
S G Legnotus limbosus (GEOFFROY, 1785)
THYREOCORIDAE
S Thyreocoris scarabaeoides (LINNAEUS, 1758)

SCUTELLERIDAE

Odontotarsinae

- S Odontotarsus purpureolineatus (ROSSI, 1790)

Eurygasterinae

- S Eurygaster maura (LINNAEUS, 1758)
G O E. testudinaria (GEOFFROY, 1758)

PENTATOMIDAE

Podopinae

- G O Graphosoma lineatum (LINNAEUS, 1758) (= italicum (MÜLLER, 1766))
O Podops (P.) inuncta (FABRICIUS, 1775)

Pentatominae

- G Sciocoris (Aposciocoris) macrocephalus FIEBER, 1851
G Dyroderes umbraculatus (FABRICIUS, 1775)
S G O Aelia acuminata (LINNAEUS, 1758)
G Neottiglossa pusilla (GMELIN, 1789)
O Eysarcoris aeneus (SCOPOLI, 1763)
G E. fabricii KIRKALDY, 1904
S G E. ventralis (WESTWOOD, 1837) (= inconspicuus HERRICH-SCHÄFF., 1844)
S Staria l. lunata (HAHN, 1835)
S G Palomena prasina (LINNAEUS, 1761)
O P. viridissima (PODA, 1761)
S Holcostethus (Dryocoris) sphaelatus (FABRICIUS, 1794)
G O H. (Holcostethus) vernalis (WOLFF, 1804) (= stictus vernalis (WOLFF, 1804))
G Carpocoris melanocerus MULSANT, 1852
S G O C. purpureipennis (DE GEER, 1773)
S Codophila varia (FABRICIUS, 1787)
S G O Dolycoris baccarum (LINNAEUS, 1758)
S G Eurydema oleraceum (LINNAEUS, 1758)
S G O Nezara viridula (LINNAEUS, 1758)
S G O Piezodorus lituratus (FABRICIUS, 1794)
S Rhaphigaster nebulosa (PODA, 1761)
G O Pentatoma rufipes (LINNAEUS, 1758)

Asopinae

- O Pinthaeus sanguinipes (FABRICIUS, 1787)
G Picromerus bidens (LINNAEUS, 1758)
S O Arma custos (FABRICIUS, 1794)
G Zicrona caerulea (LINNAEUS, 1758)

ACANTHOSOMATIDAE

- S G Acanthosoma haemorrhoidale (LINNAEUS, 1758)
G Elasmotherus interstinctus (LINNAEUS, 1758)
G O Elasmucha g. grisea (LINNAEUS, 1758) (= betulae (DE GEER, 1773))
G Cyphostethus tristriatus (FABRICIUS, 1787)

BIBLIOGRAFIA

- CACCIA, R., BAILLOD, M. & MAURI, G., 1980 - Dégâts de la punaise verte de la vigne dans les vignobles de la Suisse italienne. - Rev. suisse de vitic., arboric., hort., 12(5): 275-279. (*Lygus spinolai* per il Ticino)
- CARLINI, A. de, 1887 - Rincoti del Sottoceneri. - Bull. soc. ent. ital., p.258. (vedi SERVADEI 1967)
- DETHIER, M. & MATTHEY, W., 1977 - Contribution à la connaissance des Hétéroptères aquatiques de Suisse. - Revue suisse zool., 84(3): 583-591. (*Velia currens* per il Ticino)
- DETHIER, M. & PERICART, J., 1988 - Les Hétéroptères Nabidae de Suisse. - Mitt. schweiz. Ent. Ges., 61: 157-166. (*Prostemma guttula*, *P.aeneicolle*, *Alloerhynchus flavipes*, *Himaceus apterus*, *Nabis brevis*, *N.rugosus*, *N.punctatus* per il Ticino)

- DIOLI, P., 1975 - La presenza in Valtellina di alcune cimici dannose alle piante. - Rass. Econ. prov. di Sondrio, 4: 43-45. (*Corythuca ciliata* SAY. - Lugano)
- FREY-GESSNER, E., 1863 - Zusammenstellung der durch Herrn Meyer-Dür im Frühling im Tessin und Anfang Sommer 1863 im Ober-Engadin beobachteten und gesammelten Hemipteren und Orthopteren.- Mitt. schweiz. Ent. Ges., 1: 150- (vedi SERVADEI 1967).
- GÖLLNER-SCHEIDING, U. & REZBANYAI-RESER, L., 1992 - Zur Wanzenfauna des Monte Generoso, Kanton Tessin, Südschweiz (Heteroptera).- Ent. Ber. Luzern, Nr.28: 15-36. (elenco)
- GÜNTHER, M. & SCHUSTER, G., 1990 - Verzeichnis der Wanzen Mitteleuropas. - Dtsch. Entomol. Ztschr., N.F., 37(4-5): 361-396.
- NAEGELI, W., 1933 - Über Biologie und Verbreitung der beiden Langwanzen *Gastrodes abietum* BERGR. und *Gastrodes grossipes* De GEER. -Mitt. Schw. Anst. forstl. Versuchsw., 18: 207-280.
- OTTO, A., 1992 - Zur Landwanzenfauna der Magadino-Ebene, Kanton Tessin (Heteroptera: Geocorisae). - Ent. Ber. Luzern, Nr.28: 37-44. (elenco)
- PUTON, A., 1882 - Notes hémiptérologiques. - CAEN, 1: 239-240. (*Pterotmetus dimidiatus* FIEB. - Locarno)
- PUTON, A., 1885 - Captures d'Hémiptères et description d'une variété nouvelle. - CAEN, 4: 356-357. (*Plinthisus putoni* HORV. - Lugano)
- PUTON, A., 1887 - Hémiptères nouveaux ou peu connus de la faune paléarctique. - CAEN, 6: 96-105. (*Orthostira samara* PUT. - Lugano; *Capsus freyi* PUT. - Agno)
- SERVADEI, A., 1967 - Rhynchota (Heteroptera, Homoptera Auchenorrhyncha). Catalogo topografico e sinonimico. - Fauna d'Italia, IX., p p. 851, Ed.Calderini, Bologna.
- SIMONET, J., 1949 - Etat de nos connaissances relatives à la faune suisse des Hétéroptères. -Mitt. schweiz. Ent. Ges., 22: 433-437. (Coreidae: *Spathocera laticornis* (SCHILL.) - "Tessin") (Lygaeidae: *Cymus melanocephalus* FEIB. - Locarno) (Lygaeidae: *Geocoris pallidipennis* (COSTA) - Bellinzona e Agno) (Nabidae: *Alloerhynchus flavipes* (FIEB.) - "Tessin")
- SIMONET, J., 1954 - Notes sur quelques Hétéroptères des environs de Genève. -Mitt. schweiz. Ent. Ges., 27: 23-32. (Coriscidae: *Megalotomus junceus* (SCOP.) - "Tessin" e Mendrisio) (Leptopodidae: *Leptopus marmoratus* (GOEZE) - "Tessin") (Tingidae: *Stephanitis pyri* (F.) - Lugano)

