

Zeitschrift:	Bollettino della Società ticinese di scienze naturali
Herausgeber:	Società ticinese di scienze naturali
Band:	83 (1995)
Artikel:	Pseudostellaria euripaea Schaeftlein (caryophyllaceae) in provincia di Varese
Autor:	Macchi, Paolo
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-1003315

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

PSEUDOSTELLARIA EUROPAEA Schaeftlein (CARYOPHYLLACEAE) IN PROVINCIA DI VARESE

PAOLO MACCHI

Museo Civico di Scienze Naturali

P.zza Giovanni XXIII - 21056 Induno Olona (VA)

RIASSUNTO

Viene descritta una nuova stazione di crescita di *Pseudostellaria europaea* (CARYOPHYLLACEAE), situata in Provincia di Varese. Vengono riportate inoltre notizie sull'areale di distribuzione, l'autoecologia e due rilievi fitosociologici come esempio della vegetazione in cui la pianta è inserita.

ABSTRACT

A new growing site of *Pseudostellaria europaea* (CARYOPHYLLACEAE), lying in "Provincia di Varese" (N-Italy), is described. Some data on the distribution area, autoecology, and two phytosociological relevées as an example of the vegetation of the site are also given.

Pseudostellaria europaea (sinonimo: *Stellaria bulbosa* Wulfen) è stata osservata in provincia di Varese per la prima volta da G. Macchi nell'aprile 1991 (MACCHI & DANINI, 1992).

La stazione di crescita è ubicata ai lati della statale che, in uscita dalla città di Varese, conduce verso la Valganna, all'altezza del bivio per la frazione Olona (Foglio IGMI 31 I SO - GAVIRATE, quadrato UTM di 1 km di lato: 32TMR8676), alla quota di 370 m s.m.

Il substrato pedogenetico è un deposito morenico del Wurm, formante un leggero pendio con esposizione NE.

La vegetazione consiste di boschetti mesoigrofili di latifoglie a *Fraxinus excelsior*, *Robinia pseudoacacia*, *Castanea sativa* e qualche *Alnus glutinosa* in corrispondenza di un locale affioramento della falda. Questo habitat si estende per circa 200 metri lungo la strada ed è limitato a monte dal bosco meso-acidofilo a dominanza di castagno, in più forte pendio, e a valle (lato opposto della strada) da zone coltivate a prato digradanti fino alla sponda del Fiume Olona. Nelle immediate vicinanze della strada, inoltre, alligna una vegetazione nitrofila ruderale dominata dai rovi e dalla robinia, nella quale *P. europaea* è assente. I boschi sono governati a ceduo.

Il suolo della stazione è fresco-umido; *P. europaea* sembra evitare sia i punti dove la falda affiora in superficie ed *Equisetum telmateia*, *Filipendula ulmaria* e *Cardamine amara* diventano le specie dominanti lo strato erbaceo, sia quelli più asciutti e acclivi del castagneto a monte, dove prevalgono *Vinca minor*, *Cardamine bulbifera*, *Pteridium aquilinum*.

Pseudostellaria europaea è una specie molto interessante per le caratteristiche botaniche e per la distribuzione geografica. È caratterizzata principalmente dalla produzione di un sottilissimo rizoma con ingrossamenti tuberosi in corrispondenza delle radici. Per il resto la pianta è del tutto simile a una *Stellaria*, per cui, ad una superficiale osservazione sul campo, può essere scambiata con una specie di questo genere. Le piantine si presentano tipicamente a chiazze (spesso tra le radici affioranti degli alberi o alternate a quelle di

Anemone nemorosa), che spiccano per il loro verde chiaro e testimoniano la propagazione vegetativa attraverso i rizomi e i tuberetti. Questi sono abbastanza profondamente interrati, per cui sfuggono facilmente all'osservazione se la raccolta non viene effettuata con la massima cautela.

Pare che quella vegetativa sia la modalità di propagazione quasi esclusiva per questa specie (CHATER 1964), i cui fiori cismogami sembrano essere sterili. Però saltuariamente si osservano fiori cleistogami fertili (SCHAETLEIN 1979), come ho potuto constatare anche nella popolazione esaminata, di cui conservo in erbario alcune capsule e semi.

L'areale di *Pseudostellaria europaea* è definito "centro-europeo", ma la sua estensione è limitata ai territori collinari e submontani attorno all'estremità orientale delle Alpi: Slovenia, Croazia occidentale, Carinzia, Stiria e Carnia, non oltre i 670 m di altitudine (SCHAETLEIN I.cit., POLDINI 1991); stazioni disgiunte conosciute da tempo sono quelle del Biellese e della Valsesia (BADINO et. al. 1986, ROTTI 1992). A queste vanno ora aggiunte le nuove segnalazioni della Provincia di Varese (oltre alla località del presente articolo, *P. europaea* è stata trovata da G. Rotti anche nei pressi di Sesto Calende e di Osmate, PERONI G., in verbis).

Si riscontra una notevole disgiunzione anche tra l'areale di *P. europaea* e quelli delle specie congenere (una quindicina), tutte dell'Asia centrale e orientale (SCHAETLEIN I.cit.).

La tabella che segue presenta due rilievi fitosociologici della vegetazione in cui la specie è stata osservata (scala di coperture secondo Pignatti).

	4.4.93	14.4.95
Superficie rilevata (m ²)	30	120
Pendenza (°)	5	15
Esposizione	NE	NE
Strato arboreo, cop. %	50	70
<i>Robinia pseudoacacia</i>	2	
<i>Fraxinus excelsior</i>	1	2
<i>Alnus glutinosa</i>	.	2
<i>Castanea sativa</i>	.	1
Strato arbustivo, cop. %	70	80
<i>Sambucus nigra</i>	3	2
<i>Corylus avellana</i>	2	2
<i>Viburnum opulus</i>	.	1
<i>Rubus</i> sp.	.	1
<i>Fraxinus excelsior</i>	.	+
Strato erbaceo, cop. %	90	80
<i>Anemone nemorosa</i>	3.4	3.4
<i>Cardamine bulbifera</i>	2	2
<i>Pseudostellaria europaea</i>	1.3	1.3
<i>Geranium nodosum</i>	+.2	1.2
<i>Leucojum vernum</i>	+	1
<i>Oxalis acetosella</i>	+	+
<i>Erythronium dens-canis</i>	+	+
<i>Euonymus europaeus</i> juv.	+	+
<i>Lamiastrum galeobdolon</i>	+	+
<i>Hedera helix</i>	r	+
<i>Aconitum vulparia</i>	1	.
<i>Helleborus viridis</i>	1	.
<i>Scilla bifolia</i>	+	.
<i>Symphytum tuberosum</i>	+	.

<i>Crocus</i> sp.	+.2	.
<i>Primula vulgaris</i>	r	.
<i>Heracleum sphondylium</i>	r	.
<i>Veronica hederifolia</i>	r	.
<i>Stellaria media</i>	r	.
<i>Athyrium filix-foemina</i>	.	1
<i>Carex brizoides</i>	.	1.3
<i>Polygonatum multiflorum</i>	.	1
<i>Dryopteris carthusiana</i>	.	+
<i>Cardamine amara</i>	.	+.2
<i>Crepis paludosa</i>	.	+.2
<i>Equisetum telmateia</i>	.	+
<i>Filipendula ulmaria</i>	.	+.2
<i>Vinca minor</i>	.	+
<i>Pulmonaria officinalis</i>	.	+
<i>Viburnum opulus juv.</i>	.	+
<i>Impatiens</i> sp. juv.	.	+
<i>Fraxinus excelsior</i> juv.	.	+
<i>Tamus communis</i>	.	r
<i>Prunus avium</i> juv.	.	r
<i>Ilex aquifolium</i> juv.	.	r

Il materiale raccolto è conservato nell'erbario del Museo Civico di Scienze Naturali di Induno Olona (VA),
nn. 278, 420.

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio la Sig.ra Cristina Spinelli (Mendrisio) per l'aiuto nella lettura dei testi tedeschi, e i Sigg. Adalberto e Gabriele Peroni (Viggiù) per i dati e la bibliografia segnalati.

BIBLIOGRAFIA

- BADINO A., SELLA A. & SOLDANO A., 1986 - Stazioni di *Pseudostellaria europaea* Schaeftlein e di *Erica cinerea* L. in Provincia di Vercelli. Riv. Piem. St. Nat. 7: 101-105.
- CHATER O., 1964 - *Pseudostellaria Pax*. In: Tutin (ed.) Flora Europaea. Vol. 1: 136. Cambridge Univ. Press.
- MACCHI P. & DANINI G., 1992 - Specie interessanti o rare della flora della Provincia di Varese. Boll. Soc. Tic. Sci. Natur. 80(1): 135-141.
- PIGNATTI S., 1982 - Flora d'Italia. Vol. 1: 210. Edagricole, Bologna.
- POLDINI L., 1991 - Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli-Venezia Giulia. Udine.
- ROTTI G., 1992 - *Pseudostellaria europaea*, una specie erbacea di grande fascino, per una zona dalle acque limpide e pure. Notiz. C.A.I., Varallo Sesia, anno 6°, numero unico: 36-38.
- SCHAETLEIN H., 1979 - *Pseudostellaria*. In: "Hegi" (ed.), Illustrierte Flora von Mitteleuropa, bd. II, teil 3, pp. 875-883.

