**Zeitschrift:** Bollettino della Società ticinese di scienze naturali

Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali

**Band:** 93 (2005)

**Artikel:** Pubblicazione del manoscritto inedito "Prima nota di funghi che

crescono nel cantone Ticino". Parte II

Autor: Riva, Alfredo

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-1003181

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

# **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

# Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 21.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Pubblicazione del manoscritto inedito «Prima nota di funghi che crescono nel Cantone Ticino». Parte II

Nota redatta nel 1859 da Alberto Franzoni (1816-1886) e da Agostino Daldini (1817-1895)

#### Alfredo Riva

Società micologica Carlo Benzoni di Chiasso, Via Pusterla 12, 6828 Balerna

Nel Bollettino della Società ticinese di Scienze naturali volume 92 (1-2) 2004, l'Autore ha pubblicato l'elenco dei generi riportati nel manoscritto di A. Franzoni e A. Daldini, manoscritto che risale al 1859, il più antico documento riguardante lo studio della micologia ticinese sino a oggi noto.

Qui di seguito è riprodotta una prima parte dell'elenco delle specie. Si ricorda che il testo è stato riportato come nell'originale, tralasciando unicamente le referenze bibliografiche. È stato aggiunto talvolta il nome d'Autore specie tra [] quando ciò era possibile e inserito degli interrogativi (?) là dove esistevano incertezze. Gli spazi con «....» sono esistenti anche nel manoscritto.

I reperti elencati in questo catalogo sono depositati al Museo cantonale di storia naturale di Lugano.

# H

HYMENOMYCETES		
1 AGARICUS	Amanita	Agaricus caesareus Scop. Locarno a S. Biagio, Orselina; AgosSett.
		Agaricus phalloides Fr. Orselina nei boschi.
		Agaricus muscarius L. Locarno nei prati, campi. Orselina nei boschi. Bignasco nei
		boschi. Bellinzona. Boschi sopra Arcegno. 1 ott. 1861.
		Agaricus vaginatus Bull. Locarno nei campi concimati qua e là. A Vogorno nelle
		selve castanili (Sett. 28).
	Lepiota	Agaricus procerus Scop. Locarno nelle selve. Tenero ivi. Monti di Losone al Corti
	•	Ott. 1861. Oss.: lamelle del fungo sviluppato eroso-dentate, odore particolare
		erba ma tiglioso (?).
		Agaricus clypeolarius Bull. Locarno nei campi al Sasso. Ott.
		Agaricus cepaestipes [Fr.] Locarno alla Fregiera, nei muschi sotto ai castagni.
		Agaricus granutalus [Schaeff.] Locarno nelle località cane al no. 7.
	Tricholama	Agaricus velutipes Curt. Locarno ai ceppi delli noci. 1958. OttNov.
	Clytocybe	Agaricus laccatus Scop. e var. violaceus. Locarno nelle selve di S. Biagio, al Sasso.
	Collybia	Agaricus fusipes Bull. Locarno a S.Biagio, selve castanili.
		Agaricus longipes [Bull.] Locarno al Sasso, raro.
	Hebeloma	Agaricus rimosus Bull. Locarno nei prati.
		Agaricus oreades [Fr.]. Locarno ai ceppi dei castagni e dei gelsi.
2	Psathy $r$ ell $a$	Agaricus disseminatus Pers. Locarno.
	Dermocybe	Agaricus cinnamomeus [Fr.]. Locarno
	Armillaria	Agaricus melleus Pers. Locarno al piede dei frassini, noci, meli, peri, a Tenero,
		Bellinzona, gregario.
	Hy porrhodinus	Agaricus speciosus [Fr.]. Locarno nei prati pingui.
	Lactarius	Agaricus camphoratus [Bull.]. Locarno nei boschi. var. subdulcis Bull. Locarno nei boschi.
		Agaricus pyrogalus [Bull.]. Locarno nei boschi.
		Agaricus vellereus [Fr.]. Selva faginea verso il M.te di Surio [?] fini Intragna. Ott. 1861.
		Oss.: ha la forma infundibuliforme col margine arrotolato e il cappello
		tomentoso flocculoso e il piede corto grosso-tomentoso obconico.
		[piccolo schizzo]
	ъ :	A TOTAL TOTA

Agaricus crustuliniformis Bull. [Hebeloma] Locarno?

Agaricus umbellatus Locarno

Derminus

Coprinarius [?]

Agaricus umbelliferus [Fr.]. Locarno nei prati. Agaricus dryophylus [Bull.] [Collybia]. Locarno nei prati. Agaricus melinoides [Schum.] [Entoloma]. Locarno nei campi concimati. 2 RUSSULA Russula virescens Pers. Locarno alla Fregiera. Russula foetens Pers. Locarno nei prati al disopra del Sasso. Brione Valletta, tra Orselina e Brione. Russula rubra Fr. Locarno. Russula ochroleuca Fr. Locarno alla Fregiera. Russula emetica Pers. Locarno alla Fregiera e nei boschi. Russula adusta Pers. Locarno alla Fregiera e nei boschi. 3 COPRINUS Coprinus lagopus [Fr.]. Locarno al Sasso, frutti maturi fermentati. 4 HYGROPHORUS Camarophyllus Hygrophorus virgineus [Fr.]. Locarno al Sasso, nei prati. Hygrophorus coccineus [Fr.]. Locarno al Sasso, nei prati. Hygrocybe Hygrophorus coccineus var. nigrescens. Locarno al Sasso. Hygrophorus conicus [Scop.]. Locarno. **5 CANTHARELLUS** Cantharellus tubaeformis Fr. Nelle selve castanili, Bellinzona, raro. Cantharellus cibarius [Fr.]. Locarno, negli scoperti e nei prati. Cantharellus muscigenus Fr. Locarno, luoghi muscosi, sulle rupi. Cantharellus cinereus [Mer.] Pers. Locarno nella selva. Cantharellus lutescens [Mer.] Pers. Locarno nei prati sopra il Sasso; raro. Cantharellus umbonatus [Pers.] Nelle piazze di carbonaia, nei monti di Losone; 1861 ott. Cantharellus aurantiacus [Wulf.]. Locarno selve, sett.-ott. Cantharellus crispus Fr. Bignasco ai tronchi essiccati della Betulla, marzo 1858. 6 MARASMIUS Marasnius peronatus Bolt. Selva, tra la foglia decidua e fra muschi. Locarno, Camorino d'autunno. Marasnius oreades Bolt. Nei campi e prati, tutto l'anno, Locarno a San Biagio e verso Orselina. Marasmius plancus Scop. Nelle selve tra i muschi e la foglia caduta Camorino, sett.-ott. Marasmius ramealis Bull. Ai rami di nocciuoli, Valletta di S.Biagio sopra Locarno. Marasmius androsaceus Linn. Sulla foglia degli abeti nei boschi Campo di Valle Maggia, fragile, lugl.-ott. Marasnius Hudsoni Pers. Orselina, valletta da ... alla foglia sternale dello Ilex aquifolium. Sett. 1862 P.A. (Daldini). 7 ASTEROPHORA Asterophora lycoperdoides Dittm. sin. Nyctalis parassitica. Brione sulla Russula foetens. P.A. 1862 agos.-sett. Nella valletta del Rebisale tra Brione e Orselina sulla Russula foetens! Ott. 1863 A. Fr. **8 LENTINUS** Lentinus cochleatus Pers. Locarno nei campi, gregario. Lentinus dryadeus. Locarno alla legna quercina (ligneo). 9 PANUS Panus stipticus Bull. Locarno, Bignasco, ai tronchi in putrefazione degli alni, dei nocciuoli, frequentissimo. 10 SCHYZOPHYLLUM Schyzophyllum comune Fr. Comunissimo al tronco disseccato di noci, delle betulle a Locarno, Bellinzona, Bignasco. Lenzites betulina Linn. Locarno, Bignasco, Bellinzona, ai ceppi delle betulle, frequente. 11 LENZITES Lenzites tricolor Fr. Orselina, alla legna dei peschi. Lenzites trabea Pers. Locarno, Tenero, alla legna di abete. Lenzites sepiaria Fr. Locarno alla legna di larice. 12 DEDALEA Dedalea quercina. Locarno, Cavergno, Bignasco, alla legna e ceppi delle roveri. 13 BOLETUS Boletus aureus. Locarno al Sasso nei prati e boschi. P. Agostino (manca all'erbario). Boletus castaneus. Locarno al Sasso, Contra. (manca all'erbario). Boletus piperatus Bull. Bellinzona, selve. Boletus subtanentosus Linn. Locarno, al Sasso. Boletus luridus Schaeff. Locarno al Sasso, Bellinzona nelle selve. (Manca nell'erbario) Boletus edulis Bull. Locarno, Tenero, Losone, Bellinzona, frequentissimo nelle selve. Fung farré (Fung legorat). Giugno poi da lugl. a ott. Boletus porphyrosporus Fr. Locarno selva d'Orselina, abeti. Boletus scaber Fr. Selva, Bellinzona. Boletus brachisporus Pers. Bellinzona, selva, sett.

Boletus luteus Linn. Locarno, selva, Valle Rovana, d'autunno.

Boletus granulatus Linn. Belinzona selva.

#### 14 POLYPORUS

Polyporus frondosus [Schr.]. Locarno e Vezia, Bignasco, Bellinzona, ai tronchi dei castagni, betulle, querce.

Polyporus varius [Fr.] Quartino.

Polyporus fumosus Fr. Orselina, ai ceppi di noci a Ronco.

Polyporus fulvus Fr. Locarno ai ceppi dell'Evonymus e del Rhamnus frangula.

Polyporus cinnabarinus Jacq. Locarno.

Polyporus picipes Fr. Locarno alla legna di tiglio.

Polyporus hispidus [Bull.]. Locarno ai gelsi.

Polyporus hirsutus [Wulf.]. Locarno ai rami tutti diseccati.

Polyporus applanatus Pers. Locarno ai tronchi delle noci.

Polyporus obliquus [Pers.]. Locarno al tronco dei salici e dei gelsi, al Sasso, Orselina.

Polyporus versicolor [L.]. Ai ceppi delle betulle, alla legna diseccata, frequente a Locarno, Valle Maggia e Bellinzona.

Polyporus adustus Wind. Locarno ai tronchi di noci e di tiglio, al Sasso

Polyporus abietinus [Pers.]. Ai tronchi putrescenti dell'Abies, presente all'Alpe di Cardada (1670 m), 29 lugl. 1863.

Polyporus imbricatus [Bull.]. Locarno ai tronchi degli alberi (autunno).

Polyporus arcularius Fr. Trovato da Cesati ai tronchi della Robinia pseudoacacia verso Quartino e Sonvico.

Polyporus radula Fr. Bellinzona, selva di Vigana, ai rami in putrefazione (sett. ott.). Polyporus alveolarius Fr. Locarno, tronco degli alberi (fu determinato da Trog per *P. brumalis* ma certo non lo è).

Polyporus betulinus [Bull.]. Monti di Caramponasio in Val Cavergno al tronco del Sorbus aucuparia. 1856 ott. (margine tondeggiante involuto).

Polyporus lacteus Fr. Locarno, ai tronchi delle betulle al piano d'Albigo lugl. ed agos. Polyporus populinus Fr. Locarno ai pioppi. (esisteva nell'erbario fu rovinato dalle tignole).

Polyporus velutinus Fr. Locarno ai rami secchi delle noci. Genn.

Polyporus igniarius Fr. Locarno ai tronchi dei ciliegi, Bellinzona a quello dei meli. Polyporus abietinus Fr. [già al no. 13]. Campo, tronchi dell'Abies, Larix.

Polyporus zonatus Fr. Ai ceppi di castagni in decomposizione, Locarno valletta di S. Biagio.

Polyporus igniarius Fr. B. pomaceus, ai tronchi di meli, Bellinzona, zona Vigana di S. Antonino.

Polyporus capearius Fr. Ai tronchi degli abeti, Valle Calanca bosco della Motta [o Mutta?] Cimalmotto.

Polyporus tamariensis, nostri -Pileo carnoso und [?] tenui acuto reflexo, nigrescente lucido, subiumbonato, pori minutis pentagonis ? fusco ferruginei acuti.

Monte Tamaro - Alpe di Cortenovo al tronco dei faggi vetusti, 1845 Aug. Set.

Favolus europaeus [Fr.]. Locarno al tronco di gelsi, al Sasso, Orselina.

Trametes cinnabarinus (manca negli erbari). Al tronco del ciliegio, al Sasso, sopra Locarno.

Trametes suaveolens (manca nell'erbario). Locarno al tronco di salici vecchi.

Fistulina hepatica [Bull.]. Locarno, Bignasco, Bellinzona ai piedi dei tronchi dé castagni e talvolta delle roveri. Di agosto - ottobre.

Hexagona Mori. Ai tronchi vecchi delle siepi di robinia tra Luvino Germignaga. (1860 ott. 30).

Hydnum ferrugineum Fr. (manca nell'erbario). Vezia.

Hydnum graveolens Pers. Locarno al Sasso, nei boschi. Bellinzona falde di Vigana. Bignasco selva. Sett. - ott.

Hydnun pudorinum Fr., H. dichroun Pers. Orselina al tronco delle noci.

Hydnum cinereum Bull. Locarno al Sasso nelle selve. Bellinzona selva di Vigana, sett. - ott.

Hydnum argutum [Fr.]. Locarno.

Hydnum repandum [L.] vulgo persighin. Locarno nei boschi al Sasso. Bellinzona nelle selve castanili presso Pianezzo. Edule. Sett. - ott.

Hydnum niveum [Pers.]. Ai pali e tronchi d'alberi diseccati; nella fessura della corteccia di castagni. Bellinzona e Ravecchia.

Hydnum tanentosum [L.]. Locarno, valletta di Fregiera o del Sasso. Selve castanili. Sett. Hydnum Erinaceus Bull. Cevio, Vogorno, ai tronchi di castagni nella selva. Lugl. - sett.

15 FAVOLUS 16 TRAMETES

17 FISTULINA

18 HEXAGONA

19 HYDNUM

Hydnum coralloides Scop. Locarno, Leventina, ai tronchi di faggi, sugli abeti rasi e scortecciati.

Hydnum cyatiforme Bull. Bellinzona, nella selva castanile sotto la roccia di Unterwalden. Sett.

Hydnum farreum Pers. Ai ceppi di castagni nei luoghi soffocati. A San Antonio di Valle Morobbia. Sett.

Hydnum laevigatum Swartz. Locarno selva castanile sopra S. Biagio. A Campo di Valle Maggia.

Hydnum compactum Pers. Bellinzona, selve castanili sopra la rocca di Unterwalden. Sett. Hydnum ochraceum Pers. Locarno valletta di S.Biagio ai tronchi degli alberi.

Hydnum velutinum Fr. Locarno valletta di Fregiera, selva castanile, fra muschi. Sett.

Hydnum adustum (non Fries). Locarno alla corteccia di castagni e salici.

(Padre Agostino mandato sotto questo nome probabilmente determinato dal Cesati ma certo non è l'*adustum* di Fries).

Hydnum zonatum. Locarno selva di Orselina.

Hydnum subsquanosum [Batsch]. Ai piedi di castagni, selva sotto Orselina.

Odontia vitalbae Cesati. Locarno al Sasso, ai rami della Clematis vitalba nei luoghi ombrosi.

Odontia bugellensis Cesati. Bignasco ai pali vecchi di castagno della spalliera.

Irpex fuscoviolaceus [Fr.]. Locarno al Sasso alle schegge della legna di tiglio.

Craterellus sinuosus Fr. Ai ceppi di castagni a Locarno, Vezia.

Craterellus cornucopioides Pers. Locarno, Bellinzona, nella selva ai piedi di nocciuoli.

Craterellus crispus [Pers.]. Orselina, selva, sulla terra. Ott.

Thelephora tabacina [Fr.] (manca nell'erbario) Ai ceppi di nocciuoli, Locarno.

Thelephora rubiqinosa [Schr.]. Locarno, Gudo, ai ceppi di castagni.

Thelephora terrestris Ehrh. Nella selva frondosa, Locarno selva del Sasso d'Orselina, non rara.

Thelephora sebacea Fr. Nella selva infesta la gramigna ed i muschi. Locarno al Sasso, Vezia (P.A.).

Thelephora fusca Fr. Alla corteccia di varie piante. Locarno, sopra Orselina.

Stereum disciforme Fr. Locarno, Bignasco, alla corteccia di nocciuoli, della betulla.

Stereum hirsutum Fr. Locarno, Bellinzona, ai tronchi degli alberi, ai pali

Stereum purpureum Pers. Tenero ai fittoni di pioppo disseccato. Ott. 11, 1859.

Stereum rugosum Fr. Locarno.

Stereum sanguinolentum [Pers.]. Locarno. var. lilacina ivi.

Stereum alneum sugli ontani, Locarno.

Stereum disciforme Fr. Ai tronchi della betulla, alberi recisi. Bignasco.

Auricularia mesenterica [Pers.]. Losone, Tenero, ai tronchi delle noci e dei susini.

Corticium ochroleucum Fr. Ai tronchi sugli alberi, Bignasco.

Corticium coeruleum Fr. Locarno, Ascona, Bellinzona, alla corteccia e sul legno nudo di pali, castagno, salice.

Corticium cinereum [Pers.]. Locarno, Cavergno, Bignasco.

Corticium incarnatum (Pers.]. Locarno, sulla corteccia dell'Hedera helix.

Corticium laeve [Pers.] (manca nell'erbario). Locarno.

Corticium lacteum [Fr.]. Locarno, sulla corteccia del tiglio.

Corticium alneum [Fr.]. Locarno sulla corteccia della Clematis vitalba.

 ${\it Corticium\ roseum\ Pers.\ Bignasco\ sui\ rami\ degli\ arbusti,\ sett.\ ott.}$ 

Corticium sebaceum Pers. Locarno, nei boschi di Fregiera, incrostante i muschi. Vedi Th. sebacea Pers.

Corticium comedens [Nees]. Bignasco ai rami di noci e di castagno.

Corticium alutaceum Pers. Ai tronchi della Betula alba recisi. Bignasco di primavera e d'autunno inoltrato (mar. - nov.).

Clavaria candida Wein. (manca nell'erbario). Locarno nei boschi e nei prati.

Clavaria flava Pers. Nella selva sulla terra. Locarno sopra S. Biagio, Bignasco, Bellinzona.

Clavaria fastigiata Del. Nella selva tra i muschi, Locarno Fregiera.

Clavaria muscoides Linn. Nella selva.

Clavaria coralloides L. Nella Selva.

Clavaria cristata Holm. Locarno al Sasso, nella Selva.

20 ODONTIA

21 IRPEX

22 CRATERELLUS

23 THELEPHORA

24 STEREUM

25 AURIGULARIA 26 CORTICIUM

27 CLAVARIA

Clavaria aurea Schaeff. Selva sopra Locarno (per la cima dei rami tubulati si avvicina alla muscoides). Clavaria mucida Pers. Selva di S. Biagio sopra Locarno. Ott. fra i muschi. Clavaria vernalis Schwein. Sulla riva aggrottata lungo i torrenti dell'Alpi. Sulla terra Alpe di Stabiorello, Valle Calanca, 29 luglio 1859 alta 4-5 centimetri - larga una. 28 PISTILLARIA Pistillaria micans Pers. Locarno ai rami vecchi dell'Antirrhinum majus. Geoglossum hirsutum [Pers.]. Locarno e Vezia nei prati arenosi. 29 GEOGLOSSUM 30 EXIDIA Exidia auricola [Fr.]. Locarno ai tronchi del sambuco e dell'oppio. Exidia glandulosa [Fr.]. Minusio sulla corteccia del noce. 31 DACRYMYCES Dacrymyces stillatus - urticae Rabenh. Sui ceppi putrescenti della Urtica dioica. Dacrymyces stillatus [Nees]. Frequente alla tavola esposta all'umidità, alla legna. Locarno, anche nel mio giardino. Dacrymyces deliquescens Duby. Alla legna di abete scorticato o fabbricato. Locarno. Boschi di Cimalmotto, sui tronchi degli alberi scorticati, dopo pioggia; sett. 1860 32 TREMELLA Tremella aurantia Schwein. Locarno. Vai Sambuco, sulli tronchi in putrefazione, sulla tavola e sulla corteccia. Tremella sarcoides [With.]. Ai tronchi di faggi, a Gudo e a Locarno. 33 GUEPINIA Guepinia helvelloides Fr. Monte Tamara, Alpe di Cortenovo al piede di un faggio. Giugno. 34 CALOCERA Calocera tricolor Franzoni. Gelatinoso, cartilaginea, secca cornea, sun. (duplica)? e talvolta forcuta, solitaria, allungata, quasi lineare, schiacciata, poco contorta, base cinta da un tomentoso fuliginoso, clava cenerognola o biancastra, anche rugosa, apice linguiforme, giallo carnicino. Stirpe elegante, lungo 3-4 cent. Cresce nelle selve sui legni? fra muschi. Locarno al Sasso scoperto dal Rvdo

35 HYPOCHNUS

Hypochnus violaceo cinctus [?]. Ai tronchi decorticati dei castagni. Mendrisio, selva lungo la strada vecchia di Castello.

è la Sphaeria Hypoxylon in stato giovanile.]

Padre Agostino e comunicatomi nel 1859. [Cancellata e scritto in seguito:

### II DISCOMYCETES

1 MORCHELLA Morchella esculenta Pers. Locarno nè Saleggi. Tenero. Bellinzona Morchella conica. Locarno. Biasca.
 Morchella inflata. Locarno, prati di Losone.
 2 HELVELLA Helvella lacunosa Afzed. Locarno al Sasso sulla terra del margine delle selve. Sett. Helvella crispa Fr. (manca nell'erbario). Locarno al Sasso presso le Cappelle al di sopra del Convento lungo la strada che conduce ai Monti. Tenero presso la Cartiera. Helvella infula Schaeff. Tenero alla Cartiera, luoghi ombrosi, arenosi umidi.

(23 sett. 1862). Helvella elastica [Bull.]. Locarno al Sasso.

3 PEZIZA

Peziza leporina [Batsch]. Locarno al Sasso. Nel concio di campi di pomi di terra, frequente.

Peziza macropus [Pers.] (manca nell'erbario). Locarno nelli fossati sopra ilSasso; rara. Peziza echinophila [Bull.]. Locarno fra i ricci [poi cancellato e sostituito con gli involucri] della castagna in putrefazione; frequente. Ott.- Marzo.

Peziza cupularis L. Selva ai Sasso, San Biagio, Locarno.

Peziza umbrorum Fr. Sulla terra nella selva, Locarno a S. Biagio, ott.

Peziza hirta Schum. Sulla terra arenosa dopo la pioggia, Locarno.

Peziza vulgaris Fr. Ai rami secchi di salice, Locarno, ott.

Peziza bufonia Pers. Locarno, selva sopra S. Biagio, di primavera.

Peziza papillaris Bull. Al tronco dell'Abies excelsa DC nel bosco della Mutta. Valle Calanca (29 luglio 1869).

Peziza carnea Pers. Ai legni ed alla corteccia. Bignasco alla corteccia di un castagno (luglio 1859).

Peziza atrata Pers. an specie nova. Ai cauli e rami delle erbe. Bignasco ott. Peziza patellarium? Ai tronchi decorticati degli abeti. Bosco della Mutta Valle Calanca. Sarebbe mai una Ostropa?

Peziza resinae - mitri? [Fr.]. Ai tronchi delli Abies excelsa nel Bosco della Mutta nella Valle Calanca. Da esaminarsi.

Peziza scutellata L. var. macrochata Erb. Alla legna putrefacentesi nei luoghi umidi. Sulla terra alla salita dell'Alpe di Sfille sopra Cimalmotto, agosto. Peziza Persoonii [Moug.]. Ai cauli dell'Equisetum fluviatile al ponte di Ascona; 1860 Ott. Peziza nummularia [?]. Brontallo, ai rami, tronchi d'una pomacea, (1861 P.A.) Peziza pallescens Pers. Locarno ai fusti vecchi della Phytolacca decandra nella valletta della Madonna del Sasso. Peziza amorpha (corticium) [?]. Ai rami secchi dell'Abies pectinata nell'Alpe di Cardada 1670 (29 luglio 1863). Peziza cochleata [Huds.]. Locarno, sui legni sternati, marci di ... Peziza lycoperdiodes [?]. Ad un letamaio nella campagna di Locarno (11 ottobre 1863). Peziza vitellina [Pers.]. Ad un letamaio come sopra (11 ott. 1869). Peziza compressa Pers. [vedi no. 17]. Locarno, sulla legna secca di ottobre, Valletta di S.Biagio. Peziza virginea Pers. Valle Calanca, Bosco della Mutta, sui tronchi degli abeti, luglio. Peziza radiata [?]. Al Sasso sopra Locarno, ai cauli essiccati delle erbe. P.A. Peziza synopica [?]. Locarno ai rami d'edera secchi. 4 TRICHOLECONIUM Tricholeconium Locarno ai cauli della Convallaria Polygonatum al Sasso. Tricholeconium roseum (Sphaeria Gallii) [?]. Locarno ai cauli del Gallium (quale ?) sulla terra, al Sasso. 5 LEOTIA Leotia lubrica Pers. Locarno nei boschi e nella selva di Fregiera a Sasso. Bellinzona nella selva sotto il castello d'Unterwalden e in quella di Vigana. Sett. Ott. 6 BULGARIA Bulgaria sarcoides Fr. Locarno ai ceppi delle noci e del gelso. Loco. Bulgaria inquinans Pers. Locarno alla corteccia de tronchi della quercia abbattuta. Gordevio ott. 1863. 7 PATELLARIA Patellaria atrata Fr. Nees Syst. f.265. Locarno alla legna disseccata dei castagni. Patellaria dicolor? Locarno. 8 CENANGIUM Cenangium cerasi Fr. Locarno sui rami e tronchi dei ciliegi, perenne 9 EXCIPULA Excipula strigosa Corda. Locarno, qua e là ai cauli delle erbe. Excipula eryngii Corda Locarno. 10 HYSTERIUM Hysterium quercinum [Pers.]. Locarno, al Sasso ai rami della quercia. Hysterium herbarum Fr. (manca dall'erbario). Locarno al Sasso, frequente ai cauli dello Asclepias vincetoxicum. Hysterium speciosum Rud. (manca dall'erbario). Locarno ai rami dell'oleandro, al Sasso. Hysterium lauri [Fr.] (manca all'erbario). Locarno al Sasso, sulle foglie del Lauroceraso. Hysterium fraxini Pers. (manca all'erbario). Locarno al Sasso, ai rami dei frassino. Hysterium rubi Pers. (manca all'erbario). Locarno ai sarmenti dei rovi. Hysterium hederae Corda. Locarno. Hysterium pulicare [Pers.]. Alla corteccia di pioppi annosi; Tenero al Salciolo. Hysterium pinastri Schrad. Sulla foglia dell'Abies excelsa, Campo. Hysterium foliicolum Fr. Sulla foglia del castagno, nelle selve, di primavera. Hysterium elongatum Wahl. Sul legno scorticato della Betula alba ancor vivente. Vicini d'Albigo (7 ottobre 1861). Hysterium fraxini Pers. Arcegno ai rami di frassino caduti in luoghi umidi, ombrosi. (1861 ottobre 1). Hysterium lauricerasi [? Lauri-Fr.]. Locarno alla foglia essiccata dell'alloro. P.A. Hysterium lineare Fr. Arcegno ai pali vecchi di castagni. Hysterium fagineum-rugosum [Schrad] sin. Dichaenum rugosa Fr. sulla corteccia di faggi, frequente; Selva di Cavergno. 11 PHACIDIUM Phacidium nervisegium?. Locarno al Sasso, alla foglia del raperonzolo. Phacidium Medicaginis Desm. (manca). Locarno al Sasso, alla foglia della Lupinella. Phacidium multivalve [?] (manca). Monte Ceneri, alla foglia dell'agrifoglio. Phacidium laurocerasi [Desmz.]. Locarno al Sasso, alla foglia del lauro. 12 RHYTISMA Rhytisma acerinum Fr. Agli oppi (?) Locarno, Bignasco. Rhytisma punctatum Fr. Locarno, alla foglia dell'Acer campestris. Rhytisma violaceum (mitis)?. Giubiasco alla foglia della viola, campo S. Bartolameo (giugno 1860). 13 STICTIS Stictis radiata Pers. Locarno ai rami secchi del frassino e del sambuco.

# III GASTEROMYCETES

ΓES	
1 PHALLUS	Phallus impudicus [Mich.]. Nei prati e nelle selve d'estate e d'autunno. Alla Chiesa Von Mentlen presso S. Antonino! Nei prati Arbedo. Al Sasso; fetidissimo.
	Phallus caninus Huds. Nella selva, Rovio, per quanto mi fu riferito dal Sig. Avv. C.M. Massa.
2 CLATHRUS	Clathrus cancellatus L. Nei giardini, immondezzai, cimiteri, luoghi uggiosi. Locarno, Avegno, Contra; fetidissimo.
3 GAUTIERA	Gautiera morchelliformis Vitt. Locarno al Sasso, sulla terra a maggio.
4 TUBER	Tuber Nella selva Riva San Vitale. N.B. vuolosi anche averlo trovato alla Fraccia presso Locarno e ad Intragna.
5 RHIZOCTONIA	Rhizoctonia vitis Kunze. Nei vigneti sulle radici morte della vite.
6 CARPOBOLUS	Carpobolus stellatus Desmaz. Sulla mela vaccina, Vezia, d'autunno.
7 NIDULARIA	Nidularia striata Bull. Nei boschi sulla nuda terra e ai margini dei campi di collina.  Locarno selva di S.Biagio al Sasso. Cadenazzo, Minusio margini di campo, lungo la strada di Brione
	Nidularia laevis Hoffman. Ai legni marci, al Sasso.
	Nidularia crucibulum Fr. Ai legni marci, al Sasso di primavera.
8 GEASTER	Geaster hygranetricus Pers. Sulla terra nei boschi, al Sasso e ad Orselina sopra Locarno.
	Geaster Cesati Rabenhorst. Sulla terra erbosa tra Brione ed Orselina a solatio. Sett. 2, 1864 Pad. Agostino.
9 SCLERODERMA	Scleroderma verrucosum [Pers.]. Selva e luoghi montuosi, Locarno, Losone.
	Scleroderma bovista Fr. Locarno, selva.
	Scleroderma vulgare Fr. Nei pascoli, Locarno, Losone, Bellinzona.
10 LYCOPERDON	Lycoperdon coelatum Bull. Nei pascoli e prati, Locarno, Losone.
	Lycoperdon pusillum Batsch. Nei pascoli e prati, Locarno al Sasso.
	Lycoperdon gemmatum Pers. Nei pascoli sterili, Locarno, Losone.
	Lycoperdon dermoxanthum Vitt. Locarno, al Sasso.
	Lycoperdon muscicola Cesati. Fra i muschi sulle pietre nella selva. Locarno al Sasso,
	Bellinzona sotto il castello di Unterwalden.
	Lycoperdon hirtum [Batsch]. Fra muschi sulla terra, Locarno al Tassino.
	Lycoperdon xanthocarpum Cesati. Bellinzona pascoli umidi dietro la roccia di S. Michele. (luglio 9, 1859).
11 TULOSTOMA	Tulostana fimbriata Fr. Nei luoghi sterili, lungo la strada al Sasso sopra Locarno. Tulostana mamnosum [Pers.] Locarno, al Sasso.
12 ELAPHOMYCES	Elaphanyces granulatus [Fr.]. Nei boschi castanili, né querceti. Vezia, Locarno alla Fregiera, Rovio, non frequente.
	Elaphanyees cervinum [Fr.]. Locarno al Sasso, Padre Agostino ott. 1861.
13 LYCOGALA	Lycogala miniata Pers. Sui legni fracidi, al Sasso sopra Locarno, a Bignasco,
	d'estate. Nei faggeti dei monti di Losone. Prima rossa punteggiata di bianco, carne color minio, poi bruna.
	Lycogala epidendron L. Sui legni fracidi, al Sasso. (N.B. parmi specie identica alla
14 AETHALIUM	precedente).
	Aethalium flavum [?] (manca). Alle erbe e ai tronchi putridi. Al Sasso sopra Locarno, non frequente.
15 DIDERMA	Diderma ? Al Sasso.
16 DIDYMIUM	Didymium farinaceum Schr. Sui rami putridi, Locarno al Sasso.
17 PHYSARUM	Physarum sinuosum Dittm. Alle foglie ed ai rami, Locarno al Sasso.
	Physarum leucopus Rab. var. major. Alla foglia, rami! Locarno al Sasso.
10 000010010	Physarum farinaceum Pers. Locarno ai cauli secchi della Phytolacca decandra, ott.
18 STEMONITIS	Stemonitis fusca Roth. Ai rami marcescenti, Locarno tutto l'anno.
	Stemonitis ferruginea Chrent. Ai legni marcescenti Locarno.
	Stemonitis typhina Pers. Locarno ai tronchi marci.
10 CDIDD 4D74	Stemonitis mammosa. Legno vecchio, Locarno, rara.
19 CRIBRARIA	Cribraria argillacea. Sul legno decortificato di salici. Locarno, al Sasso.
20 ARCYRIA	Arcyria punicea Pers. Alla legna marcia ed umida. Locarno al Sasso.
	Arcyria incarnata. Ai pali della vigna, Orselina.
01 TRICIII4	Arcyria cinerea. Ai tronchi marci, al Sasso, Giugno.
21 TRICHIA	Trichia rubiformis Pers. Sui rami vecchi della legna. Locarno al Sasso. Trichia serotina Schr. Ai rami putridi, al Sasso, d'autunno.

Trichia fallax Pers. Ai rami putridi, al Sasso d'estate e d'autunno.

Trichia chrysosperma Dec. Ai rami marciti, al Sasso.

Trichia turbinata Witt. Sulla legna in putrefazione, al Sasso.

Trichia serpula Pers. Sulla legna in putrefazione, al Sasso.

Trichia nutans Bull. Locarno.

22 PERICHAENA

Perichaena strobilina Fr. Alle squame di coni di pini, abeti.

23 CRATERIUM

Craterium pedunculatum [?]. Alla foglia morta di varie piante, Al Sasso.

24 MYROTHECIUM

Myrothecium verrucaria Tod. Alle erbe, al Sasso.

 $25\ RETICULARIA$ 

Reticularia umbrina. Alla legna putrida, al Sasso.

26 ERYSIPHE

Erysiphe humuli Dec. Alla foglia dell'Humulus lupulus Avegno, agos., sett.

Erysiphe oxyacanthae Dec. Alla foglia del Crataegus oxycantha. Bignasco - ott.

Erysiphe Mali Dub. Alla foglia del melo, del ciliegio. Bignasco, ott.

Erysiphe cammuiis Link. Sulla foglia di varie piante.

Erysiphe umbelliferarum [?]. Sulla foglia dell'Heracleum sphondylium a Bignasco, ott.

Erysiphe cichoriacearum Dec. Sulla foglia del Tragopogon porrifolius coltivato,

Bellinzona, sett.

Erysiphe tortilis Link. Alla foglia del Cornus sanquinea, al Sasso.

Erysiphe lamprocarpa Link. Alla foglia del Lamium, Locarno di giugno.

Erysiphe adunca [Schl.]. Alla foglia del pioppo, Locarno.

Erysiphe aceris Dec. Alla foglia dell'oppio, Bignasco ott.

Erysiphe penicillata [Schl.] a) alni. Alla foglia dell'ontano, Cavergno ott.

Erysiphe fagi Duby. Alla foglia del faggio nelli boschi della favola (?) di Cavergno. Erysiphe guttata Link.

- a) *Coryli*. Alla pagina inferiore della foglia del nocciuolo, Cavergno, Bellinzona, Rancate, ott.-nov.
- b) Fraxini. Alla pagina inferiore delle foglie del frassino, Cavergno, Bellinzona, S Antonino alla Vigana. Sett.-ott.

Erysiphe viburni Duby. Alla pagina inferiore delle foglie del Viburnum opulus. Bignasco, ott.

Erysiphe fuliginea var. lamprocarpa [Link]. Alle foglie. Locarno.

Erysiphe leucocarpa [?]. Ivi.

Erysiphe sopedi (?). Ivi.

27 OIDIUM

Oidium fusisporioides [Fr.]. Alle foglie del Lamium? Locarno al Sasso.

Oidium erysiphoides [Fr.]. Ivi.

Oidium leucoconiun [Desco.]. Ivi.

Oidiun fructigenum [Kze.]. Ivi.

Oidium fritici (?). Sulla foglia del frumento. Ivi.

Oidium fückeri [?]. Sugli acini dell'uva, lugl.-ott. (Tosc. Melata - malattia dell'uva critogama).

Oidiun oblongum (?). Sulle foglie delle zucche. Ott. 1861 (nel mio giardino).

28 SCLEROTIUM

Sclerotium clavus [Dec.]. Ai rami del Secale urcala frequente.

Sclerotium complanatum [rode]. Alle foglie delle graminacee, al Sasso di primavera. Sclerotium varium Pers. Alle foglie putrefascenti di varie piante erbacee, Locarno, di inverno-primavera.

Sclerotium durum Pers. Alle foglie di varie piante disseccate. Locarno d'inverno, di primavera.

Sclerotium nervale Fr. Alle foglie di susini, al Sasso.

Sclerotium populinum Pers. Alle foglie dei pioppi, Belvedere sopra Locarno.

Sclerotium fulvum Fr. Ai pali della vite, al Sasso sopra Locarno.

29 CHAETOMIUM

Chaetanium globosum Kze. Alla foglia della Valeriana tripteris Locarno, al Sasso.

30 ASCOPHORA

Ascophora ... ? Alla foglia del Cornus ... al Sasso sopra Locarno.

31 MELANOSPORA

Melanospora euphorbiae [?]. Alla foglia dell'Euphorbia helioscopia.Locarno, Brione sopra Minusio, d'estate.

#### IV PYRENOMYCETES

Sect. 1

Periphericae

1 SPHAERIA

Sphaeria militaris L. Ehrb. Vezia nella selva; Bellinzona nelle selve castanili a Vigana. Ott.

Sphaeria ophioglossoides Ehrh. Locarno al Sasso sotto il Ronco già Bonanzi fra i muschi; 1860 sett.

Sphaeria concentrica Bolt. Al tronco degli ontani nell'alveo della Bavona a Bignasco, autunno e primavera.

Sphaeria fragiformis Pers. Alla corteccia dei faggi. Cavergno.

Sphaeria rufa Pers. Alla corteccia di nocciuoli, Locarno, Bellinzona.

Sphaeria granulata Sow. Alla corteccia degli alberi. Valle Bavona tra S. Carlo e Campo agli ontani. Ott. Ai frassini al Sasso.

Sphaeria citrina Pers. Ai rami disseccati dei castagni, a Bignasco.

Sphaeria typhina Pers. Alla foglia del loglio (quale?) Locarno.

Sphaeria rubiginosa Pers. Ai tronchi dei frassini, falso ebano, e dei salici, presso Locarno.

Sphaeria incrustans Pers.

Spaeria Hypoxylon L. Ehrh. Ai rami essiccati, cariosi, della betulla bianca, Bignasco.

Sphaeria (Diatrype) Borengariana De Notaris. Alpe di Cardada sopra Locarno ad un faggio scorticato e cadente. 1863 lugl. 29 A.Franz. (mio erbario).

Sect. 2 Hypophericae

Sphaeria deusta Hoffm. Ai tronchi degli alni. Valle Bavona.

Sphaeria stigma Hoffm. Ai rami di peschi, castagno, Locarno.

Sphaeria discifonnis Hoffm. Ai rami di faggio, Tenero, a Brione sopra Minusio.

Sphaeria verrucaeformis Ehrh. Alla corteccia della quercia, Locarno.

Sphaeria flave-virens Hoffm. Alla legna nell'acqua. Locarno al Sasso.

Sphaeria ceratospora Tode. Alla corteccia dei castagni. Locarno.

Sphaeria strumella Fr. Ai rami del Ribes, Locarno, Bignasco.

Sphaeria spiculosa Pers. Alla corteccia dei tigli a Locarno.

Sect. 3 Amphiphericae

Sphaeria nivea Hoffm. Alla corteccia dell'albarella, al Sasso sopra Locarno.

Sphaeria tapella Pers. Alla corteccia e ai rami dei salici a Locarno.

Sphaeria cinnabarina Tod. Alla corteccia dei tigli, Locarno.

Sphaeria coccinea Pers. Sulla corteccia del gelso a Locarno.

Sphaeria laburni Pers. Ai rami morti del Cytisus laburnum a Melano, Mendrisio.

Sphaeria elongata Fr. Ai rami del Sarothamnus scoparius a Locarno.

Sphaeria Anethi Pers. Ai cauli del finocchio né colli sopra Locarno.

Sphaeria graminis Pers. Ai cauli delle graminacee, Locarno.

Sphaeria trifolii Pers. Alla foglia di varie specie di trifoglio.

Sphaeria fimbriata Pers. Alle foglie del carpino alle Cantine presso Rancate (vista).

Sphaeria coryli Batsch. Alle foglie del nocciuolo, al Sasso sopra Locarno.

Sphaeria conica (?) coniformis Fr. ?. Ai tuffi secchi della Phytolacca decandra, Locarno, 5 ott. 1861.

Sphaeria sanguinea Sibth. Sulla legna scorticata sotto 1'acqua, al Sasso sopra Locarno.

Sphaeria spermoides Hoffm. Sul tronco di un albero reciso nella valletta di S. Biagio sopra Locarno, di primavera.

Sphaeria pulvis-pyrius Pers. Sui tronchi secchi e scorticati di castagni, degli ontani, a Locarno.

Sphaeria rostrata [rostellata Fr. ?] Tode. Sui rami dei salici alla sponda della Bavona a Bignasco. (7 apr. 1859).

Sphaeria rhodostema A.S. Sui rami del noce, al Sasso sopra Locarno.

Sphaeria ilicis Sch. Alle foglie aride dell'agrifoglio ad Orselina, sul Monte Ceneri, in Centovalli.

Sphaeria complanata Tode. Ai cauli delle erbe, Bellinzona.

Sphaeria doliolum Pers. Ai cauli delle erbe maggiori.

Sphaeria culmifraga Fries. Sul caule dell'erba, al Sasso sopra Locarno.

Sphaeria herbarum Fr. Sui cauli delle erbe, comune.

Sphaeria tubaeformis Tod. Sulle foglie dell'ontano in ott. e nov.

Sphaeria gnomon Tode. Sulle foglie caduche del nocciuolo, di primavera

Sphaeria hederae Sow. Sulle foglie dell'edera di autunno, Mendrisio, Rancate, lugl.-ott.

Sphaeria vincae Fr. Sulle foglie morte della Vinca minor. Mendrisio, ott.-nov.

Sphaeria myriadea Dec. Sulle foglie della quercia e dei castagni. Locarno, Bellinzona, Bignasco.

Sphaeria aegopodii Pers. Alle foglie dell'Aegopodium podagraria. Bellinzona, ago. Sphaeria hederaecola Fr. Alle foglie dell'edera, Locarno, Mendrisio. Sphaeria vagans Fr. Alle foglie di varie erbe. Sphaeria mori (?) misi pro interim. Alla corteccia di gelsi, Bellinzona. Sphaeria corticis Fr. Alla corteccia dei pioppi, Tenero. Sphaeria decedens Fr. S.Carlo Val Bavona fra la corteccia dell'Alnus glutinosa. Sphaeria patella Fr. Ai cauli delle ombrellifere disseccati, M.te San Giorgio. La Casina [?] ad un ombrellifera nel letto del torrente di Maggia. 1859. Sphaeria rubi Rab. Sulle foglie aride del pungitopo, a Mendrisio, Rancate. Sphaeria populi misi pro interim. Ai fittoni di pioppo secchi, Tenero. Sphaeria ceratostoma?. Locarno alla corteccia dell'Alnus glutinosa. Sphaeria convallariandea D.C. Alle foglie della Convallaria multiflora L. Bignasco giu. 1859 ai piedi del M.te del Cantone verso la Cascata. Sphaeria aurantia Pers. Ai polipori sul ceppo d'un vecchio noce poco discosto dalla cappella della natività lungo la, strada vecchia che sale alla Madonna del Sasso, Locarno, Sphaeria ovina Pers. Al Sasso, Orselina sui legni secchi all'umido. Ott. 1861 P.A. Sphaeria abietina (?) [abietis Fr. ?]. Alla corteccia dei rami del'Abies pectinata sternati o secchi. Alpe di Cardada 1670 [s.l.m.] sopra Locarno. Sphaeria dematium Pers. (da esaminarsi). Sphaeria aquila Fr. Ai rami dei salici, al Sasso. P.A. Sphaeria (Venturia) dianthii A.S. Ai cauli esiccati, particolarmente alla vagina delle foglie del Dianthus acrobulus verso Pontebrolla. (23 ott. 1866). Sphaeria numularia Dec. Brontallo alla corteccia d'una panacea; 1861, giu. P.A. Sphaeria cytisicola mitri. Alle foglie del Cytisum laburnum, Mendrisio nov. 1859. Sphaeria mori Cesati (manca all'erbario). Alli rami del gelso; Locarno. Sphaeria lignicola (an lineola?) Fr. Alli rami dell'albarella; Locarno al Sasso. Sphaeria brunnea (brunneola?) Fr. manca, Locarno. phaeria radicalis Schm. (manca). Alla corteccia dei castagni, Locarno. Sphaeria trichostana Fr. (manca). Ai colmi della segale, Bellinzona. Sphaeria complicata Waltr. Al caule della Phytolacca decanda, Locarno al Sasso. Sphaeria inquilina? (manca). Ai rami secchi dell'oppio. Sphaeria caulium Fr. Ai fusti del Chrysanthemum lineus, al Sasso sopra Locarno. Sphaeria pulchella Pers. Alla corteccia del ciliegio, Orselina. Sphaeria epidermidis Fr. var. microscopica. Alle samare del frassino; Locarno. Sphaeria urticae?. Alle ortiche, Locarno. Dothidea ribesia Pers. Ai rami morti del Ribes rubrum, Bellinzona, d'inverno. Dothidea puccinoides Dec. Ai rami ed alle foglie dell'Evonymus, del Morus, Locarno al Sasso. a) forma Mori, al gelso, b) forma Evonymi, al Evonymus. Dothidea Sambuci Pers. Ai rami secchi del Sambucus nigra. Dothidea latitans Fr. Alle foglie secche annerite del Vaccinium vitis Idaea, Orselina. Dothidea cytisicola mitri. Alla foglia del Cytisium laburnum. Mendrisio ott. 1859. Dothidea rubra Pers. Alle foglie del Prunus spinosa, Locarno, Bellinzona. Dothidea lonicerae Fr. Alle foglie della Lonicera coerulea L. sopra Campo di Valle Maggia. Agos. Dothidea anenones Dec. Alle foglie dell'Anemone nemorosa. Losone, apr. Dothidea insulpta Walbr. Ai rami d'un olmo, al Sasso sopra Locarno. Dothidea tetraspora? Ai rami secchi della vitalba. Dothidea fulva Dec. Alle foglie di prugne, di ciliegi, al Sasso sopra Locarno. Asteroma radiosum [?]. Alle foglie della rosa, al Sasso. Asteroma atratum [Chev.]. Alle foglie della Saponaria officinalis, Locarno al Sasso. 4 MYRIOCEPHALUM Myriocephalum botryosporum Mont. Alla corteccia del nocciuolo, al Sasso. Myriocephalum hederacedum De Not. Ai rami secchi dell'edera, al Sasso sopra Locarno. Lasiobotrys lonicerae Kunze. Alle foglie della Lonicera coerulea a Campo di Valle Maggia (3200) di lugl.-agos. 6 ACTINOTHYRIUM Actinothyrium graminis Kunze. Alle foglie e colmi delle graminacee, Orselina.

Sphaeria maculaeformis Pers. Sulle foglie di castagni, Locarno al Sasso.

faggi, frequente. Locarno, Cavergno.

Sphaeria punctiformis Pers. (Dipholia faginea var. alnea)? Alle foglie della quercia, di

Incertae sedis

2 DOTHIDEA

3 ASTEROMA

5 LASIOBOTRYS

7 LABRELLA	Labrella ? Alla foglia della Genziana purpurea e della Hemerocallis fulva. Al Sasso
	sopra Locarno.
8 CYTISPORA	Cytispora leucosperma Pers. Ai sarmenti del rovo, al Sasso.
	Cytispora fugax Bull. Alla corteccia dei salici, al Sasso.
9 PILIDIUM	Pilidium acerinum Kunze. Alle foglie dell'oppio, al Sasso.
10 LEPTOSTROMA	Leptostrana filicinum Fr. Agli stipiti della Pteris aquilina.

Phoma ... ? Ai cauli e capsule del tulipano, al Sasso.

# V HYPHOMYCETES

11 PHOMA

FIIOMICETES		
Cephalotrichei	1 ISARIA	Isaria felina Fr. Sullo sterco di gatti, Locarno al Sasso.
	2 CERATIUM	Ceratium hydnoydes Fr. Sulla legna in putrefazione, Locarno al Sasso
	3 MUCOR	Mucor mucedo L. Sul formaggio vecchio.
	4 BOTRYTIS	Botrytis bassiana Bals. Sui tralci da vite (calcino).
	5 ASPERGILLUS	Aspergillus glaucus Link. Sul pane ed altre materie marcescenti.

Aspergillus roseus Link. Sulla frutta, sugli acini dell'uva. 6 SPOROTRICHUM Sporotrichum?. Sulla frutta putrefacientesi.

7 SPORENDONEMA Sporendonema casei Desmaz. Alla crosta del formaggio.

8 HELMINTHOSPORIUM Helminthosporium arundinaceum [?]. Ai cauli della Phragmites vulgaris?

9 CLADOSPORIUM Cladosporium herbarum Link. Ai cauli delle piante erbacee.

Sul volume 94, 2006 del Bollettino della Società ticinese di Scienze naturali sarà riportata la parte conclusiva del manoscritto di A. Franzoni e A. Daldini.




Fig. 1 – Copertina del manoscritto redatto da Alberto Franzoni e Agostino Daldini nel 1859.




Fig. 2 – Esempio di pagina del manoscritto redatto da Alberto Franzoni e Agostino Daldini nel 1859.