

**Zeitschrift:** Bollettino della Società ticinese di scienze naturali  
**Herausgeber:** Società ticinese di scienze naturali  
**Band:** 93 (2005)

**Artikel:** Pubblicazione del manoscritto inedito "Prima nota di funghi che crescono nel cantone Ticino". Parte II  
**Autor:** Riva, Alfredo  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1003181>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 31.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

---

# Pubblicazione del manoscritto inedito

## «Prima nota di funghi che crescono nel Cantone Ticino».

### Parte II

*Nota redatta nel 1859 da Alberto Franzoni (1816-1886) e da Agostino Daldini (1817-1895)*

**Alfredo Riva**

Società micologica Carlo Benzoni di Chiasso, Via Pusterla 12, 6828 Balerna

Nel Bollettino della Società ticinese di Scienze naturali volume 92 (1-2) 2004, l'Autore ha pubblicato l'elenco dei generi riportati nel manoscritto di A. Franzoni e A. Daldini, manoscritto che risale al 1859, il più antico documento riguardante lo studio della micologia ticinese sino a oggi noto.

Qui di seguito è riprodotta una prima parte dell'elenco delle specie. Si ricorda che il testo è stato riportato come nell'originale, tralasciando unicamente le referenze bibliografiche. È stato aggiunto talvolta il nome d'Autore specie tra [ ] quando ciò era possibile e inserito degli interrogativi (?) là dove esistevano incertezze. Gli spazi con «....» sono esistenti anche nel manoscritto.

I reperti elencati in questo catalogo sono depositati al Museo cantonale di storia naturale di Lugano.

#### I HYMENOMYCETES

##### 1 AGARICUS

*Amanita*

*Agaricus caesareus* Scop. Locarno a S. Biagio, Orselina; Agos.-Sett.

*Agaricus phalloides* Fr. Orselina nei boschi.

*Agaricus muscarius* L. Locarno nei prati, campi. Orselina nei boschi. Bignasco nei boschi. Bellinzona. Boschi sopra Arcegno. 1 ott. 1861.

*Agaricus vaginatus* Bull. Locarno nei campi concimati qua e là. A Vogorno nelle selve castanili (Sett. 28).

*Lepiota*

*Agaricus procerus* Scop. Locarno nelle selve. Tenero ivi. Monti di Losone al Corti... Ott. 1861. Oss.: lamelle del fungo sviluppato eroso-dentate, odore particolare erba ma tigioso (?).

*Agaricus dypelarius* Bull. Locarno nei campi al Sasso. Ott.

*Agaricus cepaestipes* [Fr.] Locarno alla Fregiera, nei muschi sotto ai castagni.

*Agaricus granulatus* [Schaeff.] Locarno nelle località cane al no. 7.

*Agaricus velutipes* Curt. Locarno ai ceppi delle noci. 1958. Ott.-Nov.

*Agaricus laccatus* Scop. e var. *violaceus*. Locarno nelle selve di S. Biagio, al Sasso.

*Agaricus fusipes* Bull. Locarno a S. Biagio, selve castanili.

*Agaricus longipes* [Bull.] Locarno al Sasso, raro.

*Agaricus rimosus* Bull. Locarno nei prati.

*Agaricus oreades* [Fr.]. Locarno ai ceppi dei castagni e dei gelsi.

*Agaricus disseminatus* Pers. Locarno.

*Agaricus cinnamomeus* [Fr.]. Locarno

*Agaricus melleus* Pers. Locarno al piede dei frassini, noci, meli, peri, a Tenero, Bellinzona, gregario.

*Agaricus speciosus* [Fr.]. Locarno nei prati pingui.

*Agaricus camphoratus* [Bull.]. Locarno nei boschi. var. *subdulcis* Bull. Locarno nei boschi.

*Agaricus pyrogalus* [Bull.]. Locarno nei boschi.

*Agaricus vellereus* [Fr.]. Selva faginea verso il M.te di Surio [?] fini Intragna. Ott. 1861.

Oss.: ha la forma infundibuliforme col margine arrotolato e il cappello tomentoso flocculoso e il piede corto grosso-tomentoso obconico.  
[piccolo schizzo]

*Derminus*

*Agaricus crustuliniformis* Bull. [Hebeloma] Locarno ?

*Coprinarius* [?]

*Agaricus umbellatus* Locarno

2 RUSSULA

*Agaricus umbelliferus* [Fr.]. Locarno nei prati.  
*Agaricus dryophylus* [Bull.] [Collybia]. Locarno nei prati.  
*Agaricus melinoides* [Schum.] [Entoloma]. Locarno nei campi concimati.  
*Russula virescens* Pers. Locarno alla Fregiera.  
*Russula foetens* Pers. Locarno nei prati al disopra del Sasso. Brione Valletta, tra Orselina e Brione.

3 COPRINUS

4 HYGROPHORUS *Camarophyllum*

*Hygrocybe*

5 CANTHARELLUS

6 MARASMIUS

7 ASTEROPHORA

8 LENTINUS

9 PANUS

10 SCHYZOPHYLLUM

11 LENZITES

12 DEDALEA

13 BOLETUS

*Russula rubra* Fr. Locarno.  
*Russula ochroleuca* Fr. Locarno alla Fregiera.  
*Russula emetica* Pers. Locarno alla Fregiera e nei boschi.  
*Russula adusta* Pers. Locarno alla Fregiera e nei boschi.  
*Coprinus lagopus* [Fr.]. Locarno al Sasso, frutti maturi fermentati.  
*Hygrophorus virgineus* [Fr.]. Locarno al Sasso, nei prati.  
*Hygrophorus coccineus* [Fr.]. Locarno al Sasso, nei prati.  
*Hygrophorus coccineus* var. *nigrescens*. Locarno al Sasso.  
*Hygrophorus conicus* [Scop.]. Locarno.  
*Cantharellus tubaeformis* Fr. Nelle selve castanili, Bellinzona, raro.  
*Cantharellus cibarius* [Fr.]. Locarno, negli scoperti e nei prati.  
*Cantharellus muscigenus* Fr. Locarno, luoghi muscosi, sulle rupi.  
*Cantharellus cinereus* [Mer.] Pers. Locarno nella selva.  
*Cantharellus lutescens* [Mer.] Pers. Locarno nei prati sopra il Sasso; raro.  
*Cantharellus umbonatus* [Pers.] Nelle piazze di carbonaia, nei monti di Losone; 1861 ott.  
*Cantharellus aurantiacus* [Wulf.]. Locarno selve, sett.-ott.  
*Cantharellus crispus* Fr. Bignasco ai tronchi essiccati della Betulla, marzo 1858.  
*Marasmius peronatus* Bolt. Selva, tra la foglia decidua e fra muschi. Locarno, Camorino d'autunno.  
*Marasmius oreades* Bolt. Nei campi e prati, tutto l'anno, Locarno a San Biagio e verso Orselina.

*Marasmius plancus* Scop. Nelle selve tra i muschi e la foglia caduta Camorino, sett.-ott.  
*Marasmius ramealis* Bull. Ai rami di nocciuoli, Valletta di S.Biagio sopra Locarno.  
*Marasmius androsaceus* Linn. Sulla foglia degli abeti nei boschi Campo di Valle Maggia, fragile, lugl.-ott.

*Marasmius Hudsoni* Pers. Orselina, valletta da ... alla foglia sternale dello *Ilex aquifolium*. Sett. 1862 P.A. (Daldini).

*Asterophora lycoperdoides* Dittm. sin. *Nyctalis parassitica*. Brione sulla *Russula foetens*. P.A. 1862 agos.-sett. Nella valletta del Rebisale tra Brione e Orselina sulla *Russula foetens*! Ott. 1863 A. Fr.

*Lentinus cochleatus* Pers. Locarno nei campi, gregario.  
*Lentinus dryadeus*. Locarno alla legna quercina (ligneo).  
*Panus stipticus* Bull. Locarno, Bignasco, ai tronchi in putrefazione degli alni, dei nocciuoli, frequentissimo.

*Schizophyllum comune* Fr. Comunissimo al tronco disseccato di noci, delle betulle a Locarno, Bellinzona, Bignasco.

*Lenzites betulina* Linn. Locarno, Bignasco, Bellinzona, ai ceppi delle betulle, frequente.  
*Lenzites tricolor* Fr. Orselina, alla legna dei peschi.  
*Lenzites trabea* Pers. Locarno, Tenero, alla legna di abete.  
*Lenzites sepiaria* Fr. Locarno alla legna di larice.

*Dedalea quercina*. Locarno, Cavergno, Bignasco, alla legna e ceppi delle roveri.  
*Boletus aureus*. Locarno al Sasso nei prati e boschi. P. Agostino (manca all'erbario).  
*Boletus castaneus*. Locarno al Sasso, Contra. (manca all'erbario).

*Boletus piperatus* Bull. Bellinzona, selve.  
*Boletus subitanus* Linn. Locarno, al Sasso.  
*Boletus luridus* Schaeff. Locarno al Sasso, Bellinzona nelle selve. (Manca nell'erbario)  
*Boletus edulis* Bull. Locarno, Tenero, Losone, Bellinzona, frequentissimo nelle selve. Fung farré (Fung legorat). Giugno poi da lugl. a ott.

*Boletus porphyrosporus* Fr. Locarno selva d'Orselina, abeti.  
*Boletus scaber* Fr. Selva, Bellinzona.  
*Boletus brachisporus* Pers. Bellinzona, selva, sett.  
*Boletus granulatus* Linn. Bellinzona selva.  
*Boletus luteus* Linn. Locarno, selva, Valle Rovana, d'autunno.

14 POLYPORUS

*Polyporus frondosus* [Schr.]. Locarno e Vezia, Bignasco, Bellinzona, ai tronchi dei castagni, betulle, querce.  
*Polyporus varius* [Fr.] Quartino.  
*Polyporus fumosus* Fr. Orselina, ai ceppi di noci a Ronco.  
*Polyporus fulvus* Fr. Locarno ai ceppi dell'*Evonymus* e del *Rhamnus frangula*.  
*Polyporus cinnabarinus* Jacq. Locarno.  
*Polyporus picipes* Fr. Locarno alla legna di tiglio.  
*Polyporus hispidus* [Bull.]. Locarno ai gelsi.  
*Polyporus hirsutus* [Wulf.]. Locarno ai rami tutti dissecchi.  
*Polyporus appianatus* Pers. Locarno ai tronchi delle noci.  
*Polyporus obliquus* [Pers.]. Locarno al tronco dei salici e dei gelsi, al Sasso, Orselina.  
*Polyporus versicolor* [L.]. Ai ceppi delle betulle, alla legna dissecata, frequente a Locarno, Valle Maggia e Bellinzona.  
*Polyporus adustus* Wind. Locarno ai tronchi di noci e di tiglio, al Sasso  
*Polyporus abietinus* [Pers.]. Ai tronchi putrescenti dell'*Abies*, presente all'Alpe di Cardada (1670 m), 29 lugl. 1863.  
*Polyporus imbricatus* [Bull.]. Locarno ai tronchi degli alberi (autunno).  
*Polyporus arcularius* Fr. Trovato da Cesati ai tronchi della *Robinia pseudoacacia* verso Quartino e Sonvico.  
*Polyporus radula* Fr. Bellinzona, selva di Vigana, ai rami in putrefazione (sett. ott.).  
*Polyporus alveolarius* Fr. Locarno, tronco degli alberi (fu determinato da Trog per *P. brumalis* ma certo non lo è).  
*Polyporus betulinus* [Bull.]. Monti di Caramponasio in Val Cavergno al tronco del *Sorbus aucuparia*. 1856 ott. (margine tondeggianti involuto).  
*Polyporus lacteus* Fr. Locarno, ai tronchi delle betulle al piano d'Albigo lugl. ed agos.  
*Polyporus populinus* Fr. Locarno ai pioppi. (esisteva nell'erbario fu rovinato dalle tignole).  
*Polyporus velutinus* Fr. Locarno ai rami secchi delle noci. Genn.  
*Polyporus igniarius* Fr. Locarno ai tronchi dei ciliegi, Bellinzona a quello dei meli.  
*Polyporus abietinus* Fr. [già al no. 13]. Campo, tronchi dell'*Abies*, *Larix*.  
*Polyporus zonatus* Fr. Ai ceppi di castagni in decomposizione, Locarno valletta di S. Biagio.  
*Polyporus igniarius* Fr. *B. pomaceus*, ai tronchi di meli, Bellinzona, zona Vigana di S. Antonino.  
*Polyporus caperarius* Fr. Ai tronchi degli abeti, Valle Calanca bosco della Motta [o Mutta?] Cimalmotto.  
*Polyporus tamariensis*, nostri -Pileo carnoso und [?] tenui acuto reflexo, nigrescente lucido, subiumbonato, pori minutis pentagonis ? fusco ferruginei acuti. Monte Tamaro - Alpe di Cortenovo al tronco dei faggi vetusti, 1845 Aug. Set.

*Favolus europaeus* [Fr.]. Locarno al tronco di gelsi, al Sasso, Orselina.  
*Trametes cinnabarinus* (manca negli erbari). Al tronco del ciliegio, al Sasso, sopra Locarno.

*Trametes suaveolens* (manca nell'erbario). Locarno al tronco di salici vecchi.

*Fistulina hepatica* [Bull.]. Locarno, Bignasco, Bellinzona ai piedi dei tronchi dé castagni e talvolta delle roveri. Di agosto - ottobre.

*Hexagona Mori*. Ai tronchi vecchi delle siepi di robinia tra Luvino Germignaga. (1860 ott. 30).

*Hydnellum ferrugineum* Fr. (manca nell'erbario). Vezia.

*Hydnellum graveolens* Pers. Locarno al Sasso, nei boschi. Bellinzona falde di Vigana. Bignasco selva. Sett. - ott.

*Hydnellum pudorinum* Fr., *H. dichroum* Pers. Orselina al tronco delle noci.

*Hydnellum cinereum* Bull. Locarno al Sasso nelle selve. Bellinzona selva di Vigana, sett. - ott.

*Hydnellum argutum* [Fr.]. Locarno.

*Hydnellum repandum* [L.] vulgo persighin. Locarno nei boschi al Sasso. Bellinzona nelle selve castanili presso Pianezzo. Edule. Sett. - ott.

*Hydnellum niveum* [Pers.]. Ai pali e tronchi d'alberi dissecati; nella fessura della corteccia di castagni. Bellinzona e Ravecchia.

*Hydnellum tanentosum* [L.]. Locarno, valletta di Fregiera o del Sasso. Selve castanili. Sett.

*Hydnellum Erinaceus* Bull. Cevio, Vogorno, ai tronchi di castagni nella selva. Lugl. - sett.

*Hydnum coralloides* Scop. Locarno, Leventina, ai tronchi di faggi, sugli abeti rasi e scortecciati.

*Hydnum cyathiforme* Bull. Bellinzona, nella selva castanile sotto la roccia di Unterwalden. Sett.

*Hydnum farreum* Pers. Ai ceppi di castagni nei luoghi soffocati. A San Antonio di Valle Morobbia. Sett.

*Hydnum laevigatum* Swartz. Locarno selva castanile sopra S. Biagio. A Campo di Valle Maggia.

*Hydnum compactum* Pers. Bellinzona, selve castanili sopra la roccia di Unterwalden. Sett.

*Hydnum ochraceum* Pers. Locarno valletta di S. Biagio ai tronchi degli alberi.

*Hydnum velutinum* Fr. Locarno valletta di Fregiera, selva castanile, fra muschi. Sett.

*Hydnum adustum* (non Fries). Locarno alla corteccia di castagni e salici.

(Padre Agostino mandato sotto questo nome probabilmente determinato dal Cesati ma certo non è l'*adustum* di Fries).

*Hydnum zonatum*. Locarno selva di Orselina.

*Hydnum subsquamosum* [Batsch]. Ai piedi di castagni, selva sotto Orselina.

*Odonia vitalbae* Cesati. Locarno al Sasso, ai rami della *Clematis vitalba* nei luoghi ombrosi.

*Odonia bugellensis* Cesati. Bignasco ai pali vecchi di castagno della spalliera.

*Irpe fuscoviolaceus* [Fr.]. Locarno al Sasso alle schegge della legna di tiglio.

*Craterellus sinuosus* Fr. Ai ceppi di castagni a Locarno, Vezia.

*Craterellus cornucopioides* Pers. Locarno, Bellinzona, nella selva ai piedi di nocciuoli.

*Craterellus crispus* [Pers.]. Orselina, selva, sulla terra. Ott.

*Thelephora tabacina* [Fr.] (manca nell'erbario) Ai ceppi di nocciuoli, Locarno.

*Thelephora rubiginosa* [Schr.]. Locarno, Gudo, ai ceppi di castagni.

*Thelephora terrestris* Ehrh. Nella selva frondosa, Locarno selva del Sasso d'Orselina, non rara.

*Thelephora sebacea* Fr. Nella selva infesta la gramigna ed i muschi. Locarno al Sasso, Vezia (P.A.).

*Thelephora fusca* Fr. Alla corteccia di varie piante. Locarno, sopra Orselina.

*Stereum disciforme* Fr. Locarno, Bignasco, alla corteccia di nocciuoli, della betulla.

*Stereum hirsutum* Fr. Locarno, Bellinzona, ai tronchi degli alberi, ai pali

*Stereum purpureum* Pers. Tenero ai fittoni di pioppo disseccato. Ott. 11, 1859.

*Stereum rugosum* Fr. Locarno.

*Stereum sanguinolentum* [Pers.]. Locarno. var. *lilacina* ivi.

*Stereum alneum* sugli ontani, Locarno.

*Stereum disciforme* Fr. Ai tronchi della betulla, alberi recisi. Bignasco.

*Auricularia mesenterica* [Pers.]. Losone, Tenero, ai tronchi delle noci e dei susini.

*Corticium ochroleucum* Fr. Ai tronchi sugli alberi, Bignasco.

*Corticium coeruleum* Fr. Locarno, Ascona, Bellinzona, alla corteccia e sul legno nudo di pali, castagno, salice.

*Corticium cinereum* [Pers.]. Locarno, Cavergno, Bignasco.

*Corticium incarnatum* (Pers.). Locarno, sulla corteccia dell'*Hedera helix*.

*Corticium laeve* [Pers.] (manca nell'erbario). Locarno.

*Corticium lacteum* [Fr.]. Locarno, sulla corteccia del tiglio.

*Corticium alneum* [Fr.]. Locarno sulla corteccia della *Clematis vitalba*.

*Corticium roseum* Pers. Bignasco sui rami degli arbusti, sett. ott.

*Corticium sebaceum* Pers. Locarno, nei boschi di Fregiera, incrostante i muschi.

Vedi *Th. sebacea* Pers.

*Corticium comedens* [Nees]. Bignasco ai rami di noci e di castagno.

*Corticium alutaceum* Pers. Ai tronchi della *Betula alba* recisi. Bignasco di primavera e d'autunno inoltrato (mar. - nov.).

*Clavaria candida* Wein. (manca nell'erbario). Locarno nei boschi e nei prati.

*Clavaria flava* Pers. Nella selva sulla terra. Locarno sopra S. Biagio, Bignasco, Bellinzona.

*Clavaria fastigiata* Del. Nella selva tra i muschi, Locarno Fregiera.

*Clavaria muscoides* Linn. Nella selva.

*Clavaria coralloides* L. Nella Selva.

*Clavaria cristata* Holm. Locarno al Sasso, nella Selva.

## 20 ODONTIA

## 21 IRPEX

## 22 CRATERELLUS

## 23 THELEPHORA

## 24 STEREUM

## 25 AURIGULARIA

## 26 CORTICIUM

## 27 CLAVARIA

- 28 PISTILLARIA  
29 GEOGLOSSUM  
30 EXIDIA  
31 DACRYMYCES  
32 TREMELLA  
33 GUEPINIA  
34 CALOCERA  
35 HYPOCHNUS

*Clavaria aurea* Schaeff. Selva sopra Locarno (per la cima dei rami tubulati si avvicina alla *muscodies*).  
*Clavaria mucida* Pers. Selva di S. Biagio sopra Locarno. Ott. fra i muschi.  
*Clavaria vernalis* Schwein. Sulla riva aggrottata lungo i torrenti dell'Alpi. Sulla terra Alpe di Stabiorello, Valle Calanca, 29 luglio 1859 alta 4-5 centimetri - larga una.  
*Pistillaria micans* Pers. Locarno ai rami vecchi dell'*Antirrhinum majus*.  
*Geoglossum hirsutum* [Pers.]. Locarno e Vezia nei prati arenosi.  
*Exidia auricola* [Fr.]. Locarno ai tronchi del sambuco e dell'oppio.  
*Exidia glandulosa* [Fr.]. Minusio sulla corteccia del noce.  
*Dacrymyces stillatus - urticae* Rabenh. Sui ceppi putrescenti della *Urtica dioica*.  
*Dacrymyces stillatus* [Nees]. Frequentemente alla tavola esposta all'umidità, alla legna. Locarno, anche nel mio giardino.  
*Dacrymyces deliquescens* Duby. Alla legna di abete scorticato o fabbricato. Locarno. Boschi di Cimalmotto, sui tronchi degli alberi scorticati, dopo pioggia; sett. 1860.  
*Tremella aurantia* Schwein. Locarno. Vai Sambuco, sulli tronchi in putrefazione, sulla tavola e sulla corteccia.  
*Tremella sarcoides* [With.]. Ai tronchi di faggi, a Gudo e a Locarno.  
*Guepinia helvelloides* Fr. Monte Tamara, Alpe di Cortenovo al piede di un faggio. Giugno.  
*Calocera tricolor* Franzoni. Gelatinoso, cartilaginea, secca cornea, sun. (duplicata)? e talvolta forcuta, solitaria, allungata, quasi lineare, schiacciata, poco contorta, base cinta da un tomentoso fuliginoso, clava cenerognola o biancastra, anche rugosa, apice linguiforme, giallo carnicino. Stirpe elegante, lungo 3-4 cent. Cresce nelle selve sui legni? fra muschi. Locarno al Sasso scoperto dal Rvd Padre Agostino e comunicatomi nel 1859. [Cancellata e scritto in seguito: è la *Sphaeria Hypoxylon* in stato giovanile.]  
*Hypochnus violaceo cinctus* [?]. Ai tronchi decorticati dei castagni. Mendrisio, selva lungo la strada vecchia di Castello.

## II DISCOMYCETES

- 1 *MORCHELLA*  
*Morchella esculenta* Pers. Locarno nè Saleggi. Tenero. Bellinzona  
*Morchella conica*. Locarno. Biasca.  
*Morchella inflata*. Locarno, prati di Losone.  
2 *HELVELLA*  
*Helvella lacunosa* Afzed. Locarno al Sasso sulla terra del margine delle selve. Sett.  
*Helvella crispa* Fr. (manca nell'erbario). Locarno al Sasso presso le Cappelle al di sopra del Convento lungo la strada che conduce ai Monti. Tenero presso la Cartiera.  
*Helvella infula* Schaeff. Tenero alla Cartiera, luoghi ombrosi, arenosi umidi. (23 sett. 1862).  
*Helvella elastica* [Bull.]. Locarno al Sasso.  
3 *PEZIZA*  
*Peziza leporina* [Batsch]. Locarno al Sasso. Nel concio di campi di pomi di terra, frequente.  
*Peziza macropus* [Pers.] (manca nell'erbario). Locarno nelli fossati sopra il Sasso; rara.  
*Peziza echinophila* [Bull.]. Locarno fra i ricci [poi cancellato e sostituito con gli involucri] della castagna in putrefazione; frequente. Ott.- Marzo.  
*Peziza cupularis* L. Selva ai Sasso, San Biagio, Locarno.  
*Peziza umbrorum* Fr. Sulla terra nella selva, Locarno a S. Biagio, ott.  
*Peziza hirta* Schum. Sulla terra arenosa dopo la pioggia, Locarno.  
*Peziza vulgaris* Fr. Ai rami secchi di salice, Locarno, ott.  
*Peziza bufonia* Pers. Locarno, selva sopra S. Biagio, di primavera.  
*Peziza papillaris* Bull. Al tronco dell'*Abies excelsa* DC nel bosco della Mutta. Valle Calanca (29 luglio 1869).  
*Peziza carnea* Pers. Ai legni ed alla corteccia. Bignasco alla corteccia di un castagno (luglio 1859).  
*Peziza atrata* Pers. an specie nova. Ai cauli e rami delle erbe. Bignasco ott.  
*Peziza patellarium* ? Ai tronchi decorticati degli abeti. Bosco della Mutta Valle Calanca. Sarebbe mai una Ostropa ?  
*Peziza resinae - mitri* ? [Fr.]. Ai tronchi dell'*Abies excelsa* nel Bosco della Mutta nella Valle Calanca. Da esaminarsi.

*Peziza scutellata* L. var. *macrochata* Erb. Alla legna putrefacentesi nei luoghi umidi.

Sulla terra alla salita dell'Alpe di Sfile sopra Cimalmotto, agosto.

*Peziza Persoonii* [Moug.]. Ai cauli dell'Equisetum fluviatile al ponte di Ascona; 1860 Ott.

*Peziza nummularia* [?]. Brontallo, ai rami, tronchi d'una pomacea, (1861 P.A.)

*Peziza pallescens* Pers. Locarno ai fusti vecchi della *Phytolacca decandra* nella valletta della Madonna del Sasso.

*Peziza amorphula* (*corticium*) [?]. Ai rami secchi dell'Abies pectinata nell'Alpe di Cardada 1670 (29 luglio 1863).

*Peziza cochleata* [Huds.]. Locarno, sui legni sternati, marci di ...

*Peziza lycoperdioides* [?]. Ad un letamaio nella campagna di Locarno (11 ottobre 1863).

*Peziza vitellina* [Pers.]. Ad un letamaio come sopra (11 ott. 1869).

*Peziza compressa* Pers. [vedi no. 17]. Locarno, sulla legna secca di ottobre, Valletta di S.Biagio.

*Peziza virginea* Pers. Valle Calanca, Bosco della Mutta, sui tronchi degli abeti, luglio.

*Peziza radiata* [?]. Al Sasso sopra Locarno, ai cauli essiccati delle erbe. P.A.

*Peziza synopica* [?]. Locarno ai rami d'edera secchi.

4 *TRICHOLECONIUM* *Tricholeconium* Locarno ai cauli della *Convallaria Polygonatum* al Sasso.

*Tricholeconium roseum* (*Sphaeria Gallii*) [?]. Locarno ai cauli del *Gallium* (quale ?) sulla terra, al Sasso.

5 *LEOTIA* *Leotia lubrica* Pers. Locarno nei boschi e nella selva di Fregiera a Sasso. Bellinzona nella selva sotto il castello d'Unterwalden e in quella di Vigana. Sett. Ott.

6 *BULGARIA* *Bulgaria sarcoïdes* Fr. Locarno ai ceppi delle noci e del gelso. Loco.

*Bulgaria inquinans* Pers. Locarno alla corteccia de tronchi della quercia abbattuta. Gordevio ott. 1863.

7 *PATELLARIA* *Patellaria atrata* Fr. Nees Syst. f.265. Locarno alla legna disseccata dei castagni.

*Patellaria decolor* ? Locarno.

*Cenangium cerasi* Fr. Locarno sui rami e tronchi dei ciliegi, perenne

*Excipula strigosa* Corda. Locarno, qua e là ai cauli delle erbe.

*Excipula eryngii* Corda Locarno.

*Hysterium quercinum* [Pers.]. Locarno, al Sasso ai rami della quercia.

*Hysterium herbarum* Fr. (manca dall'erbario). Locarno al Sasso, frequente ai cauli dello *Asclepias vincetoxicum*.

*Hysterium speciosum* Rud. (manca dall'erbario). Locarno ai rami dell'oleandro, al Sasso.

*Hysterium lauri* [Fr.] (manca all'erbario). Locarno al Sasso, sulle foglie del *Lauroceraso*.

*Hysterium fraxini* Pers. (manca all'erbario). Locarno al Sasso, ai rami dei frassino.

*Hysterium rubi* Pers. (manca all'erbario). Locarno ai sarmenti dei rovi.

*Hysterium hederae* Corda. Locarno.

*Hysterium pulicare* [Pers.]. Alla corteccia di pioppi annosi; Tenero al Salciolo.

*Hysterium pinastri* Schrad. Sulla foglia dell'Abies excelsa, Campo.

*Hysterium foliicolum* Fr. Sulla foglia del castagno, nelle selve, di primavera.

*Hysterium elongatum* Wahl. Sul legno scorticato della *Betula alba* ancor vivente.

Vicini d'Albigo (7 ottobre 1861).

11 *PHACIDIUM* *Phacidium nervisequum* ?. Locarno al Sasso, alla foglia del raperonzolo.

*Phacidium Medicaginis* Desm. (manca). Locarno al Sasso, alla foglia della *Lupinella*.

*Phacidium multivalve* [?] (manca). Monte Ceneri, alla foglia dell'agrifoglio.

*Phacidium laurocerasi* [Desmz.]. Locarno al Sasso, alla foglia del lauro.

*Rhytisma acerinum* Fr. Agli oppi (?) Locarno, Bignasco.

*Rhytisma punctatum* Fr. Locarno, alla foglia dell'*Acer campestris*.

*Rhytisma violaceum* (mitis) ?. Giubiasco alla foglia della viola, campo S. Bartolomeo (giugno 1860).

12 *RHYTTISMA* *Stictis radiata* Pers. Locarno ai rami secchi del frassino e del sambuco.

## III GASTEROMYCETES

- 1 *PHALLUS* *Phallus impudicus* [Mich.]. Nei prati e nelle selve d'estate e d'autunno. Alla Chiesa Von Mentlen presso S. Antonino! Nei prati Arbedo. Al Sasso; fetidissimo. *Phallus caninus* Huds. Nella selva, Rovio, per quanto mi fu riferito dal Sig. Avv. C.M. Massa.
- 2 *CLATHRUS* *Clathrus cancellatus* L. Nei giardini, immondezzai, cimiteri, luoghi uggiosi. Locarno, Avegno, Contra; fetidissimo.
- 3 *GAUTIERA* *Gautiera morchelliformis* Vitt. Locarno al Sasso, sulla terra a maggio.
- 4 *TUBER* *Tuber* ... Nella selva ... Riva San Vitale. N.B. vuolosi anche averlo trovato alla Fraccia presso Locarno e ad Intragna.
- 5 *RHIZOCTONIA* *Rhizoctonia vitis* Kunze. Nei vigneti sulle radici morte della vite.
- 6 *CARPOBOLUS* *Carpobolus stellatus* Desmaz. Sulla mela vaccina, Vezia, d'autunno.
- 7 *NIDULARIA* *Nidularia striata* Bull. Nei boschi sulla nuda terra e ai margini dei campi di collina. Locarno selva di S.Biagio al Sasso. Cadenazzo, Minusio margini di campo, lungo la strada di Brione
- 8 *GEASTER* *Nidularia laevis* Hoffman. Ai legni marci, al Sasso.
- 9 *SCLERODERMA* *Scleroderma verrucosum* [Pers.]. Selva e luoghi montuosi, Locarno, Losone. *Scleroderma bovista* Fr. Locarno, selva.
- 10 *LYCOPERDON* *Scleroderma vulgare* Fr. Nei pascoli, Locarno, Losone, Bellinzona. *Lycoperdon coelatum* Bull. Nei pascoli e prati, Locarno, Losone. *Lycoperdon pusillum* Batsch. Nei pascoli e prati, Locarno al Sasso. *Lycoperdon gemmatum* Pers. Nei pascoli sterili, Locarno, Losone. *Lycoperdon dermoxanthum* Vitt. Locarno, al Sasso. *Lycoperdon muscicola* Cesati. Fra i muschi sulle pietre nella selva. Locarno al Sasso, Bellinzona sotto il castello di Unterwalden. *Lycoperdon hirtum* [Batsch]. Fra muschi sulla terra, Locarno al Tassino. *Lycoperdon xanthocarpum* Cesati. Bellinzona pascoli umidi dietro la roccia di S. Michele. (luglio 9, 1859).
- 11 *TULOSTOMA* *Tulostoma fimbriata* Fr. Nei luoghi sterili, lungo la strada al Sasso sopra Locarno. *Tulostoma mammosum* [Pers.] Locarno, al Sasso.
- 12 *ELAPHOMYCES* *Elaphanyces granulatus* [Fr.]. Nei boschi castanili, né querceti. Vezia, Locarno alla Fregiera, Rovio, non frequente.
- 13 *LYCOGALA* *Elaphanyces cervinum* [Fr.]. Locarno al Sasso, Padre Agostino ott. 1861. *Lycogala miniata* Pers. Sui legni fracidi, al Sasso sopra Locarno, a Bignasco, d'estate. Nei faggeti dei monti di Losone. Prima rossa punteggiata di bianco, carne color minio, poi bruna. *Lycogala epidendron* L. Sui legni fracidi, al Sasso. (N.B. parmi specie identica alla precedente).
- 14 *AETHALIUM* *Aethalium flavum* [?] (manca). Alle erbe e ai tronchi putridi. Al Sasso sopra Locarno, non frequente.
- 15 *DIDERMA* *Diderma* ... ? Al Sasso.
- 16 *DIDYMIUM* *Didymium farinaceum* Schr. Sui rami putridi, Locarno al Sasso.
- 17 *PHYSARUM* *Physarum sinuosum* Dittm. Alle foglie ed ai rami, Locarno al Sasso. *Physarum leucopus* Rab. var. major. Alla foglia, rami! Locarno al Sasso.
- 18 *STEMONITIS* *Physarum farinaceum* Pers. Locarno ai cauli secchi della *Phytolacca decandra*, ott. *Stemonitis fusca* Roth. Ai rami marcescenti, Locarno tutto l'anno. *Stemonitis ferruginea* Chrent. Ai legni marcescenti Locarno. *Stemonitis typhina* Pers. Locarno ai tronchi marci. *Stemonitis mammosa*. Legno vecchio, Locarno, rara.
- 19 *CRIBRARIA* *Cribaria argillacea*. Sul legno decortificato di salici. Locarno, al Sasso.
- 20 *ARCYRIA* *Arcyria punicea* Pers. Alla legna marcia ed umida. Locarno al Sasso. *Arcyria incarnata*. Ai pali della vigna, Orselina.
- 21 *TRICHLIA* *Arcyria cinerea*. Ai tronchi marci, al Sasso, Giugno. *Trichia rubiformis* Pers. Sui rami vecchi della legna. Locarno al Sasso. *Trichia serotina* Schr. Ai rami putridi, al Sasso, d'autunno.

		<i>Trichia fallax</i> Pers. Ai rami putridi, al Sasso d'estate e d'autunno.
		<i>Trichia chrysosperma</i> Dec. Ai rami marciti, al Sasso.
		<i>Trichia turbinata</i> Witt. Sulla legna in putrefazione, al Sasso.
		<i>Trichia serpula</i> Pers. Sulla legna in putrefazione, al Sasso.
		<i>Trichia nutans</i> Bull. Locarno.
22	<i>PERICHAENA</i>	<i>Perichaena strobilina</i> Fr. Alle squame di coni di pini, abeti.
23	<i>CRATERIUM</i>	<i>Craterium pedunculatum</i> [?]. Alla foglia morta di varie piante, Al Sasso.
24	<i>MYROTHECIUM</i>	<i>Myrothecium verrucaria</i> Töd. Alle erbe, al Sasso.
25	<i>RETICULARIA</i>	<i>Reticularia umbrina</i> . Alla legna putrida, al Sasso.
26	<i>ERYSIPHE</i>	<i>Erysiphe humuli</i> Dec. Alla foglia dell' <i>Humulus lupulus</i> Avegno, agos., sett.
		<i>Erysiphe oxyacantheae</i> Dec. Alla foglia del <i>Crataegus oxyacantha</i> . Bignasco - ott.
		<i>Erysiphe Mali</i> Dub. Alla foglia del melo, del ciliegio. Bignasco, ott.
		<i>Erysiphe cammuii</i> Link. Sulla foglia di varie piante.
		<i>Erysiphe umbelliferarum</i> [?]. Sulla foglia dell' <i>Heracleum sphondylium</i> a Bignasco, ott.
		<i>Erysiphe cichoriacearum</i> Dec. Sulla foglia del <i>Tragopogon porrifolius</i> coltivato, Bellinzona, sett.
		<i>Erysiphe tortilis</i> Link. Alla foglia del <i>Cornus sanguinea</i> , al Sasso.
		<i>Erysiphe lamprocarpa</i> Link. Alla foglia del <i>Lamium</i> , Locarno di giugno.
		<i>Erysiphe adunca</i> [Schl.]. Alla foglia del pioppo, Locarno.
		<i>Erysiphe aceris</i> Dec. Alla foglia dell'oppio, Bignasco ott.
		<i>Erysiphe penicillata</i> [Schl.] a) alni. Alla foglia dell'ontano, Cavergno ott.
		<i>Erysiphe fagi</i> Duby. Alla foglia del faggio nelli boschi della favola (?) di Cavergno.
		<i>Erysiphe guttata</i> Link.
		a) <i>Coryli</i> . Alla pagina inferiore della foglia del nocciuolo, Cavergno, Bellinzona, Rancate, ott.-nov.
		b) <i>Fraxini</i> . Alla pagina inferiore delle foglie del frassino, Cavergno, Bellinzona, S Antonino alla Vigana. Sett.-ott.
		<i>Erysiphe viburni</i> Duby. Alla pagina inferiore delle foglie del <i>Viburnum opulus</i> . Bignasco, ott.
		<i>Erysiphe fuliginea</i> var. <i>lamprocarpa</i> [Link]. Alle foglie. Locarno.
		<i>Erysiphe leucocarpa</i> [?]. Ivi.
		<i>Erysiphe sopedi</i> (?). Ivi.
27	<i>OIDIUM</i>	<i>Oidium fusisporoides</i> [Fr.]. Alle foglie del <i>Lamium</i> ? Locarno al Sasso.
		<i>Oidium erysiphoides</i> [Fr.]. Ivi.
		<i>Oidium leucoconium</i> [Desco.]. Ivi.
		<i>Oidium fructigenum</i> [Kze.]. Ivi.
		<i>Oidium fritici</i> (?). Sulla foglia del frumento. Ivi.
		<i>Oidium fückeri</i> [?]. Sugli acini dell'uva, lugl.-ott. (Tosc. Melata - malattia dell'uva critogama).
		<i>Oidium oblongum</i> (?). Sulle foglie delle zucche. Ott. 1861 (nel mio giardino).
28	<i>SCLEROTIUM</i>	<i>Sclerotium clavus</i> [Dec.]. Ai rami del <i>Secale urcala</i> frequente.
		<i>Sclerotium complanatum</i> [rode]. Alle foglie delle graminacee, al Sasso di primavera.
		<i>Sclerotium varium</i> Pers. Alle foglie putrefascenti di varie piante erbacee, Locarno, di inverno-primavera.
		<i>Sclerotium durum</i> Pers. Alle foglie di varie piante disseccate. Locarno d'inverno, di primavera.
		<i>Sclerotium nervale</i> Fr. Alle foglie di susini, al Sasso.
		<i>Sclerotium populinum</i> Pers. Alle foglie dei pioppi, Belvedere sopra Locarno.
		<i>Sclerotium fulvum</i> Fr. Ai pali della vite, al Sasso sopra Locarno.
29	<i>CHAETOMIUM</i>	<i>Chaetaniun globosum</i> Kze. Alla foglia della <i>Valeriana tripteris</i> Locarno, al Sasso.
30	<i>ASCOPHORA</i>	<i>Ascophora</i> ... ? Alla foglia del <i>Cornus</i> ... al Sasso sopra Locarno.
31	<i>MELANOSPORA</i>	<i>Melanospora euphorbiae</i> [?]. Alla foglia dell' <i>Euphorbia helioscopia</i> . Locarno, Brione sopra Minusio, d'estate.

#### IV PYRENOMYCETES

Sect. 1

Peripheriae

1 *SPHAERIA*

*Sphaeria militaris* L. Ehrb. Vezia nella selva; Bellinzona nelle selve castanili a Vigana. Ott.

- Sphaeria ophioglossoides* Ehrh. Locarno al Sasso sotto il Ronco già Bonanzi fra i muschi; 1860 sett.  
*Sphaeria concentrica* Bolt. Al tronco degli ontani nell'alveo della Bavona a Bignasco, autunno e primavera.  
*Sphaeria fragiformis* Pers. Alla corteccia dei faggi. Cavergno.  
*Sphaeria rufa* Pers. Alla corteccia di nocciuoli, Locarno, Bellinzona.  
*Sphaeria granulata* Sow. Alla corteccia degli alberi. Valle Bavona tra S. Carlo e Campo agli ontani. Ott. Ai frassini al Sasso.  
*Sphaeria citrina* Pers. Ai rami disseccati dei castagni, a Bignasco.  
*Sphaeria typhina* Pers. Alla foglia del loglio (quale?) Locarno.  
*Sphaeria rubiginosa* Pers. Ai tronchi dei frassini, falso ebano, e dei salici, presso Locarno.  
*Sphaeria incrustans* Pers.  
*Sphaeria Hypoxylon* L. Ehrh. Ai rami essiccati, cariosi, della betulla bianca, Bignasco.  
*Sphaeria (Diatrype) Borengariana* De Notaris. Alpe di Cardada sopra Locarno ad un faggio scorticato e cadente. 1863 lugl. 29 A.Franz. (mio erbario).

Sect. 2

Hypophericae

- Sphaeria deusta* Hoffm. Ai tronchi degli alni. Valle Bavona.  
*Sphaeria stigma* Hoffm. Ai rami di peschi, castagno, Locarno.  
*Sphaeria discifonnis* Hoffm. Ai rami di faggio, Tenero, a Brione sopra Minusio.  
*Sphaeria verrucaformis* Ehrh. Alla corteccia della quercia, Locarno.  
*Sphaeria flave-virens* Hoffm. Alla legna nell'acqua. Locarno al Sasso.  
*Sphaeria ceratospora* Tode. Alla corteccia dei castagni. Locarno.  
*Sphaeria strumella* Fr. Ai rami del Ribes, Locarno, Bignasco.  
*Sphaeria spiculosa* Pers. Alla corteccia dei tigli a Locarno.

Sect. 3

Amphiphericae

- Sphaeria nivea* Hoffm. Alla corteccia dell'albarella, al Sasso sopra Locarno.  
*Sphaeria tapella* Pers. Alla corteccia e ai rami dei salici a Locarno.  
*Sphaeria cinnabrina* Tod. Alla corteccia dei tigli, Locarno.  
*Sphaeria coccinea* Pers. Sulla corteccia del gelso a Locarno.  
*Sphaeria laburni* Pers. Ai rami morti del *Cytisus laburnum* a Melano, Mendrisio.  
*Sphaeria elongata* Fr. Ai rami del *Sarothamnus scoparius* a Locarno.  
*Sphaeria Anethi* Pers. Ai cauli del finocchio né colli sopra Locarno.  
*Sphaeria graminis* Pers. Ai cauli delle graminacee, Locarno.  
*Sphaeria trifolii* Pers. Alla foglia di varie specie di trifoglio.  
*Sphaeria fimbriata* Pers. Alle foglie del carpino alle Cantine presso Rancate (vista).  
*Sphaeria coryli* Batsch. Alle foglie del nocciuolo, al Sasso sopra Locarno.  
*Sphaeria conica* (?) *coniformis* Fr. ?. Ai tuffi secchi della *Phytolacca decandra*, Locarno, 5 ott. 1861.  
*Sphaeria sanguinea* Sibth. Sulla legna scorticata sotto l'acqua, al Sasso sopra Locarno.  
*Sphaeria spermoidea* Hoffm. Sul tronco di un albero reciso nella valletta di S. Biagio sopra Locarno, di primavera.  
*Sphaeria pulvis-pyrius* Pers. Sui tronchi secchi e scorticati di castagni, degli ontani, a Locarno.  
*Sphaeria rostrata* [rostellata Fr. ?] Tode. Sui rami dei salici alla sponda della Bavona a Bignasco. (7 apr. 1859).  
*Sphaeria rhodostoma* A.S. Sui rami del noce, al Sasso sopra Locarno.  
*Sphaeria ilicis* Sch. Alle foglie aride dell'agrifoglio ad Orselina, sul Monte Ceneri, in Centovalli.  
*Sphaeria complanata* Tode. Ai cauli delle erbe, Bellinzona.  
*Sphaeria dololum* Pers. Ai cauli delle erbe maggiori.  
*Sphaeria culmifraga* Fries. Sul caule dell'erba, al Sasso sopra Locarno.  
*Sphaeria herbarum* Fr. Sui cauli delle erbe, comune.  
*Sphaeria tubaiformis* Tod. Sulle foglie dell'ontano in ott. e nov.  
*Sphaeria gnomon* Tode. Sulle foglie caduche del nocciuolo, di primavera.  
*Sphaeria hederae* Sow. Sulle foglie dell'edera di autunno, Mendrisio, Rancate, lugl.-ott.  
*Sphaeria vincae* Fr. Sulle foglie morte della Vinca minor. Mendrisio, ott.-nov.  
*Sphaeria myriadea* Dec. Sulle foglie della quercia e dei castagni. Locarno, Bellinzona, Bignasco.

- Sphaeria maculaformis* Pers. Sulle foglie di castagni, Locarno al Sasso.  
*Sphaeria punctiformis* Pers. (*Diphloia faginea* var. *alnea*) ? Alle foglie della quercia, di faggi, frequente. Locarno, Cavergno.  
*Sphaeria aegopodii* Pers. Alle foglie dell'*Aegopodium podagraria*. Bellinzona, ago.  
*Sphaeria hederaecola* Fr. Alle foglie dell'edera, Locarno, Mendrisio.  
*Sphaeria vagans* Fr. Alle foglie di varie erbe.  
*Sphaeria mori* (?) misi pro interim. Alla corteccia di gelsi, Bellinzona.  
*Sphaeria corticis* Fr. Alla corteccia dei pioppi, Tenero.  
*Sphaeria decedens* Fr. S.Carlo Val Bavona fra la corteccia dell'*Alnus glutinosa*.  
*Sphaeria patella* Fr. Ai cauli delle ombrellifere dissecati, M.te San Giorgio. La Casina [?] ad un ombrellifera nel letto del torrente di Maggia. 1859.  
*Sphaeria rubi* Rab. Sulle foglie aride del pungitopo, a Mendrisio, Rancate.  
*Sphaeria populi* misi pro interim. Ai fittoni di pioppo secchi, Tenero.  
*Sphaeria ceratostoma* ?. Locarno alla corteccia dell'*Alnus glutinosa*.  
*Sphaeria convallariandea* D.C. Alle foglie della *Convallaria multiflora* L. Bignasco giu. 1859 ai piedi del M.te del Cantone verso la Cascata.  
*Sphaeria aurantia* Pers. Ai polipori sul ceppo d'un vecchio noce poco discosto dalla cappella della natività lungo la, strada vecchia che sale alla Madonna del Sasso. Locarno.  
*Sphaeria ovina* Pers. Al Sasso, Orselina sui legni secchi all'umido. Ott. 1861 P.A.  
*Sphaeria abietina* (?) [*abietis* Fr. ?]. Alla corteccia dei rami del *Abies pectinata* sternati o secchi. Alpe di Cardada 1670 [s.l.m.] sopra Locarno.  
*Sphaeria dematium* Pers. (da esaminarsi).  
*Sphaeria aquila* Fr. Ai rami dei salici, al Sasso. P.A.  
*Sphaeria (Venturia) dianthii* A.S. Ai cauli esiccati, particolarmente alla vagina delle foglie del *Dianthus acrobulus* verso Pontebrolla. (23 ott. 1866).  
*Sphaeria numularia* Dec. Brontallo alla corteccia d'una panacea; 1861, giu. P.A.  
*Sphaeria cytisicola mitri*. Alle foglie del *Cytisum laburnum*, Mendrisio nov. 1859.  
*Sphaeria mori* Cesati (manca all'erbario). Alli rami del gelso; Locarno.  
*Sphaeria lignicola* (an lineola?) Fr. Alli rami dell'albarella; Locarno al Sasso.  
*Sphaeria brunnea* (*brunneola*?) Fr. manca, Locarno.  
*Sphaeria radicalis* Schm. (manca). Alla corteccia dei castagni, Locarno.  
*Sphaeria trichostana* Fr. (manca). Ai colmi della segale, Bellinzona.  
*Sphaeria complicata* Waltr. Al caule della *Phytolacca decanda*, Locarno al Sasso.  
*Sphaeria inquilina* ? (manca). Ai rami secchi dell'oppio.  
*Sphaeria caulinum* Fr. Ai fusti del *Chrysanthemum lineus*, al Sasso sopra Locarno.  
*Sphaeria pulchella* Pers. Alla corteccia del ciliegio, Orselina.  
*Sphaeria epidermidis* Fr. var. *microscopica*. Alle samare del frassino; Locarno.  
*Sphaeria urticae* ?. Alle ortiche, Locarno.  
*Dothidea ribesia* Pers. Ai rami morti del *Ribes rubrum*, Bellinzona, d'inverno.  
*Dothidea puccinoides* Dec. Ai rami ed alle foglie dell'*Eonymus*, del *Morus*, Locarno al Sasso. a) forma Mori, al gelso, b) forma *Eonymi*, al *Eonymus*.  
*Dothidea Sambuci* Pers. Ai rami secchi del *Sambucus nigra*.  
*Dothidea latitans* Fr. Alle foglie secche annerite del *Vaccinium vitis Idaea*, Orselina.  
*Dothidea cytisicola mitri*. Alla foglia del *Cytisum laburnum*. Mendrisio ott. 1859.  
*Dothidea rubra* Pers. Alle foglie del *Prunus spinosa*, Locarno, Bellinzona.  
*Dothidea lonicerae* Fr. Alle foglie della *Lonicera coerulea* L. sopra Campo di Valle Maggia. Agos.  
*Dothidea anenones* Dec. Alle foglie dell'*Anemone nemorosa*. Losone, apr.  
*Dothidea insulpta* Walbr. Ai rami d'un olmo, al Sasso sopra Locarno.  
*Dothidea tetraspora* ? Ai rami secchi della vitalba.  
*Dothidea fulva* Dec. Alle foglie di prugne, di ciliegi, al Sasso sopra Locarno.  
**3 ASTEROMA**  
*Asteroma radiosum* [?]. Alle foglie della rosa, al Sasso.  
*Asteroma atratum* [Chev.]. Alle foglie della *Saponaria officinalis*, Locarno al Sasso.  
**4 MYRIOCEPHALUM** *Myrioccephalum botryosporum* Mont. Alla corteccia del nocciuolo, al Sasso.  
*Myrioccephalum hederaceum* De Not. Ai rami secchi dell'edera, al Sasso sopra Locarno.  
**5 LASIOBOTRYS** *Lasiobotrys lonicerae* Kunze. Alle foglie della *Lonicera coerulea* a Campo di Valle Maggia (3200) di lugl.-agos.  
**6 ACTINOTHYRIUM** *Actinothyrium graminis* Kunze. Alle foglie e colmi delle graminacee, Orselina.

7 <i>LABRELLA</i>	<i>Labrella</i> ... ? Alla foglia della <i>Genziana purpurea</i> e della <i>Hemerocallis fulva</i> . Al Sasso sopra Locarno.
8 <i>CYTISPORA</i>	<i>Cytispora leucosperma</i> Pers. Ai sarmenti del rovo, al Sasso.
9 <i>PILIDIUM</i>	<i>Cytispora fugax</i> Bull. Alla corteccia dei salici, al Sasso.
10 <i>LEPTOSTROMA</i>	<i>Pilidium acerinum</i> Kunze. Alle foglie dell'oppio, al Sasso.
11 <i>PHOMA</i>	<i>Leptostrana filicinum</i> Fr. Agli stipiti della <i>Pteris aquilina</i> .
	<i>Phoma</i> ... ? Ai cauli e capsule del tulipano, al Sasso.

V HYPHOMYCETES

Cephalotrichei	1 <i>ISARIA</i>	<i>Isaria felina</i> Fr. Sullo sterco di gatti, Locarno al Sasso.
	2 <i>CERATIUM</i>	<i>Ceratium hydnoides</i> Fr. Sulla legna in putrefazione, Locarno al Sasso
	3 <i>MUCOR</i>	<i>Mucor mucedo</i> L. Sul formaggio vecchio.
	4 <i>BOTRYTIS</i>	<i>Botrytis bassiana</i> Bals. Sui tralci da vite (calcino).
	5 <i>ASPERGILLUS</i>	<i>Aspergillus glaucus</i> Link. Sul pane ed altre materie marcescenti.
		<i>Aspergillus roseus</i> Link. Sulla frutta, sugli acini dell'uva.
	6 <i>SPOROTRICHUM</i>	<i>Sporotrichum</i> ?. Sulla frutta putrefacentesi.
	7 <i>SPORENDONEMA</i>	<i>Sporendonema casei</i> Desmaz. Alla crosta del formaggio.
	8 <i>HELMINTHOSPORIUM</i>	<i>Helminthosporium arundinaceum</i> [?]. Ai cauli della <i>Phragmites vulgaris</i> ?
	9 <i>CLADOSPORIUM</i>	<i>Cladosporium herbarum</i> Link. Ai cauli delle piante erbacee.

Sul volume 94, 2006 del Bollettino della Società ticinese di Scienze naturali sarà riportata la parte conclusiva del manoscritto di A. Franzoni e A. Daldini.




Fig. 1 – Copertina del manoscritto redatto da Alberto Franzoni e Agostino Daldini nel 1859.

III Tricholoma	9. a. <i>velutipes</i> , Catt.
	Locarno ai ceppi delli noci - 1858. Ottobre - Novembre
IV Clitocybe	10. a. <i>laccatus</i> Scop.
	a) var - <i>violaceus</i> Locarno - nelle felci di S. Biagio, al Sapo
V Collybia	11. a. <i>fusipes</i> , Bull.
	Locarno - a S. Biagio - felci cattanei
VI. Hebdoma	12. a. <i>rimosa</i> , Bull.
	Locarno, nei gatti
	13. a. <i>crenata</i>
	Locarno ai ceppi dei cattanei e dei gelsi.
VII Phytocybe	14. a. <i>alba</i>
VII Patryrella	15. a. <i>opposita</i> Pers.
	Locarno -
VIII Dermocybe	15. a. <i>cinnamomea</i>
	Locarno
	16. a. <i>longipes</i>
	Locarno - al Sapo - raro -
IX Armillaria	17. a. <i>mellea</i> Pers.
	Locarno al piede dei prapini, noci meli, peri - L'enero - Delingonea greyana

Fig. 2 - Esempio di pagina del manoscritto redatto da Alberto Franzoni e Agostino Daldini nel 1859.