**Zeitschrift:** Bollettino della Società ticinese di scienze naturali

Herausgeber: Società ticinese di scienze naturali

**Band:** 99 (2011)

Artikel: La Val Piora : primo approccio a un mondo ricco di licheni ancora poco

esplorato

Autor: Spinelli, Alberto / Vust, Mathias

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-1003142

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

# **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

# Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 17.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# La Val Piora: primo approccio a un mondo ricco di licheni ancora poco esplorato

# Alberto Spinelli<sup>1</sup> e Mathias Vust<sup>2</sup>

1 Contrada Mornée, CH - 6984 Pura (alberto.spinelli@bluewin.ch)

Riassunto: La 48h della biodiversità del luglio 2010 ha permesso agli autori di fare un primo passo alla scoperta di una regione fin qui assai trascurata dal punto di vista lichenologico. Un lavoro risalente al 1984 (manoscritto mai pubblicato), 6 lavori pubblicati tra il 1989 e il 2010 e Swisslichens ci forniscono dati che, uniti a quelli raccolti per questo lavoro, portano a 304 le specie di licheni e funghi lichenicoli fin qui censite. 52 delle 177 specie trovate dagli autori, vengono segnalate per la prima volta per il Cantone Ticino.

### The Piora valley: first approach to a little explored world rich of lichens

**Abstract:** During the Biodiversity Days in 2010 an inventory of lichens in the Val Piora was undertaken. The results of a study from 1984 (manuscript, not yet published), 6 papers published between 1989 and 2010 and Swisslichens, together with the lichens found by the authors of this paper, refers from a total of 304 species of lichens and lichenicolous fungi recorded in this area. 52 of the 177 species found by the authors, are recorded the first time in Canton Ticino.

Keywords: lichens, Val Piora, Canton Ticino, southern swiss Alps, biodiversity

# INTRODUZIONE

Come nella maggior parte della Svizzera e del globo, anche in Ticino i licheni vestono un ruolo di Cenerentola della ricerca scientifica. Pochi furono e sono gli interessati a questi organi viventi che continuano la loro esistenza di *pauperrimi rustici*, come sembra averli definiti Linneo.

La regione di Piora, situata a est-sud-est del massiccio del San Gottardo, negli ultimi anni ha assunto notorietà ed è stata oggetto di molteplici studi nell'ambito della biologia grazie alla creazione del Centro di biologia Alpina. Ciò nonostante i licheni sono rimasti nella loro nicchia dimenticata. Le pubblicazioni a noi pervenute di ZOCCHI (1996) e ZOCCHI et al. (2001) non sono certo d'aiuto alla conoscenza dei licheni. Nella prima sono riportati 6 generi di cui <sup>3</sup>/<sub>4</sub> senza indicazione della specie e nella seconda una decina di generi, anche in questo caso in massima parte senza indicazione della specie (2001). Anche la banca dati nazionale «Licheni» (SWISSLICHENS) non ci è di aiuto. Essa infatti contiene solo due decine di specie per la zona in esame.

Un lavoro di Ruoss & Mayrhofer (1984) giunto a noi pur se non pubblicato, elenca 217 licheni e funghi lichenicoli identificati a livello di specie. Purtroppo l'assenza di dati sulle coordinate dei ritrovamenti li rende utilizzabili solo in modo parziale ai fini della nostra ricerca. 6 lavori pubblicati tra il 1989 ed il 2010 (HINTEREGGER 1989, RAMBOLD 1990, LUNKE 1996, BREUSS 1996, HAFELLNER 2008, NADYENA 2010), riferiscono di 7 specie di licheni e funghi lichenicoli della zona della Val Piora. Come per i dati di RUOSS & MAYRHOFER (1984), anche quest'ultimi mancano di precisi dati di localizzazione.

Dal punto di vista geologico la zona in esame è percorsa da est a ovest da diverse strutture geologiche che la rendono particolarmente variata ed interessante da un punto di vista lichenologico. Dal Pizzo dell'Uomo, passando dal Pizzo Taneda e al Pizzo Stabiello, un'ampia fascia di rocce cristalline del massiccio del Gottardo chiude verso nord l'area geologica. A sud il confine è segnato da rocce cristalline della coltre del Lucomagno che si estendono dal Pizzo del Sole a tutta la costa sud del Lago Ritom. Tra le due, una vena di dimensioni assai irregolari di Trias carbonatico inizia al Pizzo Colombe, si assottiglia sempre più nel suo percorso verso ovest per scomparire all'alpe Cadagno sotto un ricoprimento quaternario e tornare quindi in superficie tra Cadagno di fuori e Motta e raggiungere il confine ovest dell'area di studio tra il Pizzo Tom e la bocchetta del Camoghè. Calcescisti e micascisti costituiscono una vena assai irregolare che, a sud della precedente, corro-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rue Montolieu 5, CH - 1030 Bussigny (lichens.vust@rossolis.ch)



Fig. 1 – Veduta della Val Piora con sguardo verso oriente. In primo piano ben visibili il lago di Cadagno con l'Alpe, il Centro di Biologia Alpina e sullo sfondo la cima del Pizzo Colombe (foto: Alberto Spinelli).




Fig. 2 - Carta geologica della Val Piora, riprodotta con l'autorizzazione di swisstopo (BA100761) del 02.12.2010.




Fig. 3 – Estratto della carta topografica 1:25'000 della Val Piora (non in scala). Riprodotto con l'autorizzazione di swisstopo (BA100761) del 02.12.2010.



Fig. 4 – *Dermatocarpon intestiniforme* (Koerb.) Hasse. Lichene poco frequente. Abita rocce silicee spesso fortemente esposte al sole (foto: Alberto Spinelli).



Fig. 5 – Calicium viride Pers. Nell'immagine è visibile il corpo fruttifero (lunghezza:  $1\,$ mm) di questo lichene frequente che si nasconde negli anfratti della corteccia di vecchi larici, specialmente alla base del tronco (foto: Alberto Spinelli).

no dal Passo del Sole a est, al Camoghè a ovest. Gli spazi lasciati liberi da tutte queste strutture sono costituiti da riempimento quaternario.

La localizzazione altimetrica della Val Piora fa sì che le unità forestali sono assai limitate. La pineta/lariceto che ricopre la costa sud (sud-est) del Lago Ritom è l'unità forestale dominante e quasi unica nell'area. Si segnala un bosco pioniere situato in zona Murinascia – Mottone.

La 48h della biodiversità, indetta dal Museo Cantonale di Storia Naturale in collaborazione con il Centro di Biologia Alpina il 23–25 luglio 2010, è stata lo stimolo che ha portato gli autori a iniziare una ricerca che sicuramente richiederà parecchi anni di lavoro per essere portata a termine. Il presente lavoro espone i risultati della prima fase di questa ricerca, svolta durante la 48h della biodiversità 2010.

# MATERIALI E METODI

L'area di indagine è limitata alla Val Piora (carta 1:25'000 foglio no. 1252 Ambrì Piotta) e il suo perimetro è rappresentato dall'intero bacino imbrifero della Val Piora stessa.

L'area in esame si estende da quota 1850 m slm del Lago Ritom a quota 2773 m slm del Pizzo del Sole, ossia dall'orizzonte subalpino superiore a quello alpino. Durante le giornate della biodiversità, sul campo c'erano due lichenologi. Malgrado il clima assai sfavorevole (vento, forte pioggia, freddo inconsueto per la stagione), la prima giornata è stata dedicata alla raccolta di licheni nelle località Larici di Campo (2020 m slm), Fontanella (2055 m slm) e Piora (1840 m slm). L'abbondanza di licheni in alcune stazioni ha condizionato fortemente la progressione sul terreno. Il materiale raccolto è rappresentato da licheni epifiti, epilitici e terricoli. La giornata seguente, caratterizzata da tempo bello, soleggiato seppur freddo assai in seguito a forte vento da nord, ha permesso di salire al Passo delle Colombe, a una quota di circa 2380 m slm. Anche qui l'abbondanza di reperti ha portato all'esplorazione di una superficie assai ridotta.

Le zone al centro della Val Piora, corrispondenti approssimativamente al fondovalle, sono terreno di pascolo alpino nei mesi estivi. Ciò comporta un forte impoverimento della flora lichenica (concimazione animale, forte calpestio). Almeno in questa prima parte dello studio questa zona non è stata esplorata poiché per questo primo lavoro sono stati scelti punti di probabile elevato contenuto lichenologico.

Gli esemplari raccolti sono stati per lo più fotografati in situ, in seguito sistematicamente fotografati in laboratorio, determinati secondo le correnti metodologie di macro e microscopia, prove chimiche nell'ambito sia della macro che della microscopia (WIRTH 1995), incollati su cartoncino per poi procedere alla loro archiviazione. Ai fini di un'archiviazione corretta, è stata archi-

viata, nel limite del possibile, una specie per contenitore. Malgrado ciò, non di rado specialmente nel caso di licheni epilitici, si ritrovano due o più specie accomunate nello stesso contenitore vista l'impossibilità di separarle.

Per ogni raccolta sono state rilevate ed annotate le coordinate, la quota, la descrizione dell'ambiente e della situazione ecologica in base alle indicazioni di DELARZE & GONSETH (2008).

Il materiale determinato e catalogato sarà depositato presso il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano. I dati inerenti al materiale determinato saranno inviati anche alla banca dati nazionale «Licheni» (SWISSLICHENS). Parte del materiale raccolto è ancora in attesa di essere determinato. I risultati qui presentati sono pertanto da ritenere transitori.

Letteratura di riferimento: per la determinazione si è fatto riferimento alle chiavi di POELT (1969), POELT & VEZDA (1977 e 1981), WIRTH (1995), CLAUZADE & ROUX (1985), NIMIS & MARTELLOS (2004), SMITH et al. (2009), DOBSON (2005), ORANGE (2008). La nomenclatura si basa sul lavoro di CLERC & TRUONG (2010) e IINDEX FUNGORUM (2008).

La nomenclatura dei lavori di Ruoss & Mayrhofer (1984), di Hinteregger (1989), Rambold (1990), Lunke (1996), Breuss (1996), Hafellner (2008), Nadyena (2010) come pure quella di Swisslichens, è stata aggiornata seguendo le indicazioni di Clerc & Truong (2010) e Index Fungorum (2008) in modo da permettere il confronto con i dati rilevati dagli autori.

# **RISULTATI**

Gli autori hanno raccolto 248 esemplari, attribuiti a 177 specie in 82 generi (tab. 1). Tra questi figura un'unica specie di fungo lichenicolo. Facendo riferimento al lavoro di CLERC & TRUONG (2010), 52 delle specie trovate non sono mai state segnalate per il Cantone Ticino.

Interessante è un confronto con il lavoro di Ruoss & MAYRHOFER (1984) cui, oltre agli autori, hanno partecipato 6 lichenologi professionisti, integrandone i dati in quelli da noi raccolti. Nel loro lavoro RUOSS & MAYRHOFER (1984) hanno descritto 217 specie di licheni e funghi lichenicoli. In 70 casi la denominazione della sola specie o di genere e specie sono cambiati seguendo le indicazioni di CLERC & TRUONG (2010). Le 15 specie di funghi lichenicoli i cui nomi sono stati aggiornati secondo le indicazioni di INDEX FUNGORUM, non figurano in CLERC & TRUONG che riportano unicamente i funghi lichenizzati o licheni. Ciò malgrado le abbiamo lasciate nella lista comparativa (tab. 1) poiché di certo valore nella valutazione della biodiversità lichenica in situ. Un approfondimento e la revisione degli essiccata di questi esemplari (non facilmente rintracciabili), pur se di interesse, esulano dagli scopi posti alla nostra

ricerca. Pur se numericamente poco rilevanti, anche i dati di SWISSLICHENS e dei lavori di HINTEREGGER (1989) (Rinodina malangica (Norman) Arnold, Rinodina trevisanii (Hepp.) Körb.), RAMBOLD (1990) (Koerbiella wimmeriana (Körb.) Stein.), LUNKE (1996) (Schaereria fuscocinerea (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux), BREUSS (1996) (Placidium imbecillum (Breuss) Breuss), HAFELLNER (2008) (Buelliella poetschii Hafellner, fungo lichenicolo), NADYENA (2010) (Buellia parvula (H. Mayrhofer & Poelt) H. Mayrhofer & Scheid.) sono stati integrati nella valutazione globale delle specie finora segnalate nella regione della Val Piora.

Delle specie da noi determinate, una non trova riscontro nel lavoro di Clerc & Truong:

Dermatocarpon intestiniforme (Körb.) Hasse, non è riconosciuto come specie da CLERC & TRUONG (2010) e viene attribuito a Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann. Abbiamo in questo caso preferito mantenere la nomenclatura proposta da POELT (1969: pag. 272) e SMITH et al. (2009: pag. 373).

Seguendo le indicazioni e la numerazione di DELARZE & GONSETH (2008), i licheni sono stati raccolti nei seguenti habitat:

- 3.3.1 Ghiaioni calcarei: La regione del Pizzo Colombe, presenta ghiaioni e blocchi di calcare e dolomia. Vi si trovano licheni sassicoli–calcicoli e licheni terricoli sul suolo o nelle crepe delle rocce.
- 4.3.1 Prati aridi su suolo calcareo a Sesleria comune. Questo ambiente, presente ad esempio salendo da Piano Grande verso il passo delle Colombe, ha una vegetazione poco densa. Il suolo e le rocce sono spesso visibili tra i ciuffi d'erba e disponibili per i licheni. Si possono trovare licheni pure su cuscinetti di muschi e resti vegetali.
- 4.3.6 Balze e cenge su suolo silicatico a Festuca varia. Un affioramento di calcescisti, in zona di rocce cristalline della coltre del Lucomagno, sotto il ristorante allo sbarramento del Ritom, presenta questa vegetazione. Abbiamo rilevato la presenza di diversi licheni sassicoli e qualche terricolo.
- 4.4.1 Vallette nivali a suolo calcareo. Le vallette nivali verso il Passo delle Colombe albergano numerosi licheni terricoli calcicoli.
- 5.4.5 Brughiere subalpine meso igrofile su suolo acido a Rododendro. In questo ambiente i licheni sono stati trovati sulle rocce affioranti e sul suolo acido. In località Fontanella, in questo ambiente attorno a un affioramento di dolomia, sono state trovate alcun specie basofile.
- 5.4.6 Brughiere alpine ventose (Brughiere artico-alpine di arbusti nani, brughiere a Loiseleuria). Le condizioni estreme di questi ambienti permettono ai licheni di avere poca concorrenza da parte delle piante erbacee. Vi si trovano

licheni legati al suolo acido come *Cetraria cucullata* e *Cetraria nivalis*, come pure diverse specie che crescono su resti vegetali come le piante a cuscinetto ormai prive di vitalità (dossi ventosi che dal lago dei Campanitt portano verso il pizzo Colombe).

6.6.3 Boschi di Larice comune e Pino cembro, Cembrete. Questo ambiente è assai ricco di licheni. Il gran numero di licheni epifiti si spiega con la diversità delle specie arboree, a corteccia liscia e neutra come Sorbus aucuparia o a corteccia profondamente screpolata e acida come Larix decidua. Alcune specie di licheni necessitano di luce e crescono sui rami, altre tollerano l'ombra, in particolare ai piedi dell'albero. Alcune specie crescono in luoghi al riparo dalla pioggia. Gli alberi morti e i tronchi sono pure colonizzati dai licheni. Licheni terricoli come Cladonia crescono sulla terra grezza tra i cespugli di mirtilli o, come Baeomyces rufus, su terreno acido nudo lungo i sentieri. Pure le rocce silicee, più o meno ombreggiate, sono estremamente ricche di licheni sassicoli. Pur se la maggior parte di rocce franate sono di gneiss, si trova qualche affioramento di calcescisto con altre specie come ad esempio Xanthoria sorediata.

### DISCUSSIONE

Due giorni (naturalmente tralasciando il lavoro di laboratorio per la determinazione), due persone e 177 specie raccolte di cui 52 mai segnalate nel Cantone Ticino. Queste semplici cifre fanno pensare ad una elevata biodiversità lichenica delle zone esplorate. Non bisogna dimenticare, però, che le zone esplorate hanno in totale una superficie di poche decine di metri quadrati. Siamo dunque lontani dai valori effettivi di stima della biodiversità lichenica della Val Piora.

Il lavoro di Ruoss & Mayrhofer (1984), unica fonte storica su cui poggiarci, conferma la conclusione derivante dalle nostre cifre. 217 specie di licheni compresi funghi lichenicoli e parassiti (secondo la nomenclatura attuale) sono state identificate nel comprensorio da loro studiato. A un esame critico, quanto detto fin'ora conforta la previsione di Ruoss & Mayrhofer (1984) cui ci associamo, che la zona di Piora ha una potenzialità di almeno 600 specie di licheni / funghi lichenicoli.

Una valutazione del quadro lichenologico secondo ambienti o nicchie ecologiche, zone o specie a rischio, è al momento prematura. I nostri dati coprono superfici troppo piccole per estrapolare i risultati a tutta la zona in esame.

I risultati di Ruoss & Mayrhofer (1984) e di Hinteregger (1989), Rambold (1990), Lunke (1996), Breuss (1996), Hafellner (2008), Nadyena (2010) non ci sono di aiuto poiché, purtroppo, mancano indicazioni precise delle coordinate.



Fig. 6 – Solorina bispora Nyl. Tipica della zona alpina. Le sue piccole dimensioni e la nicchia ecologica occupata (pareti laterali di buchi nella terra, nascosti da ciuffi d'erba, da sassi, piccole pareti di terra leggermente strapiombanti e nascoste) fanno di questo lichene una specie poco conosciuta. Le grandi spore, 2 per asco, dominano il tipico quadro microscopico (foto: Alberto Spinelli).



Fig. 7 – *Thamnolia vermicularis* (Sw.) Schaerer. Frequente nella zona alpina, specialmente su dossi ventosi. Il nome deriva chiaramente dalla sua struttura macroscopica che lo fa apparire come un ammasso di vermiciattoli bianchi (foto: Alberto Spinelli).



Fig. 8 – *Lecidella patavina* (A. Massal.) Knoph & Leuckert. Poco frequente. Cresce su roccia calcare. Come molte specie di licheni delle rocce, è caratterizzato dalla presenza di corpi fruttiferi neri (apoteci lecideini). Per la sua identificazione sicura è indispensabile l'esame al microscopio (foto: Alberto Spinelli).



Fig. 9 – *Cetraria pinastri* (Scop.) Gray: dal tipico colore giallo-oro, cresce sulla corteccia di alberi e arbusti, in vicinanza del suolo. Il colore e la sua struttura macroscopica ne fanno un lichene facilmente identificabile (foto: Alberto Spinelli).

# **CONCLUSIONI**

I dati fin qui raccolti svelano una forse inaspettata ricchezza di licheni nella regione della Val Piora. Per completare il quadro in modo esaustivo, si rende necessaria la continuazione del lavoro sul terreno, in modo da poter giungere a dati realmente rappresentativi per l'intero bacino imbrifero della valle. Per arrivarci, considerate le dimensioni del comprensorio e le sue caratteristiche geologico – geografiche non certo semplici, sarà necessario un lavoro di parecchi anni e con il supporto di molti lichenologi.

# RINGRAZIAMENTI

Gli Autori ringraziano il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano, in particolare il suo Direttore Filippo Rampazzi e il Centro di Biologia Alpina di Piora, in particolare il Professor Raffaele Peduzzi, per l'organizzazione di questa 48 ore della biodiversità.

Il nostro grazie va anche al PD. Christoph Scheidegger che ci ha dato il suo supporto nella determinazione di alcuni esemplari. Un grazie anche alla Dr.ssa Neria Römer per la rilettura del testo, e il contributo



Fig. 10 – Miriquidica garovaglii (Schaer.) Hertel & Rambold: cresce su sasso, spesso frammista ad altri licheni epilitici. Piuttosto raro. La sua identificazione sicura è possibile solo con l'ausilio del microscopio (foto: Alberto Spinelli).



Fig. 11 – Aspicilia verrucosa (Ach.) Körb. Vive su rametti di cespugli, rasoterra, spesso celato sotto le foglie. Le sue piccole dimensioni, il colore biancastro che ben lo mimetizza sul suolo calcareo e il luogo nascosto in cui vive ne fanno un lichene poco osservato. Nell'immagine è riprodotto l'apotecio (corpo fruttifero) con un diametro di 0,8 mm circa (foto: Alberto Spinelli).

alla strutturazione della tabella e nella ricerca della letteratura.

**Nota**: tutte le fotografie sono state eseguite durante la 48 ore della biodiversità 2010 di Piora tranne le fig. 5, 8 e 11 che, per motivi tecnici sono state eseguite in laboratorio.

Tab. 1 (pagine 46–52) – Nella tabella sono indicati i generi e le specie di licheni e funghi lichenicoli fin qui segnalati. Nella quarta colonna da sinistra sono evidenziate le specie trovate dagli autori durante la 48h della biodiversità e segnalate per la prima volta nel Cantone Ticino. La quinta colonna evidenzia i funghi lichenicoli fin qui noti per la Val Piora. La sesta colonna evidenzia le specie trovate da SPINELLI & VUST (2010) durante la 48 ore della biodiversità. Le colonne seguenti segnalano le specie presenti in Swisslichens (ritrovamenti della Val Piora), le specie segnalate da RUOSS & MAYRHOFER (1984), le specie riportate da vari Autori (vedi: Risultati). Alla fine della tabella è presente il totale di ogni colonna.

Genere	Specie	AUTORE	Nuovo TI	Funghi lichenicoli	Monografia Spinelli & Vust 2011	BdSwisslichen 2010	Ruoss & Mayrhofer 84	Autori vari
Acarospora	fuscata	(Schrad.) Th. Fr.	Х		Х			
Acarospora	insolata	H. Magn.					Х	
Ainoa	geochroa	(Koerb.) Lumbsch & I. Schmit		Х			Х	
Alectoria	ochroleuca	(Hoffm.) A. Massal.					Х	
Anaptychia Anzina	ciliaris	(L.) Körb. (Anzi) Scheid.				Х		
Anzina Arthrorhaphis	carneonivea alpina	(Schaer.) R. Sant.	X		Х		Х	<b>-</b>
Arthrorhaphis	citrinella	(Ach.) Poelt	^		X		х	<b>-</b>
Aspicilia	aguatica	Körb.					X	
Aspicilia	caesiocinerea	(Malbr.) Arnold			Х		X	
Aspicilia	calcarea	(L.) Mudd					X	
Aspicilia	cinerea	(L.) Körb.					Х	
Aspicilia	radiosa	(Hoffm.) Poelt & Leuckert					X	
Aspicilia	verrucosa	(Ach.) Körb.			х		×	
Bacidia	bagliettoana	(A. Massal. & De Not.) Jatta	х		х			
Bacidia	herbarum	(Stizenb.) Arnold					х	
Bacidia	trachona	(Ach.) Lettau					х	
Baeomyces	rufus	(Huds.) Rebent.	х		х			
Bellemerea	alpina	(Sommerf.) Clauzade & Cl. Roux			х		х	
Bellemerea	cinereorufescens	(Ach.) Clauzade & Cl. Roux	Х		Х		Х	
Bellemerea	diamarta	(Ach.) Hafellner & Cl. Roux					Х	
Biatora	subduplex 	(Nyl.) Printzen			Х			
Biatora	vernalis	(L.) Fr.					X	
Bilimbia Bilimbia	lobulata	(Sommerf.) Hafellner & Coppins (Th. Fr.) Th. Fr.			X		Х	
Brodoa	microcarpa	(Schaer.) Goward			Х			<u> </u>
Brodoa	atrofusca intestiniformis	(Vill.) Goward			х		X	
Brvonora	castanea	(Hepp) Poelt			_^		X	-
Bryoria	fuscescens	(Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.			х	х	X	
Buellia	insignis	(Hepp) Th. Fr.	Х		X			
Buelli	parvula	(H.Mayrhofer & Poelt) H.Mayrhofer & Scheid.						х
Buellia	punctata	(Hoffm.) A. Massal.			Х		Х	
Buelliella	poetschii	Hafellner		Х				Х
Calicium	viride	Pers.			х			
Caloplaca	ammiospila	(Wahlenb.) H. Olivier			Х		Х	
Caloplaca	biatorina	(A. Massal.) J. Steiner			Х		Х	
Caloplaca	cerina	(Hedw.) Th. Fr.			Х	Х	Х	
Caloplaca	chlorina	(Flot.) H. Olivier					Х	
Caloplaca	crenulatella	(Nyl.) H. Olivier	Х		Х		PACED	
Caloplaca	diphyodes	(Nyl.) Jatta					X	<u> </u>
Caloplaca	exsecuta barbidalla	(Nyl.) DT. & Sarnth.		Х			X	
Caloplaca Caloplaca	herbidella percrocata	(Hue) H. Magn. (Arnold) J. Steiner			Х		X	-
Calopiaca	percrocata saxifragarum	Poelt					X	
Caloplaca	sinapisperma	(Lam. & DC.) Maheu & A. Gillet	Х		х			
Caloplaca	variabilis	(Pers.) Müll. Arg.	X		X		х	<u> </u>
Caloplaca	velana	(A. Massal.) Du Rietz	X		X			
Calvitimela	armeniaca	(DC.) Hafellner					х	
Culvicillieia								

Genere	Specie	AUTORE	Nuovo TI	Funghi lichenicoli	Monografia Spinelli & Vust 2011	BdSwisslichen 2010	Ruoss & Mayrhofer 84	Autori vari
Candelariella	vitellina	(Hoffm.) Müll. Arg.			Х		Х	
Candelariella	xanthostigma	(Ach.) Lettau			х			
Carbonea	distans	(Kremp.) Hafellner & Obermayer					х	
Carbonea	vitellinaria	(Nyl.) Hertel		х			х	
Carbonea	vorticosa	(Flörke) Hertel					х	
Catapyrenium	cinereum	(Pers.) Körb.			Х			
Cecidea	umbonella	(Nyl) Triebel & Rambold		х			х	
Cetraria	chlorophylla	(Willd.) Vain.			Х	Х		
Cetraria	cucullata	(Bellardi) Ach.			х		Х	
Cetraria	ericetorum	Opiz			Х		Х	
Cetraria	islandica subsp. islandica	(L.) Ach.			Х	Х	Х	
Cetraria	nivalis	(L.) Ach.			Х		Х	
Cetraria	pinastri	(Scop.) Gray			Х	Х	Х	
Cetraria	tubulosa	(Schaer.) Zopf					Х	
Chaenotheca	chrysocephala	(Ach.) Th. Fr.			Х			
Cladonia	arbuscula	(Wallr.) Flot.			Х	Х	Х	
Cladonia	arbuscula subsp. mitis	(Sandst.) Ruoss					Х	
Cladonia	bellidiflora	(Ach.) Schaer.			Х		Х	
Cladonia	cenotea	(Ach.) Schaer.	Х		Х		Х	
Cladonia	chlorophaea	(Sommerf.) Spreng.	X		Х		Х	
Cladonia	cornuta	(L.) Hoffm.					Х	
Cladonia	crispata	(Ach.) Flot.			Х		Х	
Cladonia	deformis	(L.) Hoffm.	X		Х		Х	
Cladonia	digitata	(L.) Hoffm.					Х	
Cladonia	fimbriata	(L.) Fr.			Х		Х	
Cladonia	furcata subsp. furcata	(Huds.) Schrad.			Х		Х	
Cladonia Cladonia	gracilis subsp. gracilis macilenta subsp.	(L.) Willd. Hoffm.	X		X		Х	
Cladauia	macilenta	(Delice) Herr	-					
Cladonia Cladonia	macroceras macrophyllodes	(Delise) Hav. Nyl.	+	745	X	Х	Х	-
Cladonia	pleurota	(Flörke) Schaer.	×		X		х	
Cladonia	pocillum	(Ach.) Grognot	+^		X		X	
Cladonia	pyxidata	(L.) Hoffm.	_		X	-	X	
Cladonia	rangiferina	(L.) F. H. Wigg.	+		X		X	
Cladonia	squamosa	Hoffm.			X		X	
Cladonia	sulphurina	(Michx.) Fr.	×		X		^	
Cladonia	symphycarpia	(Flörke) Fr.	<del>  ^</del>		X		Х	
Cladonia	uncialis	(L.) F. H. Wigg.			X	Х	X	
Clauzadea	monticola	(Schaer.) Hafellner & Bellem.	1				X	
Cliostomum	pallens	(Kullh.) S. Ekman					X	
Collema	fuscovirens	(With.) J. R. Laundon			Х			
Collema	tenax	(Sw.) Ach.			Х			
Cornicularia	normoerica	(Gunnerus) Du Rietz					х	
Dacampia	hookeri	(Borrer) A.Massal.		Х	Х			
Dactylospora	urceolata	(Th.Fr.) Arnold		x			х	
Dermatocarpon	intestiniforme	(Körb.) Hasse	×		Х		X	
Dermatocarpon	miniatum	(L.) W. Mann			X		X	
		(Arnold) Dalla Torre & Sarnth.	1					
Dermatocarpon	rivulorum	(Altiola) Dalla Toffe & Saffici.			1		Х	

	T							
Genere	Specie	AUTORE	Nuovo TI	Funghi lichenicoli	Monografia Spinelli & Vust 2011	BdSwisslichen 2010	Ruoss & Mayrhofer 84	Autori vari
Dibaeis	baeomyces	(L. f.) Rambold & Hertel			Х	Х		
Dimelaena	oreina	(Ach.) Norman	Х		х		х	
Diploschistes	scruposus	(Schreb.) Norman	Х		х		х	
Diplotomma	alboatrum	(Hoffm.) Flot.					Х	
Endocarpon	pulvinatum	Th. Fr.			х			
Endocarpon	pusillum	Hedw.					х	
Ephebe	lanata	(L.) Vain.					Х	
Epilichen	scabrosus	(Ach.) Clem.	Х		Х			
Evernia	prunastri	(L.) Ach.			Х		Х	
Farnoldia	micropsis	(A. Massal.) Hertel					Х	
Fulgensia	bracteata subsp. bracteata	(Hoffm.) Räsänen	х		х			
Fuscopannaria	leucophaea	(Vahl) P. M. Jørg.					х	
Fuscopannaria	praetermissa	(Nyl.) P. M. Jørg.			Х		х	
Gyalecta	erythrozona	Lettau					х	
Gyalecta	geoica	(Ach.) Ach.	Х		х			
Hypocenomyce	scalaris	(Ach.) M. Choisy			х			
Hypogymnia	farinacea	Zopf			х			
Hypogymnia	physodes	(L.) Nyl.			Х		х	
Icmadophila	ericetorum	(L.) Zahlbr.			х			
Koerberiella	wimmeriana	(Körb.) Stein					Х	х
Lecania	turicensis	(Hepp) Müll. Arg.					х	
Lecanora	agardhiana	Ach.					х	
Lecanora	bicincta var. bicincta	Ramond					Х	
Lecanora	bicincta var. sorediata	(Flot.) Leuckert & Poelt					Х	
Lecanora	cadubriae	(A. Massal.) Hedl.			х		х	
Lecanora	campestris	(Schaer.) Hue					Х	
Lecanora	cenisia	Ach.			Х		Х	
Lecanora	chlarotera	Nyl.			Х		х	
Lecanora	circumborealis	Brodo & Vitik.			х			
Lecanora	dispersa	(Pers.) Sommerf.	X		Х		Х	
Lecanora	epibryon	(Ach.) Ach.			Х			
Lecanora	hagenii	(Ach.) Ach.					Х	
Lecanora	marginata	(Schaer.) Hertel & Rambold					Х	
Lecanora	mughicola 	Nyl.					Х	
Lecanora	muralis	(Schreb.) Rabenh.			Х		Х	
Lecanora	polytropa	(Hoffm.) Rabenh.			Х		Х	
Lecanora	pulicaris	(Pers.) Ach.					Х	
Lecanora	rupicola subsp. rupicola	(L.) Zahlbr.					Х	
Lecanora	salicicola	H. Magn.					Х	
Lecanora	silvae-nigrae	V. Wirth					Х	
Lecanora	subcarpinea	Szatala	X		Х			
Lecanora	symmicta	(Ach.) Ach.			Х		Х	
Lecanora	varia	(Hoffm.) Ach.			Х	Х	Х	
Lecidea	athrocarpa	(Ach.) Ach		Х			Х	
Lecidea	atrobrunnea	(Lam. & DC.) Schaer.	-				Х	
Lecidea	auriculata	Th. Fr.			10121		Х	
Lecidea	berengeriana	(A. Massal.) Th. Fr.	-		Х		X	
Lecidea	cerviniicola	B. de Lesd.					Х	
Lecidea	confluens	(Weber) Ach.			Х		Х	

Genere	Specie	AUTORE	Nuovo TI	Funghi lichenicoli	Monografia Spinelli & Vust 2011	BdSwisslichen 2010	Ruoss & Mayrhofer 84	Autori vari
Lecidea	diducens	Nyl.					Х	
Lecidea	hypnorum	Lib.			Х			
Lecidea	lapicida	(Ach.) Ach.	-		Х		Х	
Lecidea	lithophila	(Ach.) Ach.					Х	
Lecidea	promiscens	Nyl.			Х		Х	
Lecidea	silacea	Ach.					Х	
Lecidea	umbonata	(Hepp) Mudd	-				Х	
Lecidella	carpathica	Körb.	-				Х	
Lecidella	elaeochroma var. elaeochroma	(Ach.) M. Choisy			х			
Lecidella	patavina	(A. Massal.) Knoph & Leuckert	х		Х		Х	
Lecidella	stigmatea	(Ach.) Hertel & Leuckert	x		х		х	
Lecidella	wulfenii	(Hepp) Körb.					Х	
Lecidoma	demissum	(Rutstr.) Gotth. Schneid. & Hertel			Х		Х	
Leciographa	parasemoides	Rehm		Х			Х	
Lepraria	neglecta	(Nyl.) Erichsen	X		Х			
Lepraria	rigidula	(B. de Lesd.) Tønsberg				Х		
Leptogium	intermedium	(Arnold) Arnold	X		Х			
Leptogium	tenuissimum	(Dicks.) Körb.			Х			
Letharia	vulpina	(L.) Hue	-		Х	Х	Х	
Lichenothelia	scopularia	(Nyl.) Hawksw.	+	Х			X	
Lobaria	linita	(Ach.) Rabenh.	<del> </del>	-	X		Х	-
Massalongia Melanelia	carnosa disjuncta	(Dicks.) Körb. (Erichsen) Essl.	<del>                                     </del>		X			
Melanelia	hepatizon	(Ach.) A. Thell	X		X			
Melanelia	stygia	(L.) Essl.	+		Х		X	
Melanohalea	exasperatula	(Nyl.) O. Blanco & al.			х		_^	<b>—</b>
Miriquidica	garovaglii	(Schaer.) Hertel & Rambold	+		X		х	-
Muellerella	lichenicola	(Sommerf.) D.Hawksw.	_	х	^		X	
Mycobilimbia	tetramera	(De Not.) Hafellner & Türk	<del>                                     </del>	_ <u>~</u>	Х			
Nephroma	expallidum	(Nyl.) Nyl.	×		X		х	
Nephroma	parile	(Ach.) Ach.	1		Х			
Ochrolechia	alboflavescens	(Wulfen) Zahlbr.					Х	
Ophioparma	ventosa	(L.) Norman					Х	
Orphniospora	mosigii	(Körb.) Hertel & Rambold					Х	
Parmelia	saxatilis	(L.) Ach.			Х		Х	
Parmelia	sulcata	Taylor			Х	х	х	
Parmeliopsis	ambigua	(Wulfen) Nyl.			Х	Х	Х	
Parmeliopsis	hyperopta	(Ach.) Arnold			Х		Х	
Peltigera	didactyla	(With.) J. R. Laundon	-		Х			
Peltigera	leucophlebia	(Nyl.) Gyeln.	-				Х	
Peltigera	malacea	(Ach.) Funck	1		Х	Х	Х	<u> </u>
Peltigera	neckeri	Müll. Arg.	X		Х			
Peltigera	rufescens	(Weiss) Humb.	-		Х		Х	<u> </u>
Peltigera	venosa	(L.) Hoffm.	+	-			X	
Pertusaria	corallina	(L.) Arnold	-	-			X	
Pertusaria	flavicans	(Nyl Ex Vain ) A Schmidt	+				X	
Phaeocalicium	compressulum	(Nyl.Ex Vain.) A.Schmidt	+	Х			Х	
Phaeophyscia	endococcina	(Körb.) Moberg	1				X	•

Genere	Specie	AUTORE	Nuovo TI	Funghi lichenicoli	Monografia Spinelli & Vust 2011	BdSwisslichen 2010	Ruoss & Mayrhofer 84	Autori vari
Phaeorrhiza	nimbosa	(Fr.) H. Mayrhofer & Poelt					×	
Phaeospora	parasitica	(Nyl.Ex Vain.) A.Schmidt		х			х	
Physcia	aipolia	(Humb.) Fürnr.			х			
Physcia	albinea	(Ach.) Nyl.					х	
Physcia	caesia	(Hoffm.) Fürnr.			х		х	
Physcia	dimidiata	(Arnold) Nyl.					х	
Physcia	dubia	(Hoffm.) Lettau			х		Х	
Physcia	tenella	(Scop.) DC.			х			
Physconia	muscigena	(Ach.) Poelt			х		х	
Placidium	imbecillum	(Breuss) Breuss						х
Placidium	michelii	A. Massal.			х			
Placynthiella	icmalea	(Ach.) Coppins & P. James			х			
Placynthiella	oligotropha	(J. R. Laundon) Coppins & P. James			х			
Placynthiella	uliginosa	(Schrad.) Coppins & P. James			х			
Placynthium	nigrum	(Huds.) Gray			х			
Pleopsidium	chlorophanum	(Wahlenb.) Zopf			х			
Polyblastia	albida	Arnold	х		х			
Polyblastia	cupularis	A. Massal.					х	
Polyblastia	sendtneri	Kremp.	х		Х			
Polyblastia	sepulta	A. Massal.	х		х			
Polysporina	simplex	(Davies) Vezda					х	
Porpidia	crustulata	(Ach.) Hertel & Knoph					х	
Porpidia	macrocarpa	(DC.) Hertel & A. J. Schwab					х	
Porpidia	melinodes	(Koerb.) Gowan & Ahti		х			х	
Porpidia	rugosa	(Taylor) Coppins & Fryday			х			
Porpidia	speirea	(Ach.) Kremp.					Х	
Porpidia	trullisata	(Kremp.) Körb.					Х	
Porpidia	turgida	(Ach.) Cl. Roux & P. Clerc	Х		Х			
Protoblastenia	siebenhaariana	(Körb.) J. Steiner	Х		Х			
Protomicarea	limosa	(Ach.) Hafellner	х		х			
Protopannaria	pezizoides	(Weber) P. M. Jørg. & S. Ekman	Х		Х		Х	
Protoparmelia	badia	(Hoffm.) Hertel			Х		Х	
Protothelenella	sphinctrinoides	(Nyl.) H. Mayrhofer & Poelt					Х	
Pseudephebe	minuscula	(Arnold) Brodo & D. Hawksw.					Х	
Pseudephebe	pubescens	(L.) M. Choisy					Х	
Pseudevernia	furfuracea	(L.) Zopf			х	х	Х	
Psora	decipiens	(Hedw.) Hoffm.			Х	Х	Х	
Psora	globifera	(Ach.) A. Massal.			х			
Psoroma	hypnorum	(Vahl) Gray			Х			
Pycnothelia	papillaria	(Ehrh.) Dufour					Х	
Ramalina	pollinaria	(Westr.) Ach.					Х	
Rhizocarpon	alpicola	(Anzi) Rabenh.			Х		Х	
Rhizocarpon	badioatrum	(Spreng.) Th. Fr.					Х	
Rhizocarpon	carpaticum	Runemark		Х			Х	
Rhizocarpon	geminatum	Körb.	Х		х		Х	
Rhizocarpon	geographicum	(L.) DC.			Х		Х	
Rhizocarpon	lavatum	(Fr.) Hazsl.			ļ		Х	
Rhizocarpon	macrosporum	Räsänen	Х		Х			
Rhizocarpon	pusillum	Runemark					Х	
Rhizocarpon	saanaense	Räsänen					Х	

Genere	Specie	AUTORE	Nuovo TI	Funghi lichenicoli	Monografia Spinelli & Vust 2011	BdSwisslichen 2010	Ruoss & Mayrhofer 84	Autori vari
Rhizocarpon	superficiale	(Schaer.) Vain.					х	
Rhizocarpon	umbilicatum	(Ramond) Flagey			х		х	
Rimularia	insularis	(Nyl.) Rambold & Hertel					х	
Rinodina	bischoffii	(Hepp) A. Massal.					х	
Rinodina	castanomela	(Nyl.) Arnold					х	
Rinodina	castanomelodes	H. Mayrhofer & Poelt					Х	
Rinodina	malangica	(Norman) Arnold			Х		Х	Х
Rinodina	milvina	(Wahlenb.) Th. Fr.					х	
Rinodina	olivaceobrunnea	C. W. Dodge & G. E. Baker	Х		Х			
Rinodina	orculata	Poelt & M. Steiner			Х			
Rinodina	parasitica	H. Mayrhofer & Poelt					х	
Rinodina	trevisanii	(Hepp.) Körb.						Х
Rinodina	turfacea	(Wahlenb.) Körb.					Х	
Romjularia	lurida	(Ach.) Timdal	Х		Х		Х	
Sarcogyne	clavus	(DC.) Kremp.					Х	
Sarcogyne	regularis	Körb.	X		Х			
Schaereria	fuscocinerea	(Nyl.) Clauzade & Cl. Roux					Х	Х
Scoliciosporum	chlorococcum	(Stenh.) Vezda			Х			
Solorina	bispora subsp. bispora	Nyl.	Х		Х		X	
Solorina	crocea	(L.) Ach.				X	X	
Solorina	saccata	(L.) Ach.	_		Х		Х	
Solorina	spongiosa	(Ach.) Anzi			Х			-
Sporastatia	polyspora	(Nyl.) Grummann	_				X	
Sporastatia	testudinea areolata	(Ach.) A. Massal.					Х	-
Staurothele Staurothele	frustulenta	(Ach.) Lettau Vain.			X	-		-
Staurothele					Х			
Stereocaulon	fuscocuprea alpinum	(Nyl.) Zschacke Laurer	_				X	
Stereocaulon		Ach.	_			Х	X	
Stereocaulon	botryosum nanodes	Tuck.			Х		Х	
Tephromela	atra	(Huds.) Hafellner			X		х	
Tephromela	pertusarioides	(Degel.) Hafellner & Cl. Roux	x		X		<del>  ^</del>	
Thamnolia	vermicularis	(Sw.) Schaer.	^		X	<b>-</b>	х	
Toninia	alutacea	(Anzi) Jatta			X		X	
Toninia	candida	(Weber) Th. Fr.					X	
Toninia	pennina	(Schaer.) Gyeln.	х		Х		<u> </u>	
Toninia	rosulata	(Anzi) H. Olivier	X		X			
Toninia	verrucarioides	(Nyl.) Timdal	-				х	
Trapelia	involuta	(Tayl.) Hertel		Х			X	
Trapeliopsis	granulosa	(Hoffm.) Lumbsch			Х			
Tremolecia	atrata	(Ach.) Hertel					х	
Umbilicaria	crustulosa	(Ach.) Frey			Х		х	
Umbilicaria	cylindrica	(L.) Duby			Х		х	
Umbilicaria	deusta	(L.) Baumg.			Х			
Umbilicaria	grisea	Hoffm.	х		Х			
Umbilicaria	nylanderiana	(Zahlbr.) H. Magn.			Х		х	
Umbilicaria	polyphylla	(L.) Baumg.			Х		х	
Umbilicaria	ruebeliana	(Du Rietz & Frey) Frey					х	
Umbilicaria	vellea	(L.) Hoffm.	х		Х			

Genere	Specie	AUTORE	Nuovo TI	Funghi lichenicoli	Monografia Spinelli & Vust 2011	BdSwisslichen 2010	Ruoss & Mayrhofer 84	Autori vari
<b>Verruca</b> ria	foveolata	(Flörke) A. Massal.	х		х			
V <b>erru</b> caria	hochstetteri	Fr.	Х		х			
<b>Xan</b> thoparmelia	conspersa	(Ach.) Hale			х		х	
Xanthoparmelia	pulla	(Ach.) O. Blanco & al.			Х			
Xanthoparmelia	verruculifera	(Nyl.) O. Blanco & al.					Х	
Xanthoria	elegans	(Link) Th. Fr.			х		Х	
Xanthoria	sorediata	(Vain.) Poelt			х		х	
Xylographa	parallela	(Ach.) Behlen & Desberger					Х	
Totale		310	52	17	177	20	217	7

# **BIBLIOGRAFIA**

- Breuss O. 1996. Studien über die Flechtengattug *Catapyrenium* (Verrucariaceae) VIII. Eine übersehene Art aus den Alpen und bemerkenswerte Edinzelfunde aus Europa (mit Makaronesien). Linzer biol. Beitr. 28:529–533.
- CLAUZADE G. & C. ROUX 1985. Likenoj de okcidenta Europo. Ilustrita determinlibro (in esperanto). Société Botanique du Centre-Ouest, Royan, 893 pp.
- CLERC P. & TRUONG C. 2010. Catalogue des lichens de Suisse. http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/cataloguelichen
- DELARZE R. & GONSETH Y. 2008. Lebensräume der Schweiz. Oekologie – Gefährdung – Kennarten. hep verlag AG, 424 pp.
- DOBSON F. S. 2005. Lichens, an illustrated guide to the British and Irish species. The Richmond Publishing Ca. Ltdl England, 480 pp.
- HAFELLNER VON J., HERZOG G., MYRHOFER H. 2008. Zur Diversität von lichenisierten und lichenicholen Pilzen in den Ennstaler Alpen (Österreich: Steiermark, Onerösterreich). Mitt. Naturw. Ver. Steiermark 137: 131–204.
- HINTEREGGER E., MAYRHOFER H., POELT J. 1989. Die Flechten der Alpenrosen in den Ostalpen (*Rhododendron ferrugineum* und *Rh. Hirsutum*). I. Einige Arten der Gattungen *Lecanora* und *Rinodina*. Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark, 119: 83–102.
- INDEX FUNGORUM: CABI, CBS AND LANDCARE RESEARCH. Index fungorum. http://www.indexfungorum.org.
- LUNKE T., LUMSCH H., BENNO FEIGE G. 1996. Anatomical and Ontogenetic Studies on the Lichen Family Schaereriaceae Agyriinae, Lecanorales). The Bryologist, 99: 53–63.
- NADYEINA O., GRUBE M., MAYRHOFER H. 2010. A contribution to the taxonomy of the genus Rinodina (Physciaceae, lichenized Ascomycotina) using combined ITS and mtSSU rDNA data. The Lichenologist, 42: 521–531.

- NIMIS P.L. & MARTELLOS S. 2004. Keys to the lichens of Italy. I. Terricolous species. Edizioni Goliardiche, 341 pp.
- Orange A. 2008. British Pyrenocarpous lichens. Departement of biodiversity and systematic biology National Museum of Wales. Cardiff.
- POELT J. 1969. Bestimmungsschlüssel europeischer Flechten. Verlag von J. Cramer, 757 pp.
- POELT J. E A.VERZDA 1977. Bestimmungsschlüssel europeischer Flechten. Ergänzungsheft I. Verlag von J. Cramer, 258 pp.
- POELT J. & VERZDA A. 1981. Bestimmungsschlüssel europeischer Flechten. Ergänzungsheft II. Verlag von J. Cramer, 390 pp.
- RAMBOLD G., HERTEL H., TRIEBEL D. 1990. *Koerbiella wimmeriana* (Lecanorales, Porpidiaceae) and its lichenicolous fungi. The lichenologist, 22: 225–240.
- RUOSS E. & MAYRHOFER H. 1984. Flechtenvegetation des Val Piora Manoscritto, non pubblicato, 8 pp.
- SMITH C.W. *et al.* 2009. The lichens of Great Britain and Ireland. The british Lichen Society, 1046 pp.
- SWISSLICHENS: Webatlas der Flechten der Schweiz: http://mer-kur.wsl.ch/didado/swisslichens.map
- WIRTH V. 1995. Die Flechten Baden-Würtembergs. Teil 1 und Teil 2. Verlag Eugen Ulmer, 1006 pp.
- WIRTH V. 1995. Flechtenflora. Bestimmung und ökologische Kennzeichnung der Flechten Südwestdeutschlands und angrenzender Gebiete. Verlag Eugen Ulmer, 661 pp.
- ZOCCHI A. 1997. Resoconto dell'escursione lichenologica e naturalistica sulle Alpi *ticinesi* 22 23 giugno 1996. Bollettino della Società ticinese di scienze naturali, 85, 1997 pp. 13–14.
- ZOCCHI A. 2002. Quelques lichens fréquents dans la région de Piora, in Ecologie microbienne moléculaire : symbiose des organismes aquatiques et terrestres, Edizioni Centro di Biologia alpina, Piora, pp. 5.