Zeitschrift: Memorie / Società ticinese di scienze naturali, Museo cantonale di

storia naturale

**Herausgeber:** Società ticinese di scienze naturali ; Museo cantonale di storia naturale

**Band:** 11 (2012)

**Artikel:** Erste Sammelergebnisse von Pflanzenwespen (Hymenoptera:

Symphyta) im Val Piora (Kanton Tessin, Schweiz) mit zwei

neugefundenen Arten für die Schweiz

**Autor:** Peter, Bruno

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-981665

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

# **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

# Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 20.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Erste Sammelergebnisse von Pflanzenwespen (Hymenoptera: Symphyta) im Val Piora (Kanton Tessin, Schweiz) mit zwei neugefundenen Arten für die Schweiz

## **Bruno Peter**

Rigistrasse 29, CH-6314 Unterägeri (bpeter.sym@gmx.ch)

Primi risultati sulle raccolte di Imenotteri Sinfiti (Hymenoptera: Symphyta) della Val Piora (Cantone Ticino, Svizzera) con la segnalazione di due nuove specie per la Svizzera

Riassunto. Durante il periodo 1974-2010 l'autore ha raccolto nella regione di studio della Val Piora (Cantone Ticino, Svizzera) 124 specie di imenotteri sinfiti (Hymenoptera: Symphyta) in diversi ambienti dell'orizzonte subalpino e alpino. Tra queste figurano 2 specie rilevate per la prima volta in Svizzera: *Cephalcia annulicornis* (Hartig) e *Cephalcia fulva* Battisti & Zanocco. Nell'articolo si confronta la composizione del popolamento di sinfiti del Parco nazionale svizzero e quello della Val Piora. Per le specie subalpine e alpine presenti in Val Piora viene indicata la distribuzione geografica nei paesi alpini. I risultati dell'autore sono integrati con 28 specie di sinfiti provenienti dalle ricerche ecologiche e faunistiche condotte da F. Rampazzi nelle torbiere subalpine della zona di studio. Sono inoltre illustrati i risultati dell'azione "48 ore della biodiversità in Val Piora" (24-25.7.2010).

First results of Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) surveys of the Piora Valley (Canton Ticino, Switzerland) with regard to two new records for Switzerland

**Abstract.** In the Piora Valley study area (Canton Ticino, Central Alps, Switzerland) 124 species of Sawflies (Symphyta) of several subalpine and alpine altitudinal levels have been reported between 1974 and 2010. Two species found in Piora are new records for Switzerland: *Cephalcia annulicornis* (Hartig) and Cephalcia fulva Battisti & Zanocco. The faunistic composition of Symphyta from Piora is listed and compared to that of the Swiss National Park. Alpine and sub-alpine Sawfly are presented in relation to their habitat and geographic distribution in the alpine arc (in alpine countries). Taking into account the results of the ecological and faunistical study carried out by F. Rampazzi, Lugano, in 1992-1993 on the subalpine swamps of the Piora Valley, 28 species are added to the already known data. Besides historical data, the results obtained during the "Biodiversity days" (July 23-25, 2010) are presented.

Keywords: high altitude sawflies, alpine biodiversity, southern Swiss Alps

## **EINLEITUNG**

Das Val Piora beherbergt viele Habitate, welche die Entwicklung der Pflanzenwespen begünstigen. Erstmals wurden im Val Piora von Theodor Steck, Bern, drei Blattwespen-Arten (STECK 1893) erwähnt. In dieser Publikation werden die ersten Ergebnisse einer längeren Sammelperiode 1974-2010 des Autors im Val Piora veröffentlicht. Ergänzt werden die Resultate durch die ökologischen und faunistischen Untersuchungen von 1992-1993 durch Herrn Filippo Rampazzi, Lugano. Eine Erweiterung der Resultate erfolgt durch den Anlass der "48 Stunden Biodiversität", der vom 24./25. Juli 2010 im Val Piora durch das Team vom Museo cantonale di storia naturale, Lugano durchgeführt wurde.

## UNTERSUCHUNGSGEBIET, MATERIAL UND METHODEN

Eine geografische Karte (Fig. 1) gibt über das Untersuchungsgebiet und über die Artenverteilung Auskunft. Während 26 Jahren (1974-2010) sind in diesem Gebiet, an 134 Sammeltagen Pflanzenwespen-Imagnies erbeutet worden (inklusive Untersuchung von F. Rampazzi und Biodiversität-Tagungen 2010). Die Tiere wurden vom Autor mehrheitlich mit gezieltem Netzfang oder mit Streifen des Netzes über der Krautschicht und Abstreifen an Gebüschen und Bäumen gesammelt. Während der Untersuchung von 1992-1993 wurden die Pflanzenwespen mit Netz oder Gelbschalen und während der Biodiversität-Tagungen mit Netz, Gelb- und Weissschalen erbeutet. Im Untersuchungsgebiet wurden die Pflanzenwespen in 14 verschiedenen Lebensräumen gesammelt und beobachtet. Die Grundlagen für die Bestimmung der Habitate




Fig. 1 – Verteilung der während 26 Jahren (1974–2010) im Untersuchungsgebiet gesammelten Symphyten-Arten.

basieren auf der Publikation über die Lebensräume der Schweiz (Delarze & Gonseth 2008) und der Alpenflora (Landolt 2003). Die Höhenverteilung erstreckt sich von subalpin bis alpin, von Piora (1750 m ü. M.) bis Lago di Dentro (2500 m ü. M.) oder Bassa del Lago Scuro (2480 m ü. M.).

Während der Periode 1990-1993 wurde von F. Rampazzi eine ökologische und faunistische Studie verschiedener Insektengruppen in Moorgebieten der Alpensüdseite in den Kantonen Tessin und Graubünden durchgeführt. Mit diversen Fangmethoden wurden an 20 Stellen zwischen 275 und 2020 m ü.M. Insekten eingesammelt und ausgewertet (RAMPAZZI, COTTI, MATTHEY & GEIGER 1992, RAMPAZZI 1997, RAMPAZZI & DETHIER 1997, RAMPAZZI 1998 und RAMPAZZI 2002). Die Sammelstellen von 1992-1993 im Val Piora liegen im subalpinen Moorgebiet von Cadagno di Fuori (Koordinaten 696.880/155.960, Höhe 1915 m ü. M., Fläche 1,3 ha) und im subalpinen Lärchen-Arvenwald des Canariscio di Ritóm (Koordinaten 696.160/154.430, Höhe 1950 m ü.M., Fläche 1,8 ha). Die Untersuchungsfläche des Canariscio di Ritóm ist heterogen, mosaikartig von verschiedenen Pflanzenformationen durchzogen. Weitere Informationen über die Sammelstationen und Fangmethoden befinden sich in den oben erwähnten Literatur.

Die Imagines wurden zu Hause präpariert und determiniert. Die determinierten Tiere wurden mit den Arten der eigenen Sammlung und der Sammlung des Schweizerischen Nationalparks am Bündner Naturmuseum in Chur verglichen. Die in 70 % Alkohol gelegten Tiere von F. Rampazzi waren teilweise schwieriger zu bestimmen, weil sie sich entfärbten und aufblähten. Als Ausgangsbasis für die Bestimmung der Pflanzenwespen (Symphyta) diente die Britische Fauna (Benson 1951, 1952, 1958, Quinland & Gauld 1981). Als Ergänzung für die mitteleuropäischen Arten wurden die Werke von Enslin (1912-1918), Zhelochovtsev 1988) und Viitasaari (2002) konsultiert. Bei vielen Arten wurden die Genitalien beider Geschlechter zur Bestimmung herangezogen und teilweise präpariert.

#### **RESULTATE**

Systematische Verteilung der Arten und Individuenzahlen in den verschiedenen Habitaten Insgesamt wurden 124 Arten und 2'672 Individuen erfasst, davon sind 1'555 Weibchen und 1'117 Männchen (s. Tab. 1 im Anhang). Am meisten Arten kommen in den feuchteren Lebensräumen wie Grünerlengebüsche, Alpenrosenheide, Lärchen-Arvenwald und Gebirgshochstaudenflur vor. Im ganzen Untersuchungsgebiet verbreitet und zahlenmässig stark vertreten sind die folgenden Ubiquisten: Dolerus aeneus, Pachyprotasis rapae, Rhogogaster punctulata, Tenthredo arcuata, T. brevicornis, T. crassa, T. mioceras, T. olivacea, T. obsoleta und Tenthredo velox. Die Flugzeiten der Imagines erstrecken sich im

Untersuchungsgebiet, je nach Witterung von Mitte Juni bis anfangs Juli. Verschiedene *Dolerus*- und *Amauronematus-Arten* fliegen bereits ab anfangs Mai.

Ökologisch und faunistische Untersuchung in subalpinen Moorgebieten

Im Val Piora sind an den beiden von F. Rampazzi durchgeführten Untersuchungsstellen im subalpinen Moorgebiet Cadagno di Fuori und des Canariscio di Ritóm 28 Pflanzenwespenarten mit 122 Individuen, davon 85 Weibchen und 37 Männchen an 7 Sammeltagen (1992: 5, 1993: 2 Sammeltage) gefangen worden. Die Mehrheit der Arten an beiden Fundstellen gehören zu den Ubiquisten. Monoctenus obscuratus und Pristiphora mollis sind nicht im Moorgebiet zu finden. M. obscuratus fliegt an blühendem Juniperus communis, und die Larven fressen an den Nadeln dieser Pflanze. P. mollis ist häufig in der Alpenrosenheide zu finden. Ihre Larve frisst an Vaccinium spec. Typische Vertreter der subalpinen und alpinen Höhenstufe sind Dolerus alpinus und Tenthredo simplex. Einige Tenthredo-Arten sitzen auch auf verschiedenen Doldenblüten, weil die Nektarien für die Blattwespen leicht zugänglich sind.

#### **BIODIVERSITÄT-TAGUNGEN 2010**

Verschiedene SammlerInnen erfassten während der Biodiversität-Tagungen 17 Arten mit 65 Individuen (s. Tab. 1 im Anhang, Arten mit "B" gekennzeichnet). Sie sind in verschiedenen Habitaten wie Grauerlengebüsche, Hochstaudenfluren, Alpenrosenheide, Krummseggenrasen und Kleinseggenriedern gefangen worden. Erwähnenswert sind Nematus poeci-Ionotus und Pristiphora Iaricis. N. poecilonotus ist in der Schweiz noch wenig beobachtet und registriert worden. Sie ist aus den Kantonen GE, SO, TG und TI bekannt. Ihre Larve frisst auf Betula pendula (LACOURT 1999). Nematus laricis ist in der montanen und subalpinen Stufe gesammelt worden. Ihre Larve frisst an Larix decidua (SCHEDL 1976).

Neue Arten für die Schweizer Symphytenfauna

1. Cephalcia annulicornis (Hartig, 1837) Funddaten im Untersuchungsgebiet: 1 9, 09.07.1981, Can. di Ritóm, 1900 m, 1 9, 10.07.1982, Can. di Campo, 2050 m, 1 ♀, 15.07.1983, Can. di Ritóm, 1950 m, 1 ♀, 04.07.2004, Can. di Ritóm, 1960 m, 1 đ, 22.06.2006, Bocchetta di Föisc, 1900-2100 m, 1 đ, 22.06.2006, Bocchetta di Föisc, 1900-2100 m, 1 đ, 27.06.2006, Piora, 1860-2000 m, 2 d, 30.06.2006, Can. di Campo, 2000-2100 m. Frasspflanze: Picea abies. Die Art gleicht C. alpina und ist nach VIITASAARI (2002) determiniert worden. Europäische Verbreitung: Deutschland, Italien, Polen, Tschechien und Ukraine (Taeger et al. 2006). Weitere Fundorte in der Schweiz: 1 3, 02.04.1990, Amriswil (TG), Hudelmos, 515 m, leg. H. Blöchlinger; 1 ♂, 01.06.1982, Val Canaria, Pian di Sciüch, 1850 m; 1 ♂, 12.06.1983, Leitschachtal (UR), Heitersbüel, 1550 m; 1 ♂, 07.05.1995, Wildspitz (SZ) Blattenbännli, 1520 m; 1 ♂, 02.06.2008, Arosa (GR), Seehalde, 1760-1790 m; 1 ♀, 13.06.2008, Bergün, Preda (GR), Val Zavretta, 1800-1840 m; 1 ♀, 14.06.2008, Bergün, Preda (GR), Punt Ota, 1640-1680 m, leg. F. Amiet; 1 ♂, 23.05.2009, Mte Tamaro (TI), Alpe di Neggia, 1450 m; 1 ♀, 01.07.2010, Hospental (UR), St. Annaberg, 1820 m.

Cephalcia fulva Battisti & Zanocca, 1994
 Funddaten im Untersuchungsgebiet: 1 ð,
 24.05.2007, Val Piora, Mötoi, 1800-2000
 m, Heidelbeer-Fichtenwald. Frasspflanze:
 Picea abies. Die Art gleicht einer hellen C.
 arvensis und ist nach Battisti (1994) determiniert worden. Europäische Verbreitung:
 Deutschland, Italien, Polen, Slowakei,
 Tschechien und Ukraine (TAEGER et al.
 2006).

#### **DISKUSSION**

## Gegenüberstellung der Zusammensetzung der Symphytenfauna im Nationalpark (GR) und dem Val Piora (TI)

Die Nationalparkstudie (BENSON 1961) ist der erste Beitrag zur Symphytenfauna im alpinen Raum (Tab. 2). Daran hatten sich viele sammlerisch tätige Entomologen im Zeitraum 1919-60 beteiligt. Nach neueren taxonomischen Erkenntnissen reduziert sich die Anzahl Arten von 192 auf 187. Grosse Unterschiede in der

Tab. 2 — Gegenüberstellung der Zusammensetzung der Symphytenfauna im Schweizerischen Nationalpark (GR) und dem Val Piora (TI).

Ergebnisse Natio	nalpark	1961	Ergebnisse Val Piora 1974-2010										
Familie	Art	enzahl	Art	enzahl	Individuenzahl								
	n	%	n	%									
Xyelidae	3	1.61			×								
Argidae	5	2.68	6	4.84	104								
Tenthredinidae	148	79.14	101	81.45	2531								
Diprionidae	6	3.21	2	1.61	44								
Cimbicidae	9	4.81	3	2.42	21								
Pamphiliidae	10	5.35	10	8.06	83								
Megalodontesidae	1	0.53	1	0.81	4								
Cephidae	2	1.07											
Siricidae	1	0.53	1	0.81	7								
Xiphydriidae	2	1.07											
Total	187	100.00	124	100.00	2794								
Unterfamilien der	Art	enzahl	Art	enzahl	Individuenzahl								
Tenthredinidae	n	%	n	%									
Allantinae	18	12.16	11	10.89	37								
Blennocampinae	8	5.41	11	10.89	37								
Heterarthrinae	1	0.68	2	1.98	2								
Nematinae	59	39.86	32	31.68	227								
Selandriinae	16	10.81	12	11.88	493								
Tenthredininae	46	31.08	33	32.68	1735								
Total	148	100.00	101	100.00	2531								

Tab. 3 – Übersicht der Arten mit einer Verbreitung in den Alpenländern.

Datum: Erstes und letztes Fangdatum in Untersuchungsgebiet Höhe: Minimale und maximale Höhe Höhenstufen: Subalpin: 1750-2100 m, alpin: 2100-2500 m Geografische Verbreitung: nach TAEGER et al. 2006. Abkürzungen für die aufgeführten Länder: AT: Österreich, CH: Schweiz, CZ: Tschechien, DE: Deutschland, FI: Finnland, FR: Frankreich, GB: Grossbritannien, IT: Italien, SE: Schweden

						GEOGRAFISCHE
ARTEN	Q	ਹੈਂ	DATUM	HÖHE	HÖHENSTUFE	VERBREITUNG
Aglaostigma alboplagiatum		1	22.06.06	2100-2180 m	alpin	CH, FR, IT
Aglaostigma subalpinum	1	1	6.6.2007-30.6.2009	2100-2245 m	alpin	CH, FR
Amauronematus alpicola	2		20.06.06	1950-2000 m	subalpin	AT, CH, CZ, FR, IT
Amauronematus godmani	3	2	4.7.1999-2.7.2008	1950-2250 m	subalpin-alpin	AT, CH, FR, GB
Amauronematus hyperboreus	12		22.7.1983-22.6.2006	2020-2300 m	alpin	AT, CH, FI, SE
Amauronematus opacipleuris	3	1	19.7.1983-2.7.2006	2200-2480 m	alpin	AT, CH, FR
Dolerus alpinus	5	13	22.7.1977-30.6.2004	1840-2240 m	subalpin-alpin	AT, CH, DE, FR, IT
Dolerus bensoni	3	14	24.7.1984-1.7.2009	1800-2250 m	subalpin-alpin	CH, DE, FR, IT
Dolerus frigidus		6	1.6.1982-20.6.2006	1860-2000 m	subalpin	AT, CH, DE, FR, IT
Dolerus laevigatus		5	4.7.1987-27.6.2006	2200-2480 m	alpin	AT, CH, DE
Nepionema helveticum	2	1	11.7.1974-27.6.2006	1960-2200 m	subalpin-alpin	AT, CH, DE, IT
Pristiphora bensoni	2	1	10.7.1988-1.7.2009	1920-2300 m	subalpin-alpin	AT, CH, FR
Tenthredo simplex	21	1	23.7.1980-8.7.2008	1860-2250 m	subalpin-alpin	AT, CH, DE, FR

Zusammensetzung der Symphytenfauna zum Nationalpark sind nicht vorhanden, obwohl das Untersuchungsgebiet viel kleiner ist als der Nationalpark. Im Val Piora sind aus den Familien der Xyelidae, Cephidae und Xiphydriidae keine Arten gefangen worden. Die Vertreter der Xyelidae sind kleine Tiere < 5 mm und fliegen zeitig im Frühjahr. Ende April und im Mai ist das Untersuchungsgebiet wegen Lawinengefahr und Schneebedeckung mühsam zu erreichen. Die prozentualen Anteile der Diprionidae und Cimbicidae liegen tiefer als im Nationalpark. Vermutlich liegt die Ursache darin, dass der flächenmässige Anteil der Nadelholz- und der Laubbaumbestände im Val Piora viel geringer ist als im Nationalpark. Das ist auch aus dem geringeren Prozentsatz der Unterfamilie Nematinae ersichtlich, weil sich darunter viele Nadel und Laubblätter fressende Arten befinden.

Übersicht der Arten mit einer Verbreitung in den Alpenländern

Die Tabelle 3 enthält subalpine und alpine Arten, die nur aus der Schweiz und den angrenzenden Ländern aus den alpinen Gebieten bekannt sind. Über die Lebensweise dieser Arten ist sehr wenig bekannt, einzig, dass die Larven der *Amauronematus*- und *Pristiphora*-Arten an Salix fressen (LACOURT 1999). Die Frasspflanzen der restlichen Arten sind

unbekannt. Im Untersuchungsgebiet wurden die meisten Arten mit dieser Verbreitung in den Schneetälchen, Weidengebüschen und Alpenrosenheide gefangen. Sie zählen zu den alpisch-endemischen Faunenelementen (SCHEDL 1976). Aglaostigma alboplagiatum und Nepionema helveticum kommen auch in der subalpinen Zone vor. A. alboplagiatum 1 Männchen ist im Val Leventina, in Brugnasco (TI) bei Monda am 10.05.2008 auf 1500 m gefunden worden. N. helveticum 1 Männchen wurde am Mte Tamaro (TI) am 23.05.2009 auf Tamaretto 1690 m in einer Alpenrosenheide eingefangen.

# DANK

Ich danke Dr. Jürg Müller, Chur, der mir am Bündner Naturmuseum den Zugang zur Nationalpark-Sammlung ermöglicht hat, und Ulrich Schneppat, der mir gestattete die Sammlung eingehend zu untersuchen und die von Dr. R. B. Benson determinierten Tiere auszuleihen, um sie nachzubestimmen. Besten Dank an Filippo Rampazzi, Lugano für das Ausleihen





Fig. 2 – *Tenthredo olivacea* (foto B. Peter).

Fig. 3 – *Dolerus germanicus* (foto B. Peter).

der Pflanzenwespen im Val Piora und Michele Abderhalden, Lugano für seine Publikationshilfen und das Überlassen der Blattwespen der Biodiversität-Tagungen 2010 im Val Piora; an Ruedi Stäuble, Baar, für die mehrmalige Begleitung und Blattwespen-Gespräche auf meinen Fangexkursionen und meiner Frau für die Durchsicht des Manuskriptes, für die Begleitungen und anregenden Diskussionen.

#### **LITERATUR**

- BATTISTI A. & ZANOCCO D. 1994. Biosystematics of Cephalcia arvensis Panzer group. I. Description of Cephalcia fulva n. sp. (Hymenoptera, Pamphiliidae). Redia 77: 297-311.
- BENSON R. B. 1951. Hymenoptera, Symphyta. Handbooks for the Identification of British Insects, London 6(1b): 1–49. [Bestimmungsschlüssel]
- Benson R. B. 1952. Hymenoptera, Symphyta. Handbooks for the Identification of British Insects, London 6(2b): 51–137. [Bestimmungsschlüssel]
- Benson R. B. 1958. Hymenoptera, Symphyta. Handbooks for the Identification of British Insects, London 6(2c): 139–258. [Bestimmungsschlüssel]
- BENSON R. B. 1961. The sawflies (Hymenoptera Symphyta) of the Swiss National Park and surrounding Area. Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen im Schweizerischen Nationalpark, Liestal 7 (N.F.) (44): 161–195.
- DELARZE R. & GONSETH, Y. 2008. Lebensräume der Schweiz. Ott Sachbuchverlag: 1-424.
- ENSLIN E. 1912-1918. Die Tenthredinoidea Mitteleuropas. Deutsche Entomologische Zeitschrift Berlin. Beihefte 1-7: 1-790, 153 Fig. [Bestimmungsschlüssel]
- LACOURT J. 1999. Répertoire des Tenthredinidae ouestpaléarctiques (Hymenoptera, Symphyta). Mémoires de la SEF, Paris 3: 1–432.
- LANDOLT E. 2003. Unsere Alpenflora. Schweizer Alpen-Club SAC: 1-341, Tafel 1-136.
- RAMPAZZI F. 1997. I Coleotteri Carabidi (Coleoptera: Carabidae) delle torbiere a sfagni del Cantone Ticino e del Moesano (Val Calanca e Val Mesolcina - GR), Svizzera. Bollettino della Società ticinese di Scienze naturali 85(1-2): 47-57.
- RAMPAZZI F. 1998. Le libellule (Insecta: Odonata) delle torbiere a sfagni del Cantone Ticino e del Moesano (Val Calanca e Val Mesolcina GR), Svizzera. Bollettino della Società ticinese di Scienze naturali 86(2): 19-27.
- RAMPAZZI F. 2002. I Ditteri Dolicopodidi (Diptera: Dolichopodidae) delle torbiere a sfagni del Cantone Ticino e del Moesano (Val Calanca e Val Mesolcina - GR), Svizzera. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. 75, 87-111.
- RAMPAZZI F., COTTI G., MATTHEY W. & GEIGER W. 1992. Etude des comunautés des macro-arthropodes dans les hauts-marais et marais de transition d'importance nationale du Tessin et du Moesano (V. Calanca et V. Mesolcina GR). Résumé du projet. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. 65 (1-2): 201-202.
- schen Gesellschaft. 65 (1-2): 201-202.

  RAMPAZZI F. & DETHIER M. 1997. Gli Eterotteri (Insecta: Heteroptera) delle torbiere a sfagni del Cantone Ticino e del Moesano (Val Calanca e Val Mesolcina GR), Svizzera. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. 70, 419-439.
- QUINLAN J. & GAULD J. 1981. Symphyta (except Tenthredinidae). Hymenoptera. New Edition. Handbooks for the Identification of British Insects VI, London 2(a): 1-67. [Bestimmungsschlüssel]
- SCHEDL, W. 1976. Untersuchungen an Pflanzenwespen (Hymenoptera: Symphyta) der subalpinen bis



alpinen Stufe der zentralen Ötztaler Alpen (Tirol, Österreich) (Alpin-biologische Studien VIII). - Veröffentlichungen der Universität Innsbruck, Innsbruck 103: 1-85.

- STECK, T. 1893. Beiträge zur Kenntnis der Hymenopterenfauna der Schweiz: 1. Tenthredinidae. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, Zürich 9 (1): 1-45.
- TAEGER, A., BLANK, S. M. & LISTON, A. 2006. European Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) A Species Checklist for the Countries. In: BLANK, S. M., SCHMIDT, S. & TAEGER, A. (eds): Recent Sawfly Research: Synthesis and Prospects. Keltern, Goecke & Evers: 399-504.
- VIITASAARI, M. 2002. The Northern European taxa of Pamphiliidae (Hymenoptera). In: VIITASAARI, M.; (Hrsg.): Sawflies (Hymenoptera, Symphyta) I. A review of the suborder, the Western Palaearctic taxa of Xyeloidea and Pamphilioidea. Helsinki, Tremex 1: 235-358. [Bestimmungsschlüssel]
- ZHELOCHOVTSEV, A. N. 1988. Pereponchatokrylye. Shestaya chast. In: Medvedev, G. C. (ed.): Opredelitel' nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR. Nauka, Leningrad 3(6): 3-237. [Bestimmungsschlüssel]

Fig. 4 – *Tenthredo velox* (foto B. Peter).

Tab. 1 — Sammelergebnis der Pflanzenwespen (Symphyta) und ihre Verteilung auf die Habitate. Die Arten sind systematisch (TAEGER *et al.* 2006) nach Familien und Unterfamilien und innerhalb der Unterfamilie alphabetisch geordnet. Die Habitate sind nach ihrem Code angeordnet.

ARTENLISTE	Kalkarme Quellfur 1.3.3	Kalkarmes Kleinseggenried	Mitteleurop. Halb-trockenrasen	Borstgrasrase n 4.3.5	Krummseggenrasen 4.3.7	Kalkarme Schnee-tälchen 4.4.2	Gebirgshoch-staudenflur 5.2.4	Gebirgs-Weiden-gebüsch 5.3.8	Grünerlenge-büsche 5.3.9	Subalpine Zwerg-strauchheide 5.4.4	Alpenrosenheide 5.4.5	Heidelbeer-Fichtenwald 6.6.2	Lärchen-Arvenwald 6.6.3	Lärchenwald 6.6.4	Ökologische und faunistische Untersuchungen von F. Rampazzi		Letzte Beobachtung	Bemerkung
(systematisch geordnet nach Taeger et al. 2006)	Kal	Kal	ž	Во	Ϋ́	Kal	Ge	Ge	Ğ	Sul	ΑP	He	Lär	Lär	1992	1993	Fet	Ber
Argidae																		
Arge berberidis (Schrank, 1802)											•						09.06.06	
Arge ciliaris (Linné, 1767)							•		•								04.07.87	
Arge fuscipes fuscipes (Fallén, 1808)		•			•	•	•		•		•		•		CAD		02.07.08	
Arge nigripes nigripes (Retzius, 1783)			•	•		•	•		•		•		•		CDR		27.06.06	
Arge pagana pagana (Panzer, 1797)					•			•									04.07.99	
Sterictiphora geminata (Gmelin, 1790)					•				•		•						06.06.07	
Tenthredinidae																		
Allantinae	+													$\vdash$				+
Allantus rufocinctus (Retzius, 1783)	+			•	•		•		•			•					01.07.06	+
Ametastegia carpini (Hartig, 1837)	1										•				CDR		06.06.07	+
Ametastegia pallipes (Spinola, 1808)	+							•									01.07.09	+
Ametastegia tenera (Fallén, 1808)	+							•									22.06.06	+
Athalia circularis (Klug, 1815)	+															CAD	04.07.04	+
Athalia cordata Serville, 1823	-	-														CAD	08.05.07	+
Athalia rosae (Linné, 1758)	+					•						_	-		CDR		22.06.06	+
	+	-			•	•					•				CDK		15.07.81	+
Empria alpina Benson, 1938	+				•	•												$\vdash$
Empria pallimacula (Serville, 1823)	-	-		_		•											27.06.06	-
Monsoma pulveratum (Retzius, 1783)	-	_		-								•	200				30.06.09	-
Taxonus agrorum (Fallén, 1808)	-									_			•				30.06.06	$\vdash$
Blennocampinae	-	_																-
Ardis sulcata (Cameron, 1882)										•							02.06.10	$\perp$
Claremontia brevicornis (Brischke, 1883)		•			•	•		•			•		•				01.07.09	1
Claremontia puncticeps (Konow, 1886)						•											12.07.74	_
Claremontia tenuicornis (Klug, 1816)		•			•	•							•				06.06.07	$\perp$
Claremontia uncta (Klug, 1816)						•					•						07.07.10	
Claremontia waldheimii (Gimmerthal, 1847)											•				CAD		09.06.06	
Monophadnoides rubi (Harris, 1845)						•									CAD		30.06.04	
Monophadnoides ruficruris (Brullé, 1832)					•												04.07.87	
Paracharactus hyalinus (Konow, 1886)					•	•					•						27.06.06	
Rhadinoceraea bensoni Beneš, 1961										•							22.06.06	
Rhadinoceraea nodicornis Konow, 1886		•			•					•	•		•		CAD		06.06.07	
Heterarthrinae																		
Metallus pumilus (Klug, 1816)													•				23.06.08	
Scolioneura betuleti (Klug, 1816)	1									•				П			22.06.06	
Nematinae	$\top$													П				$\top$
Amauronematus alpicola Konow, 1895	$\top$	•															20.06.06	E
Amauronematus godmani Benson, 1955	$\top$					•		•			•						02.07.08	E
Amauronematus hyperboreus (Thomson, 1871)	T					•		•			•			П			22.06.06	E
Amauronematus krausi Taeger & Blank, 1998	+				•									$\vdash$			15.07.04	Ť
Amauronematus lateralis Konow, 1896	+						•							$\Box$			12.06.84	$\vdash$
Amauronematus leucolenus (Zaddach, 1883)	+																30.06.04	+
Amauronematus opacipleuris Konow, 1895	+					•		•						$\vdash$			02.07.06	E
Anoplonyx ovatus (Zaddach, 1883)	+						•										11.07.74	+
Cladius pectinicornis (Geoffroy, 1785)	+	•			•		•				•						07.07.10	-
Hemichroa australis (Serville, 1823)	+-	<u> </u>			Ť						-	•		$\vdash$			07.07.10	+
Hemichroa crocea (Geoffroy, 1785)	+	-		Ť			Ť		Ť		•	Ť		$\vdash$			04.07.87	+
Hoplocampa alpina (Zetterstedt, 1838)	-	_									_						04.07.07	1_

ARTENLISTE	Kalkarme Quellfur 1.3.3	Kalkarmes Kleinseggenried	Mitteleurop. Halb-trockenrasen	Borstgrasrase n 4.3.5	Krummseggenrasen 4.3.7	Kalkarme Schnee-tälchen 4.4.2	Gebirgshoch-staudenflur 5.2.4	Gebirgs-Weiden-gebüsch 5.3.8	Grünerlenge-büsche 5.3.9	Subalpine Zwerg-strauchheide 5.4.4	Alpenrosenheide 5.4.5	Heidelbeer-Fichtenwald 6.6.2	Lärchen-Arvenwald 6.6.3	Lärchenwald 6.6.4	Ökologische und faunistische Untersuchungen von F. Rampazzi		Letzte Beobachtung	Bemerkung
(systematisch geordnet nach Taeger et al. 2006)	3	3	Σ	B	3	3	Ü	Ü	5	Su	4	Ī	Ľ	Ľ	1992	1993		B
Hoplocampa plagiata (Klug, 1816)				•							•						04.07.87	
Nematus bergmanni Dahlbom, 1835	_								•								10.07.82	_
Nematus ferrugineus Förster, 1854										•							04.07.87	_
Nematus poecilonotus Zaddach, 1876									•				-8		2	<u>.</u>	23.07.10	В
Nepionema helveticum Benson, 1960				•		•											27.06.06	E
Pachynematus clitellatus (Serville, 1823)							•										11.07.74	_
Pachynematus imperfectus (Zaddach, 1876)							•								CDR		25.06.92	
Pachynematus obductus (Hartig, 1837)											•						21.07.83	
Pristiphora bensoni Lindqvist, 1953						•					•						01.07.09	E
Pristiphora bifida (Hellén, 1948)												•					06.07.85	
Pristiphora borea (Konow, 1904)											•						09.06.06	
Pristiphora cincta Newman, 1837											•		•		CDR	CAD	24.07.93	
Pristiphora friesei (Konow, 1904)													•				30.06.06	
Pristiphora laricis (Hartig, 1837)													•		CDR		23.07.10	В
Pristiphora lativentris (Thomson, 1871)					•	•	•		•		•		•				02.07.08	
Pristiphora mollis (Hartig, 1837)						•	•		•		•		•		CDR		06.06.07	
Pristiphora nigriceps (Hartig, 1840)												•					06.07.85	
Pristiphora saxesenii (Hartig, 1837)												•					06.07.85	
Pristiphora staudingeri (Ruthe, 1859)						•											03.07.99	
Pseudodineura enslini (Hering, 1923)						•											30.06.04	
Selandriinae																		
Birka cinereipes (Klug, 1816)					•												27.06.06	
Dolerus aeneus Hartig, 1837	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			07.07.10	
Dolerus aericeps Thomson, 1871							•		•								09.07.94	
Dolerus alpinus Benson, 1947		•			•	•	•	•	•		•		•		CAD		01.07.09	Е
Dolerus bensoni Müller, 1985		•			•	•		•		•	•		•	•			01.07.09	Е
Dolerus frigidus Benson, 1965									•				•				20.06.06	Е
Dolerus germanicus etruscus (Klug, 1818)								•									15.07.81	
Dolerus germanicus germanicus (Fabricius, 1775)									•							7	10.07.82	
Dolerus laevigatus Hellén, 1955						•		•									27.06.06	Е
Dolerus niger (Linné, 1767)										•							02.06.10	
Dolerus varispinus Hartig, 1837					•										CDR		27.05.05	
Dolerus vestigialis (Klug, 1818)									•								19.07.82	
Stromboceros delicatulus (Fallén, 1808)						•			•				•				20.06.06	
Tenthredininae																		
Aglaostigma alboplagiatum Lacourt, 1998					•												22.06.06	Е
Aglaostigma pingue (Klug, 1817)						•	•	•		•				•	CAD		24.05.07	
Aglaostigma subalpinum Benson, 1946					•					•							30.06.09	Е
Pachyprotasis antennata (Klug, 1817)														•			28.05.09	
Pachyprotasis rapae (Linné, 1767)		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	CAD		30.06.09	В
Rhogogaster chlorosoma (Benson, 1943)									•								09.07.88	
Rhogogaster punctulata (Klug, 1817)		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	CAD/CDR	CAD	30.07.10	В
Tenthredo algoviensis Enslin, 1912		•	•	•	•		•		•		•	•	•		CAD/CDR	CAD	04.08.10	В
Tenthredo amoena Gravenhorst, 1807			•														14.07.06	
Tenthredo arcuata Forster, 1771		•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		CAD/CDR	CAD/CDR	30.07.10	В
Tenthredo atra Linné, 1758		•			•		•		•		•	•	•		CAD		03.08.10	В
Tenthredo balteata Klug, 1817			•				•		•		•		•				01.07.06	
Tenthredo brevicornis (Konow, 1886)	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		CAD/CDR	CAD/CDR	28.07.10	В
Tenthredo colon Klug, 1817							•		•				•				30.06.06	

ARTENLISTE		Kalkarmes Kleinseggenried	Mitteleurop. Halb-trockenrasen	Borstgrasrase n 4.3.5	Krummseggenrasen 4.3.7	Kalkarme Schnee-tälchen 4.4.2	Gebirgshoch-staudenflur 5.2.4	Gebirgs-Weiden-gebüsch 5.3.8	Grünerlenge-büsche 5.3.9	Subalpine Zwerg-strauchheide 5.4.4	Alpenrosenheide 5.4.5	Heidelbeer-Fichtenwald 6.6.2	Lärchen-Arvenwald 6.6.3	Lärchenwald 6.6.4	fauni Untersi	ische und stische uchungen tampazzi	Letzte Beobachtung	Bemerkung
(systematisch geordnet nach Taeger et al. 2006)	Kalkarme Quellfur 1.3.3	Kal	Ä	Bor	Kru	Kal	Gel	le G	Gri	Sub	ΑP	Hei	Lär	Lär	1992	1993	Let	Ber
Tenthredo crassa Scopoli, 1763		•	•	•	•		•		•		•		•		CAD	CAD	04.08.10	В
Tenthredo cunyi Konow, 1886									•		•						09.07.88	
Tenthredo ferruginea Schrank, 1776							•		•				•				27.05.05	
Tenthredo ignobilis Klug, 1817													•			CDR	23.06.08	
Tenthredo koehleri (Klug, 1817)									•				•				28.07.10	В
Tenthredo korabica Taeger, 1985				•	•	•	•				•					CAD/CDR	30.07.10	В
Tenthredo livida Linné, 1758		•	•								•						03.08.10	В
Tenthredo mesomela Linné, 1758		•	•				•		•		•	•	•	•			28.07.10	В
Tenthredo mioceras (Enslin, 1912)		•	•	•	•	•	•		•			•	•	•			03.08.10	В
Tenthredo moniliata Klug, 1817	+			•					•								01.07.06	
Tenthredo notha Klug, 1817			•				•		•		•		•				20.06.06	+
Tenthredo obsoleta Klug, 1817	+	•		•	•	•			•		•		•				04.08.10	В
Tenthredo olivacea Klug, 1817		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		CAD		28.07.10	В
Tenthredo simplex Dalla Torre, 1882					•	•									CAD	CDR	08.07.08	E
Tenthredo solitaria Scopoli, 1763	+	•		•	•	•	•		•		•		•				30.06.06	+
Tenthredo trabeata Klug, 1817	+		•													CAD	26.06.92	$\vdash$
Tenthredo velox Fabricius, 1798	+		•		•	•				•	•		•			C/TD	03.08.10	В
Tenthredopsis nassata (Linné, 1767)	+						-		•		-		•				23.06.08	
Tenthredopsis scutellaris (Fabricius, 1804)	+										•		H				01.07.06	$\vdash$
Diprionidae																		
Monoctenus juniperi (Linné, 1758)	+										•						12.07.83	+
Monoctenus obscuratus (Hartig, 1837)										•	•				CDR		07.07.10	$\vdash$
Cimbicidae																	07107110	
Trichiosoma lucorum (Linné, 1758)									•								10.07.82	
Trichiosoma sorbi Hartig, 1840									•								10.07.82	$\Box$
Corynis obscura (Fabricius, 1775)			•	•			•		•				•				20.06.06	
Pamphiliidae  Acantholyda posticalis pinivora Enslin, 1918									•								04.07.04	
Cephalcia alpina (Klug, 1808)	+-					_											19.07.83	-
Cephalcia annulicornis (Hartig, 1837)	+																30.06.06	N
Cephalcia arvensis Panzer, 1803				-					•		Ť		+				24.05.07	IN
Cephalcia fulva Battisti & Zanocco, 1994									Ť				-					N-I
	+									-	_	•					24.05.07	N
Cephalcia lariciphila (Wachtl, 1898)	+		_						•		•	•	-				02.06.10	-
Pamphilius balteatus (Fallén, 1808)	-		•	-		_	-						-	100			25.07.84	-
Pamphilius hortorum (Klug, 1808)	+			-			•		•				-				09.07.94	-
Pamphilius pallipes (Zetterstedt, 1838)	-			-			•		•				-				01.07.06	-
Pamphilius sylvaticus (Linné, 1758)									•								13.07.81	
Megalodontesidae																		
Megalodontes cephalotes (Fabricius, 1781)			•	•									•				14.07.06	
Siricidae																	22.27.22	
		1											•				22.07.82	1
Urocerus gigas gigas (Linné, 1758)	-	0-	40	0-	2-	20	4-	4-	=-	4-	= 0	40	4-	40	c=	4.0		+
Anzahl Arten Anzahl Imagines	33	25 71		21	37 126	-	41		_	_	53		46 246		25 83	10 39	Total: 2794	

Ökologische und faunistische Untersuchungen von F. Rampazzi 1992-93 im Val Piora

CAD: Sammelstation Cadagno di Fuori: Subalpines Moorgebiet, Koordinaten: 696.880/155.960, Höhe: 1915 m, Fläche: 1,3 ha

CDR: Sammelstation Canariscio di Ritóm: Subalpiner Lärchen-Arvenwald, Koordinaten: 696.160/154.430, Höhe: 1950 m, Fläche: 1,8 ha

Bemerkungen
B: Artenfunde der Biodiversität 24.-25.07.2010
N: Neufund für die Schweiz
E: Endemit der Alpen