

Zeitschrift: Mitteilungen des Statistischen Bureaus des Kantons Bern
Herausgeber: Statistisches Bureau des Kantons Bern
Band: - (1968)
Heft: 54

Artikel: Kostenabhängigkeit in den bernischen Bezirksspitalern = Facteurs influants sur les frais dans les hôpitaux des districts bernois
Autor: [s.n.]
Kapitel: 3: Synopsis grundlegender Ansätze
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-850384>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

3 Synopsis grundlegender Ansätze

Ansatz	Nr.
Einfache lineare Regression und Korrelation	
(1) Das Modell	
$y = \alpha + \beta x + \varepsilon, \quad \text{bzw.}$	(2)
$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i.$	(3)
(2) Schätzverfahren	
Niveaunkonstante a:	
$a = \bar{y} - b_{yx} \bar{x}$	(7)
Regressionskoeffizient b:	
$b_{yx} = \frac{S(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{S(x_i - \bar{x})^2} = \frac{Sx_i y_i - \frac{1}{N}(Sx_i)(Sy_i)}{Sx_i^2 - \frac{1}{N}(Sx_i)^2} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$	(8), (10)
Regressionsgleichung:	
$Y_i = \bar{y} + b_{yx}(x_i - \bar{x}), \quad \text{bzw.}$	(11)
$Y_i = a + b_{yx} x_i$	
Streuung der Einzelwerte:	
$s_{yx}^2 = \frac{1}{N-2} \left\{ S_{yy} - \frac{S_{yx}^2}{S_{xx}} \right\} = \frac{1}{N-2} \left\{ S_{yy} - b_{yx} S_{yx} \right\}$	(16)
Bestimmtheitsmass; Korrelationskoeffizient:	
$B = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx} S_{yy}} = b_{yx} b_{xy}$	(17),
$r = \sqrt{B}$	(18)

(3) Prüfen von Hypothesen

Varianzanalyse:

Streuung	SQ	FG	DQ
Auf Regression	$b_{yx} S_{xy}$	1	$s_1^2 = b_{yx} S_{xy}$
Um Regression	$S_{yy} - b_{yx} S_{xy}$	$N - 2$	$s_2^2 = s_{yx}^2$
Insgesamt	S_{yy}	$N - 1$.

(21)

Niveaunkonstante a:

$$t = \frac{a - \alpha}{s_{yx}} \sqrt{N}, \quad \text{bzw. } t = \frac{a}{s_{yx}} \sqrt{N} \quad (24)$$

Regressionskoeffizient b:

$$t = \frac{b_{yx} - \beta}{s_{yx}} \sqrt{S_{xx}}, \quad \text{bzw. } t = \frac{b_{yx}}{s_{yx}} \sqrt{S_{xx}} \quad (25), (26)$$

Bestimmtheitsmass:

$$F = \frac{B S_{yy} (N - 2)}{S_{yy} (1 - B)} = \frac{B (N - 2)}{(1 - B)} \quad (27)$$

mit: $n_1^* = 1$ und $n_2^* = (N - 2) FG$

(4) Vertrauensgrenzen der Schätzung

Regressionsparameter:

$$a \pm t_P s_{yx} / \sqrt{N} \quad (32)$$

$$b \pm t_P s_{yx} / \sqrt{S_{xx}} \quad (31)$$

Regressionswerte Y_i :

$$s_Y^2 \sim s_{yx}^2 \left\{ \frac{1}{N} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right\}, \quad \text{bzw.} \quad (33)$$

$$Y_i \pm t_P s_Y \quad (34.2)$$

Ansatz	Nr.
<p style="text-align: center;">Einfache nichtlineare Regression</p> <p>(1) Transformation auf den linearen Fall</p> <p style="margin-left: 40px;">$Y = ab^x$, bzw. $\log Y = \log a + x (\log b)$</p> <p style="margin-left: 40px;">$Y = ax^b$, bzw. $\log Y = \log a + b (\log x)$</p> <p>(2) Mehrfache lineare Regression</p> <p style="margin-left: 40px;">$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$, mit: $x_1 = x$; $x_2 = x^2$</p> <p>(3) Orthogonale Polynome</p> <p style="margin-left: 40px;">$Y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_px^p$, bzw.</p> <p style="margin-left: 40px;">$Y = A_0 + A_1\varphi_1 + \dots + a_p\varphi_p$</p>	<p>(39)</p> <p>(40)</p> <p>(41)</p> <p>(42)</p>
<p style="text-align: center;">Mehrfache lineare Regression</p> <p>(1) Das Modell</p> <p style="margin-left: 40px;">$y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \dots + \beta_px_p + \varepsilon$</p> <p>(2) Schätzverfahren</p> <p>Niveaunkonstante a (3 Variable):</p> $a = \frac{Sy_i - b_1Sx_{1i} - b_2Sx_{2i}}{N}$ <p>Regressionskoeffizienten:</p> $b_1 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} S_{x_1y} & S_{x_1x_2} \\ S_{x_2y} & S_{x_2x_2} \end{vmatrix}; \quad \text{bzw.} \quad b_2 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} S_{x_1x_1} & S_{x_1y} \\ S_{x_1x_2} & S_{x_2y} \end{vmatrix}$ <p>mit: $\Delta = \begin{vmatrix} S_{x_1x_1} & S_{x_1x_2} \\ S_{x_1x_2} & S_{x_2x_2} \end{vmatrix}$</p>	<p>(45)</p> <p>(50)</p> <p>(51)</p>

Ansatz	Nr.
<p>Bestimmtheitsmass (totales):</p> $B_T = \frac{1}{S_{yy}} \{b_1 S_{x_1y} + b_2 S_{x_2y}\}$	(54)
<p>(3) Prüfen von Hypothesen</p>	
<p>Varianzanalyse:</p> $F = \frac{\text{DQ (auf Regression)}}{\text{DQ (um Regression)}} = \frac{s_1^2}{s_2^2}$	(57)
<p>Partielle Regressionskoeffizienten:</p> $t = \frac{b_j - \beta_j}{s/\sqrt{c_{jj}}} = \frac{b_j - \beta_j}{s_{b_j}}$ <p>$n^* = (N - p - 1)$ FG</p>	
<p>Totale Bestimmtheit:</p> $F = \frac{B(N - p - 1)}{(1 - B)p}$ <p>mit: $n_1^* = p$ und $n_2^* = (N - p - 1)$ FG</p>	(58)
<p>Partielle Bestimmtheit:</p> $F = \frac{B(N - 2p)}{(1 - B)p}$ <p>mit: $n_1^* = p$ und $n_2^* = (N - 2p)$ FG</p>	(59)
<p>(4) Vertrauensgrenzen der Schätzung</p>	
<p>Partielle Regressionskoeffizienten:</p> $b_j \pm t_p s/\sqrt{c_{jj}}, \quad \text{bzw. } b_j \pm t_p s_{b_j}$	(75)
<p>Regressionswerte:</p> $Y \pm t_p s_Y; \quad s_Y^2 \text{ nach (60).}$	