

Zeitschrift: SuchtMagazin
Herausgeber: Infodrog
Band: 27 (2001)
Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



**info set
direct**
Information und Kommunikation
im Drogen- und Suchtbereich

Die Schweizer Suchtarbeit auf dem Internet

<http://www.infoset.ch>

Drug-Screen

Jetzt noch einfacher und kostengünstiger...


Einfache Handhabung.
Ergebnis nach 3-8 Minuten.

Einzeltests

Kostengünstig in der
neuen Runddose!



Tests auch als
Multi-Test-Cards
in fünf Kombinationen lieferbar,
z.B. **Multi-5M**:



Insgesamt 10 Parameter:
Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Methadon,
Methamphetamine, Kokain, Opiate, PCP, TCA, THC

von minden GmbH

ISO 9002 zertifiziert
Carl-Peschken-Strasse 9 · 47441 Moers/Germany
Fon: +49 (0) 28 41 / 13 51 · Fax: +49 (0) 28 41 / 2 16 37
Internet: www.vonminden.de · E-mail: info@vonminden.de

Drogenmissbrauch?



**Nachweis von MTD BZO
COC AMP THC OPI BAR
und TCA**

**8 Ergebnisse in
10 Minuten**

- **Unzweideutige Interpretation auch im Cut-Off-Bereich**
- **Eingebaute Positiv- und Negativ-Reaktionskontrollen**
- **Hochspezifisches und sensitives Screening aller wichtigen Drogenmissbrauchsklassen, inklusive TCA**

Weitere Informationen unter:

MEDIM Schweiz GmbH Postfach 247, CH-6374 Buochs
Medical Diagnostic Products
Tel. 041 622 10 40 Fax 041 622 10 43 Internet: www.medim.ch

Suchen Sie ein idyllisch gelegenes Haus in familiärer Atmosphäre um Ihre **Tagungen, Retraiten, Seminare** oder ähnliches durchzuführen?

Dann ist unser


Haus Antares

in Kienberg (SO)
35 km von Basel entfernt genau das Richtige!



Max. 17 Plätze und gut erreichbar. Halb-, Vollpension oder Selbstversorgung möglich. Alles vorhanden, um in einem besonderen Ambiente Ihre Tagungen durchzuführen.

Rufen Sie uns an oder verlangen Sie die Unterlagen:
Stiftung für Sucht- und Jugendprobleme, SSJ
Holbeinstrasse 48, 4051 Basel
Tel. 061/ 271 49 59, Fax 061/ 271 46 54
E-Mail: admin@ssj-basel.ch



Angsterkrankungen
 - Sozialphobie
 - Panik
 - Zwang

Depression

Darreichungsformen: Filmtabletten zu 20 mg Paroxetin, Suspension 20 mg/10 ml. **Indikationen:** Depressive Erkrankungen, Panikstörungen, Zwangsstörungen, jeweils akute Therapie und Langzeitbehandlung; Sozialphobie, akute Therapie. **Dosierung:** *Depressionen und Sozialphobie:* Anfangs- und Standard-Dosis: 20 mg pro Tag als morgendliche Einmaldosis. Falls nötig Erhöhung auf 30 oder 40 mg. Bei Sozialphobie bis 50 mg. *Panikattacken:* Anfangsdosis: 10 mg pro Tag. Erhöhung in wöchentlichen 10 mg-Schritten bis maximal 60 mg möglich. *Zwangsstörungen:* Anfangsdosis: 20 mg pro Tag. Erhöhung in wöchentlichen 10 mg-Schritten bis zur Standard-Dosis von 40 mg. Erhöhung bis maximal 60 mg möglich. **Spezielle Dosierungsausweiterungen:** Hochdosis: bei älteren Patienten 20 mg/70 kg. Bei schwerer Nieren- oder Lebersuffizienz unteren Doisungsbereich wählen. **Kontrollmaßnahmen:** Vorsicht bei 2-Wochen-einhalten. **Vorsichtsmaßnahmen:** Vorsicht bei bekannten Kramponenfällen. Bei Kramponen oder Torsionen vor und nach Therapie mit MAO-Hemmer oder Torsotonan. Vor und nach Therapie mit trizyklischen Antidepressiva. Neuroleptika vom Phenothiazin- und Trop. 1c-Antihistaminika, Codein, Cimetidin, Phenyltol, Ithium, orale Antikondiagentien sowie bei Schwangerschaft und Stillzeit; nicht bei Kindern anwenden. **Unterwirsche Wirkungen:** Am häufigsten beobachtet: Übelkeit, Schläfrigkeit, Schwitzen, Tremor, Schwächezustände, Mundtrockenheit, Schlaftörungen, sexuelle Störungen. **Packungen / Preise:** Packungen zu 14 (Fr. 51.55), 28 (Fr. 90.70) und 98 (Fr. 255.95). Suspension 150 ml (Fr. 51.55).

gsk
 GlaxoSmithKline

SmithKline Beecham AG
 Brunnmattstrasse 13
 CH-3174 Thörishaus
 Tel. +41(0)31 888 21 11
 Fax. +41(0)31 888 21 22

Paroxetinum TM
Deroxat
*Echte Hilfe bei Depression
 und Angsterkrankungen*