

Zeitschrift: SuchtMagazin
Herausgeber: Infodrog
Band: 28 (2002)
Heft: [1]

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Darreichungsformen: Filmtablatten zu 20 mg/10ml. Suspension 20mg/10ml. **Indikationen:** Depressive Erkrankungen, Panikstörungen, generalisierte Angststörungen, Zwangsstörungen, jeweils akute Therapie und Langzeitbehandlung; Sozialphobie, posttraumatische Belastungsstörungen (ab 18 Jahren), akute Therapie. **Dosierung:** Depression: Anfangsdosierung: 20mg pro Tag als morgendliche Einmaldois. Falls notig Erhöhung auf 30 oder 40mg. Sozialphobie, generalisierte Angststörungen: Anfangsdosierung: 10mg pro Tag, Erhöhung in wöchentlichen 10-mg-Schritten bis maximal 50mg. Panikstörungen: Anfangsdosierung: 20 mg pro Tag, Erhöhung in wöchentlichen 10-mg-Schritten unter Lebensorfüllungen unten Dosierungsbereich wählen. Bei älteren Patienten oder Lebensorfüllungen unter 2 Wochen einhalten. **Vorsichtsmassnahmen:** Hochdosieren bei älteren Patienten oder Thoriotiazin 20 mg. Bei schwerer Nieren- oder Leberinsuffizienz unteren Dosierungsbereich wählen. Vorsicht bei gleichzeitiger Kampfanfallen überzeugen. Bei Kampfanfällen erhöht Blutungsrisiko. Elektroschocktherapie. Bei Kampfanfällen überzeugen sowie bei Schwangerschaft und Stillzeit nicht geben. Antikonvulsiva, Procyldin ordnen. Schafftordnung, Muntröcke, Menstruation, sexuelle Störungen, Schwächezustände.



gsk
GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline AG
Talstrasse 3-5
CH-3053 Münchenbuchsee
Tel. +41(0)31 862 2111
Fax. +41(0)31 862 2200

Paroxetinum T.M.
Deroxat

Echte Hilfe bei Depression
und Angsterkrankungen