

**Zeitschrift:** SuchtMagazin  
**Herausgeber:** Infodrog  
**Band:** 29 (2003)  
**Heft:** 1

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 11.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Nikotinfrei aus der Sucht

STOPNOW.CH  
WWW.



Zyban® ist das erste Medikament zur Raucherentwöhnung,  
das ohne Nikotin auskommt. Ein wirksames Mittel für alle,  
die wirklich aufhören wollen.



Wirkstoff: Bupropion (Amfebutamón) als Hydrochlorid. • Indikationen: zur Behandlung der Nikotinabhängigkeit. • Dosierung: Die Initialdosis beträgt 150 mg pro Tag während 6 Tagen, danach 2x täglich 150 mg, wobei ein Dosierungsintervall von 8 Stunden einzuhalten ist. Die Behandlung dauert 7 Wochen. Das Rauchen sollte vorzugsweise in der 2. Behandlungswoche eingestellt werden. Tägliche Maximaldosis ist 300 mg. • Spezielle Dosierungsanweisungen: für Patienten mit Leber- und Niereninsuffizienz. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegenüber Bupropion, bestehende oder anamnestisch bekannte Epilepsie resp. andere Anfallserkrankungen, Bulimie oder Anorexia nervosa, Einnahme von MAO-Hemmern, Tumor des ZNS, abrupter Entzug von Alkohol oder Sedativa. • Vorsichtsmassnahmen: Bei der Verabreichung von Zyban® besteht ein dosisabhängiges Risiko für Krampfanfälle; deshalb ist Vorsicht geboten bei Vorliegen prädisponierender Risikofaktoren, welche die Anfallsschwelle senken: bipolare Störungen, gleichzeitige Verabreichung von Arzneimitteln wie Antipsychotika, Antidepressiva, Antimalariamitteln, Tramadol, Theophyllin, Steroiden, Chinolonen, oralen Antidiabetika, Insulin, Stimulanzen oder Anorektika, Alkoholkonsum. Bei Patienten mit prädisponierenden Risikofaktoren soll eine Maximaldosis von 150 mg für die ganze Dauer der Behandlung in Betracht gezogen werden. • Schwangerschaftskategorie: B. • Unerwünschte Wirkungen: Schlaflosigkeit, Mundtrockenheit, gastrointestinale Beschwerden, Tremor, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel, Depressionen, Verwirrtheit, Reizbarkeit, Angstzustände, Flushing, Hautausschlag, Juckreiz, Schweißausbrüche, Geschmacksstörungen. • Interaktionen: mit Medikamenten, die das Isoenzym CYP2B6 beeinflussen und/oder durch CYP2D6 (wie bestimmte Betablocker, Antiarrhythmika, SSRIs, trizykl. Antidepressiva und Antipsychotika) abgebaut werden. • Packungen: Tabletten zu 150 mg: 40, 60, 100. • Abgabekategorie: A. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Arzneimittel-Kompendium der Schweiz.  
GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3-5, 3053 Münchenbuchsee, Tel. 031 862 21 11, Fax 031 862 22 00