Zeitschrift: SuchtMagazin

Herausgeber: Infodrog
Band: 42 (2016)

Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Alkoholkonsum erfolgreich reduzieren



Selincro® (Nalmefen). I: Zur Reduktion des Alkoholkonsums auf hohem Risiko-Niveau bei erwachsenen Patienten mit Alkoholabhängigkeit ohne körperliche Entzugserscheinungen und für die keine sofortige Entgiftung erforderlich ist. Durch geeignet qualifizierten Arzt mit Erfahrung in der Therapie von Alkoholabhängigen und nur in Verbindung mit kontinuierlicher psychosozialer Unterstützung mit Ziel der Therapieadhärenz und Reduktion des Alkoholkonsums. D: 18mg nach Bedarf möglichst 1-2 Stunden vor einem bevorstehendem Alkoholkonsum oder so schnell als möglich nach dem Konsum. Maximale Tagesdosis 1 Tablette/Tag. KI: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen Hilfsstoff, Opioid-Entzugssyndrom, -Abhängigkeit oder -Missbrauch. Schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörung. Alkoholentzugserscheinungen. Kinder und Jugendliche <18 Jahren. VM: In Notfallsituationen, falls Opioide erforderlich, möglicherweise Dosiserhöhung mit enger Überwachung bezüglich Atemdepression oder anderer Symptome erforderlich. Selincro ist nicht empfohlen bei Galaktose-Intoleranz, Lapp-Laktase-Mangel oder Glukose-Galaktose-Malabsorption. Vorsicht bei psychiatrischen Begleiterkrankungen, vormaligen Krampfanfällen, Nieren- oder Leberfunktionsstörungen, erhöhten Leberwerten. I.A. Ewen Leberfunktion mit Alkohol. SS/S: nicht empfohlen. UAW: sehr häufig: Schlaftosigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Nausea; häufig: verminderter Appetit, Schlafstörungen, Verwirrtheit, Ruhelosigkeit, Libidoverminderung (inklusive Libidoverlust), Schläfrigkeit, Zittern, Aufmerksamkeitsstörung, Parästhesien, Hypoästhesie, Tachykardie, Palpitationen, Erbrechen, Mundtrockenheit, Hyperhidrosis, Muskelspasmen, Müdigkeit, Asthenie, Unwohlsein, ungewöhnliches Empfinden, Gewichtsabnahme. ÜD: Beobachtung und symptomatische Behandlung. P: Filmtabletten zu 18mg: 14, 28 und 42 [B]. Kassenzulässig. Die vollständige Fachinformation ist unter www.swissmedicinfo.ch publiziert. Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg, www.lundbeck.ch. 03042014Fl 1. Van den Brink et al. J Psyc



Für weiterführende Informationen zum Thema Alkoholreduktion besuchen Sie: www.redalc.ch



