

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **SuchtMagazin**

Band (Jahr): **28 (2002)**

Heft [1]

PDF erstellt am: **22.09.2024**


Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Darreichungsformen: Filmtabletten zu 20 mg Paroxetin, Suspension 20 mg/10 ml. **Indikationen:** Depressive Erkrankungen, generalisierte Angststörungen, Zwangsstörungen, jeweils akute Therapie und Langzeitbehandlung; Sozialphobie, posttraumatische Belastungsstörungen (ab 18 Jahren), akute Therapie. **Dosierung:** Depressoren: Anfangsdosierung: 20 mg pro Tag als morgendliche Einmalgabe, bis zur Erhöhung auf 30 oder 40 mg. **Sozialphobie, generalisierte Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen:** Anfangs- und Standarddosierung: 20 mg pro Tag. Falls nötig Erhöhung in wöchentlichen 10-mg-Schritten bis maximal 50 mg. **Panikstörungen:** Anfangsdosierung: 10 mg pro Tag, Erhöhung in wöchentlichen 10-mg-Schritten bis maximal 60 mg möglich. **Zwangsstörungen:** Anfangsdosierung: 20 mg pro Tag, Erhöhung in wöchentlichen 10-mg-Schritten bis zur Standard-Tagesdosis von 40 mg, Erhöhung bis maximal 60 mg möglich. **Spezielle Dosierungsanweisungen:** Hochstadium bei älteren Patienten 20 mg/Tag. Bei schwerer Nieren- oder Leberinsuffizienz unteren Dosierungsbereich wählen. **Kontraindikationen:** Überempfindlichkeit gegenüber Inhalationsstoff. Keine gleichzeitige Anwendung von MAO-Hemmern oder Thioridazin. Vor und nach Therapie mit MAO-Hemmern Intervall von 2 Wochen einhalten. **Vorsichtsmaßnahmen:** Vorsicht bei Patienten mit Epilepsie, manischen oder hypomanischen Episoden, Engwinkelglaukom, Bluthochdruck oder kardialen Problemen, erhöhtem Blutungsrisiko, Elektroshocktherapie. Bei Krampfanfällen absetzen. Vorsicht bei gleichzeitiger Gabe von trizyklischen Antidepressiva, Tryptophan, Neuroleptika vom Phenothiazin-Typ, TC-Antiarithmika, Metoprolol, Codein, Cimetidin, Phenytoin, oralen Antikoagulantien sowie Abhängigkeit von Alkohol, Zigaretten, Drogen, bei Kindern anwenden; langsam und schrittweise absetzen. **Unerwünschte Wirkungen:** Am häufigsten beobachtet: Übelkeit, Schwindigkeit, Müdigkeit, Schläfrigkeit, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Stomatitis, Verstopfung, Gewichtszunahme, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Schilddrüsenhormonmangel, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Schilddrüsenhormonmangel, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Schilddrüsenhormonmangel. **Packungen:** Packungen zu 14-, 28- und 98 Filmtabletten, Suspension 150 ml. **Verkaufskategorie:** b. **kasenzulässig.** Ausführliche Angaben entnehmen Sie bitte dem Arzneimittelkompendium der Schweiz. (www.documed.ch, Fast Online)



Angsterkrankungen

- Sozialphobie
- Panik
- Zwang

Depression

Neu:

- Generalisierte Angst
- Posttraumatische Belastungsstörung



GlaxoSmithKline AG
 Talstrasse 3-5
 CH - 3053 Münchenbuchsee
 Tel. +41(0)31 862 2111
 Fax. +41(0)31 862 2200

Paroxetinum TM
Deroxat

Echte Hilfe bei Depression
 und Angsterkrankungen