

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **SuchtMagazin**

Band (Jahr): **29 (2003)**

Heft 1

PDF erstellt am: **22.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

Nikotinfrei aus der Sucht

WWW.STOPNOW.CH

ZYBAN[®]

Zyban[®] ist das erste Medikament zur Raucherentwöhnung, das ohne Nikotin auskommt. Ein wirksames Mittel für alle, die wirklich aufhören wollen.

 GlaxoSmithKline

Wirkstoff: Bupropion (Amfebutamon) als Hydrochlorid. • Indikationen: zur Behandlung der Nikotinabhängigkeit. • Dosierung: Die Initialdosis beträgt 150 mg pro Tag während 6 Tagen, danach 2x täglich 150 mg, wobei ein Dosierungsintervall von 8 Stunden einzuhalten ist. Die Behandlung dauert 7 Wochen. Das Rauchen sollte vorzugsweise in der 2. Behandlungswoche eingestellt werden. Tägliche Maximaldosis ist 300 mg. • Spezielle Dosierungsanweisungen: für Patienten mit Leber- und Niereninsuffizienz. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegenüber Bupropion, bestehende oder anamnestisch bekannte Epilepsie resp. andere Anfallserkrankungen, Bulimie oder Anorexia nervosa, Einnahme von MAO-Hemmern, Tumor des ZNS, abrupter Entzug von Alkohol oder Sedativa. • Vorsichtsmassnahmen: Bei der Verabreichung von Zyban[®] besteht ein dosisabhängiges Risiko für Krampfanfälle; deshalb ist Vorsicht geboten bei Vorliegen prädisponierender Risikofaktoren, welche die Anfallsschwelle senken: bipolare Störungen, gleichzeitige Verabreichung von Arzneimitteln wie Antipsychotika, Antidepressiva, Antimalariamitteln, Tramadol, Theophyllin, Steroiden, Chinolonen, oralen Antidiabetika, Insulin, Stimulanzien oder Anorektika, Alkoholkonsum. Bei Patienten mit prädisponierenden Risikofaktoren soll eine Maximaldosis von 150 mg für die ganze Dauer der Behandlung in Betracht gezogen werden. • Schwangerschaftskategorie: B. • Unerwünschte Wirkungen: Schlaflosigkeit, Mundtrockenheit, gastrointestinale Beschwerden, Tremor, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel, Depressionen, Verwirrtheit, Reizbarkeit, Angstzustände, Flushing, Hautausschlag, Juckreiz, Schweissausbrüche, Geschmacksstörungen. • Interaktionen: mit Medikamenten, die das Isoenzym CYP2B6 beeinflussen und/oder durch CYP2D6 (wie bestimmte Betablocker, Antiarrhythmika, SSRIs, trizykl. Antidepressiva und Antipsychotika) abgebaut werden. • Packungen: Tabletten zu 150 mg: 40, 60, 100. • Abgabekategorie: A. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Arzneimittel-Kompodium der Schweiz.
GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3-5, 3053 Münchenbuchsee, Tel. 031 862 21 11, Fax 031 862 22 00