**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen = Swiss foresty journal =

Journal forestier suisse

**Herausgeber:** Schweizerischer Forstverein

**Band:** 71 (1920)

**Heft:** 12

**Artikel:** Das Messen der Bäume hinsichtlich ihres Zuwachses

Autor: Berthout, A.H.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-765441

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 03.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

### Das Messen der Bäume hinsichtlich ihres Zuwachses.

Man sollte meinen, daß man den Zuwachs eines Waldes berechnen kann aus der Differenz zweier Aufnahmen und der während dieser Periode genutzten Holzmasse.

Währt die Veriode kurz, z. B. sechs Jahre, und gebraucht man bei der Inventarisation eine Methode, die für diesen Zweck nicht exakt genug ist, so läuft man Gesahr, einen scheinbar negativen Zuwachs zu erhalten.

Ich habe mir die Mühe genommen, die Sache einer wissenschaftlichen Prüfung zu unterwersen und habe die Resultate in einer Abhandlung publiziert, die im Laufe dieses Jahres im Druck erschienen ist (bei H. Beenman, Wageningen), unter dem Titel: "Het meten der boomen in verband met hun aanwas."

Es stellte sich dabei heraus, daß zwischen den Schaftmassen von Kiefern eines gleichalterigen Bestandes ein festes Verhältnis existiert. Ihre Massen verhalten sich wie die 2,20 Potenzen ihrer Durchmesser.

Dieses Gesetz, das vermutlich auch für andere Holzarten gilt (vielleicht ist die Potenz etwas höher oder niedriger) kann bei der Einrichtung praktisch verwertet werden.

Man sucht im Kevier drei Bestände auf, einen mit schwächern, einen mit mittleren und einen mit stärkeren Bäumen und kubiert genau von jedem Bestand 10 Bäume, die ungefähr den mittleren Durchmesser besitzen. Hierauß sind der mittlere Durchmesser und die mittlere Schaftmasse zu berechnen. Mit Hilfe dieser zwei Zahlen und der Formel  $I=i\left(\frac{D}{d}\right)^{2,20}$  ist nun die Masse der schwächern und stärkern Bäume zu berechnen, wie folgendeß Beispiel zeigt:

Schaftmasse
$\operatorname{Fm}$
0,274
0,262
0,293
0,282
0,311
0,291
0,308
0,284
0,302
0,313
2,920

Der mittlere Durchmesser ist also 20,8 cm und die mittlere Schaftmasse 0,292 Fm. Wünscht man nun zu wissen, wieviel die mittlere Schaftmasse eines Baumes von 20 cm beträgt, so hat man folgende Berechnung zu machen:

$$\begin{array}{l} \log \ D = \log \ 20 \ = \ 1,30103 \\ \log \ d = \log \ 20,8 = \ \underline{1,31806} \\ \log \ D - \log \ d \ = \ 9,98297 \ - \ 10 \\ 2,20 \ (\log \ D \ - \log \ d) \ = \ 9,96253 \ - \ 10 \\ \log \ i \ = \ \log \ 292 \ \ = \ \underline{2,46538} \\ \operatorname{Log} \ I \ = \ \log \ I_{20} \ \ = \ \underline{2,42791} \qquad I \ = \ 0,268 \ \mathrm{Fm} \end{array}$$

Ein Baum mit einem Durchmesser von 20 cm hat also eine Schaftmasse von 0,268 Fm.

Für einen andern Bestand wurden die folgenden Werte gefunden.

Durchmesser	Schaftmass
cm	$\mathbf{Fm}$
12	0,088
14	0,123
16	0,165
18	0,214
20	0,270
22	0,333
24	0,403
26	0,481
28	0,566
30	0,659

Die Tabelle braucht nur einmal berechnet zu werden und fällt bei der Anwendung das Messen der Höhen und Formzahlen weg. Natürlich werden nicht genau die Holzmassen der einzelnen Bestände gefunden. Bei den einen wird man zu viel, bei den andern zu wenig erhalten. Hat man jedoch bei der Zusammenstellung der Tabelle einen Bestand ausgewählt von mittlerer Beschaffenheit, so werden sich bei der Aufnahme eines ganzen Reviers die Fehler ausgleichen.

Handelt es sich um genaue Bestimmungen hinsichtlich des Zuwachses, so kann man die Tabelle ebenfalls sehr gut gebrauchen. Man muß alszbann jedoch am Ansang und am Ende der Periode 10 Bäume genautubieren und deren mittleren Durchmesser nebst Inhalt vergleichen mit denen der Tabelle und daraus den Reduktionsfaktor berechnen.

Am Anfang der füntjährigen Periode erhalte man für mittleren Durchmesser der 10 Bäume z. B. 21 cm und für deren mittlere Schaft-masse 0,310 Fm.

Durch Interpolieren in der Tabelle findet man für D =  $21~\mathrm{cm}$  I =  $\frac{0.210~+~0.333}{2}$  =  $0.3~015~\mathrm{Fm}$ . Der Reduktionsfaktor ist also  $\frac{310}{301.5}$ .

Die totale Masse, die man mit der Tabelle findet, muß also schließ- lich noch multipliziert werden mit  $\frac{310}{301,5}$ . Am Ende der Periode operiert man genau so. Am besten ist es, die Probestämme nicht zu fällen, sondern mit einem Kletterapparat zu besteigen und zu messen. Dieselben Bäume werden am Ende der Periode wieder gemessen zur Bestimmung des neuen Keduktionsfaktors.

Auf diese Weise findet man den Zuwachs der 10 Probestämme als Differenz der Schaftmasse am Ende und am Anfang der Periode.

Dieser Zuwachs muß übereinstimmen mit demjenigen, den man findet als Differenz der Schaftmasse aller Bäume berechnet mit der Tabelle und dem Reduktionsfaktor.

Macht man drei Tabellen, dann wird man finden z. B., daß ein Baum von 14 cm in der Tabelle der schwächeren Stämme einen andern Inhalt zeigt als in der Tabelle der mittleren Stämme. Dies ist nicht verdächtig, sondern richtig, im ersteren Fall handelt es sich um einen Herrschenden, im zweiten um einen Beherrschten.

Wageningen, Oktober 1920.

A. Herkhout.



# Vereinsangelegenheiten.

## Notizen über die außerordentliche Jahresversammlung des Schweizerischen Forstvereins in Solothurn den 20. und 21 November 1920.

Mit Kücksicht auf dringliche Erledigung wichtiger Geschäfte lud das ständige Komitee, da das Forstfest in Aaran der Seuchengesahr wegen nicht abgehalten werden konnte, nach der alten, schmuckreichen und sorststeundlichen Stadt Solothurn zu einer außerordentlichen Jahresversammslung ein, der denn auch etwa 90 Mitglieder Folge gaben und in einer einzigen Sitzung im Großratssaal sämtliche Traktanden erledigten. Aus denselben seien folgende erwähnt:

- 1. Budget pro 1921.
- 2. Wahl der Mitglieder des ständigen Komitees.
- 3. Statutenrevision der forstwirtschaftlichen Zentralstelle.
- 4. Diplomierung der Privatwaldbesitzer.

Eingehenderes werden die Leser seinerzeit aus dem hier zu veröffentlichenden Protokoll ersehen.

In Rürze sei hier folgende Orientierung gegeben: