

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie

**Herausgeber:** Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde

**Band:** 20 (1942)

**Heft:** 12

**Artikel:** Pholiota Spectabilis (Fries) Gillet : Syn.; Phol. aurea (Quel.), Phol. abructus (Fr.), Ag. quercicola (Lasch), Ag. rhabarbarinus (Krombh.), Ag. aureus (Sowerb.) : Ansehnlicher oder Rasiger Schüppling

**Autor:** Imbach, E.J.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-934384>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 15.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR PILZKUNDE

Offizielles Organ des Verbandes Schweizerischer Vereine für Pilzkunde und der Vereinigung der amtlichen Pilzkontrollorgane der Schweiz (abgekürzt: Vapko)

Erscheint am 15. jedes Monats. — Jährlich 12 Nummern.

---

**REDAKTION:** Edmund Burki, Herrenweg 11, Solothurn, Telefon: 2.34.54.

**VERLAG:** Buchdruckerei Benteli A.-G., Bern-Bümpliz; Telefon 4.61.91; Postcheck III 321.

**ABONNEMENTSPREIS:** Fr. 6.—, Ausland Fr. 7.50. Für Vereinsmitglieder gratis. Einzelnummer 60 Cts.

**INSERTIONSPREISE:** 1 Seite Fr. 70.—,  $\frac{1}{2}$  S. Fr. 38.—,  $\frac{1}{4}$  S. Fr. 20.—,  $\frac{1}{8}$  S. Fr. 11.—,  $\frac{1}{16}$  S. Fr. 6.—

---

## Pholiota Spectabilis <Fr. > Gillet

Syn.: *Phol. aurea* <Quel. >, *Phol. abruptus* <Fr. >, *Ag. quercicola* <Lasch. >,  
*Ag. rhabarbarinus* <Krombh. >, *Ag. aureus* <Sowerb. >

## Ansehnlicher oder Rasiger Schüppling.

Unser Pholiotae-Repertoire ist eines der reichhaltigsten unter den Gattungen, und es gibt da nur einige wenige Arten, meist kleinere, die noch nicht in der laufend geführten Fundliste registriert werden konnten. Um so grösser war denn die Überraschung, als die liebe Pilzfreundin, Frau Zehnder, Kriens, die übrigens unsern jeweiligen Bestimmungstisch schon mit mancher interessanten Seltenheit bereicherte, mir ein grosses Büschel prächtiger Schüpplinge brachte, deren Bestimmung offen gestanden, nicht wenig Kopfzerbrechen verursachte. Auf den ersten oberflächlichen Blick war eine gewisse Ähnlichkeit mit *Pholiota aurea*, dem Goldschüppling, nicht ohne weiteres abzusprechen, aber die Schüppchen auf dem Hute, die allerdings mehr in einer Farbzeichnung bestanden, rieten anderswo zu suchen. Dies um so mehr, da letztere Art uns Luzernern nur allzugut bekannt und geläufig ist. So blieb denn nur übrig, alle Schüpplingsbeschreibungen in Rickens Blätterpilze nochmals gründlich zu studieren, auch die bekannten Arten, denn bei einer fröhern Bestimmung konnte sich möglicherweise bei uns ein Fehler ein-

geschlichen haben. Resultat, nur eine einzige, die von *Pholiota aurea* (Pers.) Nr. 604, die hier am Schlusse wiedergegebene, wollte auf unsren schönen Fund passen. Und sie war auch die gesuchte, denn Ricken ist hier, wie wohl auch noch einigen andern Autoren, ein Schnitzer unterlaufen, den er dann im Nachtrage unter Nr. 1405 richtigstellt. Man beachte hier ganz speziell auch die angefügte Fussnote.

Ergänzend wäre noch zu berichten, dass unsere Spezies, entgegen Rickens Auffassung, doch zwischen *squarrosa* und *aurea* zu stehen kommt. Eine Ähnlichkeit zur erstern liegt in der gleichen Wachstumsform, der Farbe und den erwähnten Schüppchen, zur letztern, im nichtschuppigen Stiel, der kompakten Manschette und, wenn die Hüte gar noch von Sporenestaub überdachender Exemplare befallen sind, auch in diesen. Über die Eigentümlichkeit, dass das *velum partiale* allzugerne nahe beim Stiele reisst, wurde im Oktober-Fundbulletin bereits berichtet. Gute Abbildungen finden sich in « Les champignons de France », Ausgabe 1939, par A. Maublanc, Bd. I, S. 43,

ferner in Bresadola, Bd. XIV, Tab. 698. Bei Ricken, Taf. 55, Nr. 1, die auch *spectabilis* zeigt, fehlen die Schüppchen auf dem Hute. Dieses letztere Moment bestärkt noch die Annahme und Vermutung, dass Ricken weder *aurea* noch *spectabilis* je in Händen gehabt hat.

Interessieren dürfte noch, dass die meisten Autoren als Standort « auf Eichenstrünken »

« H u t goldfuchsig, anfangs sammetig, wie angedrückt haarig-filzig oder auch angedrückt fuchsig-faserschuppig, glanzlos, nicht schmierig, allenfalls etwas feucht, halbkugelig ausgebreitet 7—10, fast gebuckelt, fleischig, jung wie braunfilzig überzogen, öfter gefeldert-sammetig und purpurrot angelaufen. S t i e l  
blassgelb, dunkler überfasert, schliesslich nach



Pholiota Spectabilis (Fr.) Gillet, ca.  $\frac{2}{3}$  nat. Grösse  
(Originalbild von J. Imbach)

oder « am Fusse alter Eichen » vermerken, während unsere wundervolle Gruppe in der Wiese unter einem Apfelbaume gefunden wurde.

*Pholiota spectabilis* scheint, was die Schweiz anbetrifft, zu den seltenen Pilzarten zu gehören. Einige diesbezügliche Umfragen tendierten zur Bestätigung dieser Vorkommensklassierung.

Beschreibung Nr. 604 aus « Die Blätterpilze » von A. Ricken:

Basis rostbraun, mit häutigem, aufsteigendem, schliesslich niederhängendem, durch die reichlich ausfallenden Sporen roststaubigem Ring, mit blasser, filzig-mehliger Spitze, aufwärts verjüngt 8—10/15—20, fast knollig-wurzelnd, faserfleischig, voll. L a m e l l e n blass, schliesslich gleichfarbig, öfter gekerbt, gedrängt, fast schmal 5—7, abgerundet oder buchtig angewachsen. Fleisch gelb, riecht stark, fast rettichartig und schmeckt brennend-bitter, zusammenziehend.

Auf fettem Grasboden, aus fleischig-strunkigem Dauermyzel dichtrasig (20—30 Stück) hervorwachsend, jedes Jahr wiederkehrend, vielleicht auf verdecktem Baumstumpf. Sporen fast mandelförmig 9—10/5—6  $\mu$ , warzig-rauh, unter Mikroskop gelb, Basidien

fast zylindrisch 30—33/6—7  $\mu$ . *Spectabilis* (Fr.) und *villosus* (Fr.) sind kaum verschieden. Durch die auffallenden, warzigen Sporen und das stromaartige Dauermyzel ist diese Art bestens charakterisiert, von der sparrig-schuppigen *quarrosa* 599 himmelweit verschieden.»

E. J. Imbach, Luzern.

## Noch einmal *Agaricus solitarius* Bulliard.

von Hans Walty, Lenzburg.

Der Fall *solitaria-strobiliformis* ist in dieser Zeitschrift schon mehrmals behandelt worden. Ich hoffe, dass mit meinen nachfolgenden Feststellungen die Angelegenheit endgültig aufgeklärt werde.

Der Artnname *solitarius* ist ein Sammelname für zwei ganz verschiedene Amanitaarten. Es war durchaus berechtigt, den Namen *solitarius*, resp. *solitaria* aufzugeben, er hat nur noch Geltung als Synonym. Vittadini hat 1835 zuerst die eine von Bulliard beschriebene und auf Tafel 593 seines Werkes abgebildete Art als *Agaricus strobiliformis* benannt und vorzüglich abgebildet sowie beschrieben. Man behielt dann den Namen *solitaria* für die andere von Bulliard auf Tafel 48 abgebildete Art. Dieser Name wurde dann von der neueren französischen Mykologie aufgegeben und durch *Amanita pellita* ersetzt. Es gibt also keine *Amanita solitaria* mehr, dafür eine *Amanita pellita* Secretan (1833) oder Gillet (1878) und eine *Amanita strobiliformis* Vittadini (1835). Bei Konrad et Maublanc, Icon. Sélec. wird letztere als blosse Varietät von *pellita* aufgeführt, was keinesfalls berechtigt sein dürfte.

Betrachten wir nun die beiden Arten etwas näher. Sie haben gemeinsam die in allen Teilen anfänglich milchweisse Farbe und die übereinstimmenden Sporen und Basidien. Das ist aber auch alles. Wie verschieden sie sind, ersieht man aus den beigefügten Zeichnungen. *Amanita pellita* gehört zu den *Obliteratae*, zu den Glattknolligen. Die Basisknolle des Stiels, man kann sie besser als Basis rübe bezeichnen, zeigt keine Spur einer Randung. Sie geht

glatt in den Stiel über. Sie zeigt höchstens nach oben gerichtete Schuppen, bei Bulliard sind sie übertrieben, und die Knolle sieht aus wie eine Artischocke.

Querrisse zwischen Stiel und Knolle können eine Randung vortäuschen, sind aber sofort als blosse Risse erkennbar, denn sie gehen nie ganz herum.

Bei *strobiliformis* ist die Basisrube deutlich vom Stiel abgesetzt, die Art gehört zu den *Limatae*, den Beschnittenen, ähnlich *Amanita mappa*. Außerdem färbt sich die ganze Rübe bald braun, schliesslich dunkelumbrabraun.

Die Reste des allgemeinen Velums auf dem Hut sind bei *pellita* schaumig-häutig, unregelmässige, meist kleine Fetzen bildend. Sie färben sich bald grau und werden vom Regen leicht abgewaschen. Bei *strobiliformis* sind die Hüllreste dick, filzig, trocken, sie bilden eckige Warzen, geformt wie Edelsteine mit seitlichen Facetten und oben einer horizontalen Platte. Sie sitzen ziemlich fest und sind kaum ablösbar. Sie werden ebenfalls bald dunkelgrau. Die gerandete dunkelfarbige Basisrube und die festsitzenden, trockenfilzigen Hutwarzen findet man auch bei *Lepidella* (früher *Amanita*) *echinocephala*, mit der *strobiliformis* die meiste Verwandtschaft zeigt. Man hat *echinocephala* wegen dieser festsitzenden Warzen von *Amanita* abgetrennt und die neue Gattung *Lepidella* aufgestellt, die zwischen *Amanita* und *Lepiotas* steht. Eine zeitlang wurde auch *strobiliformis* dieser neuen Gattung zugeteilt, dann aber wieder zu *Amanita* zurückversetzt.