

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie

Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde

Band: 60 (1982)

Heft: 3

Artikel: Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer, Austernseitling = Pleurte coquille d'huître = Gelone

Autor: Kobler, B.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-937214>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 31.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer, Austernseitling

Fam.: *Polyporaceae*

Grosser muschelförmiger, kurzstieler Pilz, dachziegelig an Bäumen oder Laubholzstümpfen wachsend. Saprophyt an Holz, Weissfäule erzeugend.

Hut: Muschel-, zungen- bis spatelförmig, in der Farbe sehr veränderlich, von Schwarzgrau über Graubraun bis Stahlgrau und Blauschwärzlich, dickfleischig, exzentrisch gestielt, 5–15 cm breit.

Lamellen: gedrängt, weisslich, am Stiel deutlich herablaufend und netzig sich vergabelnd. Schneide fein gezähnelt.

Stiel: kurz, weisslich, am Grunde zottig, verwachsend.

Fleisch: weiss, jung weich, alt zäh und muffig riechend.

Sporen: hyalin, ± zylindrisch, 8–11 × 3–4 µm.

Standort: im Spätherbst und Vorfrühling auf Laubholz, selten auf Fichten.

Bemerkung: Bekannter Marktpilz, der sich relativ leicht auf Holz züchten lässt. B. Kobler

Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer, Pleurote coquille d'huître

Fam.: *Polyporacées*

Espèce de grande taille, carpophore courtement stipité et en forme de coquille, venant en individus superposés sur les arbres encore dressés ou sur les troncs d'arbres morts de feuillus. Saprophyte du bois, elle provoque une pourriture blanche.

Chapeau: en forme de coquille, de langue ou de spatule; très variable de couleur: de gris noir à gris brun à gris acier à noirâtre bleuté; chair épaisse; pied excentré; diamètre 5–15 cm.

Lames: serrées, blanchâtres, nettement décurrentes sur le pied, interveinées jusqu'à former un réseau; arête finement denticulée.

Pied: court, blanchâtre, hérissé de poils à la base, parfois difforme.

Chair: blanche, tendre dans le jeune âge, douce, devenant coriace et sentant le mois dans la vieillesse.

Spores: hyalines, plus ou moins cylindriques, 8–11 × 3–4 µm.

Habitat: sur feuillus, rarement sur conifères, dans l'arrière-automne ou au premier printemps.

Remarque: espèce courante sur les marchés, ce Pleurote est assez facile à obtenir en culture sur des troncs. (Trad. F. Brunelli)

Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer, Gelone

Fam.: *Polyporaceae*

Grande fungo a forma di conchiglia, a gambo corto, che cresce a cappelli imbricati su alberi o ceppi di latifoglie. Saprofito su legno, produce marciume bianco.

Cappello: a forma di conchiglia, di lingua o di spatola, molto variabile nei colori, da grigio nero a grigio bruno fino a grigio acciaio e a nero blu, carnoso, largo da 5 a 15 cm, con gambo eccentrico.

Lamelle: fitte, biancastre, nettamente decorrenti sul gambo dove si riuniscono a reticolo. Orlo finemente seghettato.

Gumbo: corto, biancastro, villoso alla base, concresciuto.

Carne: bianca, nel giovane tenera, dolce, nel fungo vecchio tenace e con odore di muffa.

Spore: ialine ± cilindriche, 8–11 × 3–4 µm.

Habitat: nel tardo autunno e nella prima primavera su legno di latifoglie, raramente su abete rosso.

Osservazione: noto perchè oggetto di vendita sul mercato, questo fungo si coltiva con relativa facilità. (Trad. G. Lucchini)



Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer, Austernseitling
Foto: K. Lauber, Liebefeld