

# **Pleurotos ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer, Austernseitling = Pleurte coquille d'huître = Gelone**

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de  
mycologie**

Band (Jahr): **60 (1982)**

Heft 3

PDF erstellt am: **10.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-937214>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## **Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer, Austernseitling**

Fam.: *Polyporaceae*

Grosser muschelförmiger, kurzstieliger Pilz, dachziegelig an Bäumen oder Laubholzstümpfen wachsend. Saprophyt an Holz, Weissfäule erzeugend.

- Hut:* Muschel-, zungen- bis spatelförmig, in der Farbe sehr veränderlich, von Schwarzgrau über Graubraun bis Stahlgrau und Blauschwärzlich, dickfleischig, exzentrisch gestielt, 5–15 cm breit.
- Lamellen:* gedrängt, weisslich, am Stiel deutlich herablaufend und netzig sich vergabelnd. Schneide fein gezähnt.
- Stiel:* kurz, weisslich, am Grunde zottig, verwachsend.
- Fleisch:* weiss, jung weich, mild, alt zäh und muffig riechend.
- Sporen:* hyalin,  $\pm$  zylindrisch,  $8-11 \times 3-4 \mu\text{m}$ .
- Standort:* im Spätherbst und Vorfrühling auf Laubholz, selten auf Fichten.
- Bemerkung:* Bekannter Marktpilz, der sich relativ leicht auf Holz züchten lässt. B. Kobler

## **Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer, Pleurote coquille d'huître**

Fam.: *Polyporacées*

Espèce de grande taille, carpophore courtement stipité et en forme de coquille, venant en individus superposés sur les arbres encore dressés ou sur les troncs d'arbres morts de feuillus. Saprophyte du bois, elle provoque une pourriture blanche.

- Chapeau:* en forme de coquille, de langue ou de spatule; très variable de couleur: de gris noir à gris brun à gris acier à noirâtre bleuté; chair épaisse; pied excentré; diamètre 5–15 cm.
- Lames:* serrées, blanchâtres, nettement décurrentes sur le pied, interveinées jusqu'à former un réseau; arête finement denticulée.
- Pied:* court, blanchâtre, hérissé de poils à la base, parfois difforme.
- Chair:* blanche, tendre dans le jeune âge, douce, devenant coriace et sentant le moisi dans la vieillesse.
- Spores:* hyalines, plus ou moins cylindriques,  $8-11 \times 3-4 \mu\text{m}$ .
- Habitat:* sur feuillus, rarement sur conifères, dans l'arrière-automne ou au premier printemps.
- Remarque:* espèce courante sur les marchés, ce Pleurote est assez facile à obtenir en culture sur des troncs. (Trad. F. Brunelli)

## **Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer, Gelone**

Fam.: *Polyporaceae*

Grande fungo a forma di conchiglia, a gambo corto, che cresce a cappelli imbricati su alberi o ceppi di latifoglie. Saprofito su legno, produce marciume bianco.

- Cappello:* a forma di conchiglia, di lingua o di spatola, molto variabile nei colori, da grigio nero a grigio bruno fino a grigio acciaio e a nero blu, carnoso, largo da 5 a 15 cm, con gambo eccentrico.
- Lamelle:* fitte, biancastre, nettamente decorrenti sul gambo dove si riuniscono a reticolo. Orlo finemente seghettato.
- Gambo:* corto, biancastro, villosa alla base, concresciuto.
- Carne:* bianca, nel giovane tenera, dolce, nel fungo vecchio tenace e con odore di muffa.
- Spore:* ialine  $\pm$  cilindriche,  $8-11 \times 3-4 \mu\text{m}$ .
- Habitat:* nel tardo autunno e nella prima primavera su legno di latifoglie, raramente su abete rosso.
- Osservazione:* noto perchè oggetto di vendita sul mercato, questo fungo si coltiva con relativa facilità. (Trad. G. Lucchini)



*Pleurotus ostreatus* (Jacq. ex Fr.) Kummer, Austernseitling  
Foto: K. Lauber, Liebefeld