

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie

**Herausgeber:** Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde

**Band:** 60 (1982)

**Heft:** 7

**Artikel:** Polyporus umbellatus Fr., Eichhase = Polypore en ombelle, poule des bois = Poliporo umbellato

**Autor:** Kobler, B.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-937237>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 31.07.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## **Polyporus umbellatus Fr., Eichhase**

= *Grifola umbellata* (Pers. ex Fr.) Donk = *Boletus ramosissimus* Schaeff.

<i>Fruchtkörper:</i>	Aus einem kurzen, dicken Strunk verzweigen sich zahlreiche gelbbraune bis graubraune Hütchen mit fein angedrückt faserschuppiger Oberfläche und welligem Rand.
<i>Poren:</i>	weisslich bis crème farbig, am Stiel oft wellig herablaufend, 1–3 per mm.
<i>Röhren:</i>	gleichfarbig, nur 2–3 mm lang.
<i>Fleisch:</i>	weiss, jung saftig und weich, später zähfaserig, trocken hart und brüchig. Geschmack mild, teilweise mit herbem Nachgeschmack.
<i>Sporen:</i>	zylindrisch, glatt und dünnwandig, hyalin, $8-10 \times 2,5-3,5 \mu\text{m}$ .
<i>Standort:</i>	Auf Erde, an oder bei Stümpfen von alten Laubbäumen, besonders bei Eichen.
<i>Bemerkung:</i>	Durch die rundlichen, zentral gestielten Hütchen leicht vom etwas ähnlichen Riesenporling ( <i>Meripilus giganteus</i> [Fr.] Karst.) und dem Klapperschwamm ( <i>Grifola frondosa</i> [Fr.] S.F. Gray) zu unterscheiden, welche beide spatelförmige, exzentrisch gestielte Hütchen besitzen.
	B. Kobler

## **Polyporus umbellatus Fr., Polypore en ombelle, poule des bois**

= *Grifola umbellata* (Pers. ex Fr.) Donk = *Boletus ramosissimus* Schaeff.

<i>Carpophore:</i>	une souche épaisse et courte se ramifie en multiples rameaux portant chacun un petit chapeau de moins de 3 cm, de teinte brun jaune à brun gris; sa surface est ornée de fines écailles fibrilleuses apprimées; sa marge est ondulée.
<i>Pores:</i>	blanchâtres à crème, souvent décurrents en alignements onduleux, 1–3 par mm.
<i>Tubes:</i>	concolores, ne dépassant pas 2–3 mm de longueur.
<i>Chair:</i>	blanche, tendre et imbue dans la jeunesse, puis fibreuse coriace, enfin dure et friable à l'état sec. Saveur douce, irrégulièrement âpre en arrière-goût.
<i>Spores:</i>	cylindriques, lisses, à membrane mince, hyalines, $8-10 \times 2,5-3,5 \mu\text{m}$ .
<i>Habitat:</i>	de juin à octobre, sur le sol ou dans le voisinage de vieilles souches de feuillus, en particulier de chênes.
<i>Remarque:</i>	cette espèce, dont les chapeaux présentent un stipe central, est facile à distinguer du Polypore géant ( <i>Meripilus giganteus</i> [Fr.] Karst.), qui lui ressemble un peu, comme aussi du Polypore arborescent ( <i>Grifola frondosa</i> [Fr.] S.F. Gray): tous deux sont caractérisés par des chapeaux spatulés et stipités latéralement.
	(Trad.: F. Brunelli)

## **Polyporus umbellatus Fr., Poliporo umbellato**

= *Grifola umbellata* (Pers. ex Fr.) Donk = *Boletus ramosissimus* Schaeff.

<i>Carposoro:</i>	da un tozzo ceppo centrale si diramano numerosi piccoli cappelli giallo bruni o grigio bruni, fibroso-squamosi, ondulati al bordo.
<i>Pori:</i>	da biancastri a color crema, spesso decorrenti sul gambo in modo ondulato, 1–3 per mm.
<i>Tuboli:</i>	dello stesso colore, lunghi solo 2–3 mm.
<i>Carne:</i>	bianca, da giovane succosa e tenera, in seguito tenace e fibrosa, nel fungo secco rigida e fragile. Gusto dolce, talvolta con retrogusto acerbo.
<i>Spore:</i>	cilindriche, lisce, a parete sottile, ialine, $8-10 \times 2,5-3,5 \mu\text{m}$ .
<i>Habitat:</i>	Terricolo oppure su ceppaie di vecchie latifoglie, specialmente querce, da luglio a ottobre.
<i>Osservazioni:</i>	I cappellini arrotondati sorretti dal gambo centrale permettono di distinguerlo facilmente dal <i>Meripilus giganteus</i> (Fr.) P. Karst. e dal griffone ( <i>Grifola frondosa</i> [Fr.] S.F. Gray) che hanno entrambi cappelli spatoliformi e gambo eccentrico.
	(Trad.: G. Lucchini)



Polyporus umbellatus Fr., Eichhase  
Foto: O. Hotz, Zürich