

Leucocoprinus brebissonii (God.) Locq.

Autor(en): **Hotz, O.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **61 (1983)**

Heft 4

PDF erstellt am: **01.03.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936742>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ich der Familie das Dasein etwas versüßen kann und um weniger schuldbewusst dastehen zu müssen. Dann wandere ich heimwärts. Ich war zwei Wochen zu früh, wie sich später herausstellte, aber zu Hause vier Stunden zu spät, wie sich sofort ergab. Man lernt eben nie aus.

H. Jäger, Neumühlestrasse 38, 9403 Goldach

Résumé

H. Jäger raconte avec humour comment il fut pris d'une véritable «mycofièvre» lorsque, après une longue période sèche, la pluie se mit à tomber un certain mercredi.

Au matin du samedi, H. laisse un billet pour son épouse («Je reviens bientôt, je fais juste un saut en forêt») et se glisse sans bruit hors de chez lui: il fait encore bien sombre et pour tromper son impatience, H. déguste ses «neuf heures» ...

Dans la grasse prairie tout imbibée d'humidité, il découvre de merveilleux ronds de Psalliotes. Son panier risque d'être trop petit, pense-t-il, si le sous-bois lui réserve une abondance comparable ... Las! Sur l'humus humide, seulement deux Géastres, et encore ils datent de l'an passé! Plus loin des plumes de geai laissées par un renard vorace. La forêt, habituellement si riche en espèces, est désespérément dégarnie: Mieux vaut sortir du bois.

Encore quelques Russules, et à nouveau des Psalliotes en guise de consolation. Pour compléter la cueillette, une ou deux poignées de prunes, et H. se dirige en hâte – vaguement culpabilisé de n'avoir pas rempli sa corbeille – vers la maison familiale.

Pour les champignons, il avait deux semaines d'avance, mais pour le repas de midi, il était en retard de quatre heures: on n'a jamais fini de s'instruire! (F. B.)

Leucocoprinus brebissonii (God.) Locq.

J'ai trouvé en septembre 1973 dans le quartier zurichois du Seefeld, à la rue des Dahlias, un champignon ressemblant à une Lépiote; il avait poussé dans un jardin d'agrément planté surtout de rhododendrons. Il me faisait penser à *Lepiota cristata*, il était très fragile et vite putrescent.

Une étude attentive me conduisit à *Leucocoprinus brebissonii* (God.) Locq. Par la suite, j'ai retrouvé cette même espèce durant plusieurs années dans la même station, de juin à octobre. Ces dernières années, le jardin a été plusieurs fois transformé, et je n'ai plus vu de carpophores. Il semble que cette espèce ne soit trouvée que rarement.

Description

Chapeau: diamètre 4–5 cm, convexe campanulé, blanc crème avec une étroite région discale brun-sépia sombre, se déchirant presque jusqu'à mi-rayon en écailles rangées comme les tuiles d'un toit; marge finement mais nettement striée sur environ un tiers du rayon.

Lames: libres, blanches, serrées, largement ventruées, arête finement serrulée.


Stipe: 4–7 cm×2–4 mm, dilaté à la base, fragile, creux, blanc, finement fibrilleux; anneau membraneux, s'évasant vers le haut, non mobile.

Chair: mince et fragile, blanche, odeur de résine.

Spores: 9–11×5,5–6,5 µm, avec pore germinatif évident, hyalines; sporée blanche.

O. Hotz, Seefeldstrasse 32, 8008 Zurich

(Trad.: F. Brunelli)



Leucocoprinus brebissonii (God.) Locq.

Im September 1973 fand ich an der Dahliastrasse im Zürcher Seefeld in einem Vorgarten, der hauptsächlich mit Rhododendren bepflanzt ist, einen schirmlingsartigen Pilz. Er glich *Lepiota cristata*, dem Stink-Schirmling, war sehr gebrechlich und rasch vergänglich.

Eine genaue Untersuchung ergab: *Leucocoprinus brebissonii* (God.) Locq.

In der Folge fand ich den Pilz während mehrerer Jahre am gleichen Ort zwei- bis dreimal pro Jahr zwischen Juni und Oktober.

Seit der Garten in den letzten drei Jahren mehrmals umgearbeitet wurde, erscheint der Pilz leider nicht mehr. Es scheint, dass er selten gefunden wird.

Beschreibung

- Hut:** Durchmesser 4–5 cm, glockig gewölbt, creme-weiss, in der Mitte mit dunkel-sepiabraunem Häubchen, dann verlaufend dachziegelig schuppig bis etwa Hutmitte. Rand bis etwa zu einem Drittel des Hutradius: fein, aber deutlich gerieft.
- Lamellen:** frei, weiss, gedrängt, stark bauchig, Schneide fein gesägt.
- Stiel:** 4–7 cm lang, 2–4 mm dick, am Grunde verbreitert, gebrechlich, hohl, weiss, fein-faserig. Ring häutig, aufsteigend, nicht beweglich.
- Fleisch:** dünn und gebrechlich, weiss, Geruch nach Harz.
- Sporen:** 9–11×5,5–6,5 µm mit deutlichem Keimporus, hyalin, Sporenpulver weiss.

O. Hotz, Seefeldstrasse 32, 8008 Zürich