

Russula olivacea (Schff. ex Secr.) Fr., Rotstieliger Ledertäubling = Russule couleur de cuir

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de
mycologie**

Band (Jahr): **61 (1983)**

Heft 11

PDF erstellt am: **27.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936771>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Russula olivacea (Schff. ex Secr.) Fr., Rotstieliger Ledertäubling

- Hut:** Jung fast kugelig, dann wellig ausgebreitet, Mitte niedergedrückt, 9–20 cm, von sehr variabler Farbe: mit grünlichen bis olivbraunen Tönen oder aber weinrötlich-lila bis braunrosa. Oft rötliche und grünliche Farben gemischt. Huthaut trocken, matt, fast bereift, in Streifen abziehbar.
- Lamellen:** Jung gedrängt, dann ziemlich entfernt, gegen den Stiel gegabelt bis anastomisierend, leicht bauchig. Typisch ist die sehr oft vom Rand her rötlich gefärbte Lamellenschneide.
- Stiel:** Hartfleischig, zylindrisch bis leicht bauchig, derb. Meist karminrötlich überhaucht, selten reinweiss. Tendenz zum Bräunen.
- Fleisch:** Fest bis hart, im Alter brüchig, weiss, dann gilbend bis bräunend, mild mit Haselnussgeschmack. Geruch schwach geraniumartig. Phenol färbt das Fleisch sofort intensiv purpurviolett.
- Sporenpulver:** Sattocker bis gelb. Sporen: 8–12 × 7–9 µm, isoliert stumpfstachelig.
- Standort:** Buchenwald, meist auf saurem Boden. Im Gebirge bei Rottanne auf oberflächenversauertem Boden.
- Bemerkungen:** Dieser derbe, festfleischige Pilz mit meist rötlichem Stiel kann vom ähnlichen Glänzenden Ledertäubling (*R. alutacea* [Pers. ex Fr.] Fr.) gut abgegrenzt werden, der immer einen weissen Stiel und einen glänzenden Hut besitzt. B. Kobler

Russula olivacea (Schff. ex Secr.) Fr., Russule couleur de cuir

- Chapeau:** subsphérique puis étalé-ondulé, déprimé au disque, diam. 9–20 cm, de couleurs très variables: soit avec des tons verdâtres à brun olive, soit lilas à rouge vineux à brun rosé, soit mêlé à la fois de teintes rougeâtres et verdâtres. Cuticule sèche, mate, presque pruinose, séparable par lambeaux.
- Lames:** serrées chez les jeunes sujets, assez écartées plus tard, fourchues à anastomosées près du stipe, un peu ventruës. Très souvent, l'arête des lames se teinte typiquement de rougeâtre à partir de la marge.
- Stipe:** ferme, cylindrique à quelque peu ventru, à chair solide, généralement lavé de carmin rougeâtre, rarement d'un blanc pur, avec tendance à brunir.
- Chair:** ferme, voire dure, fragile dans la vieillesse, blanche puis jaunissante à brunissante, à saveur douce de noisettes fraîches. Odeur faible rappelant le géranium. Coloration immédiate et intense en violet pourpre au Phénol.
- Sporée:** ocre saturé à jaune.
- Spores:** 8–12 × 7–9 µm, à échinules obtuses et isolées.
- Habitat:** hêtraies, généralement sur sols acides. En montagne sous épicéas sur terrains superficiellement acidifiés.
- Remarques:** Cette espèce solide et à chair ferme, au pied habituellement rougeâtre, peut aisément être séparée de l'espèce ressemblante *R. alutacea* (Pers. ex Fr.) Fr. qui présente toujours un stipe blanc et un chapeau à cuticule brillante. (Trad.: F. Brunelli)

Russula olivacea (Schff. ex Secr.) Fr.

- Cappello:** da giovane quasi sferico, in seguito appianato-ondulato, al centro depresso, 9–20 cm, a colori molto variabili: con toni da verdognoli a oliva bruni o da rossiccio vino-lilla a bruno rosa. Spesso vi sono mescolati colori rossastri o verdognoli. Cuticola asciutta, opaca, quasi pruinosa, distaccabile a striscie.
- Lamelle:** da giovani fitte, in seguito abbastanza spaziate, verso il gambo da forcate a anastomosate, lievemente ventricose. Molto spesso l'orlo delle lamelle è tipicamente rossastro a cominciare dall'orlo del cappello.
- Gambo:** a carne dura, da cilindrico a leggermente ventricoso, sodo. In generale soffuso di rosa carminio, raramente bianco puro. Tendenza a imbrunire.
- Carne:** da soda a dura, fragile in vecchiaia, bianca, in seguito da giallastra a bruna, mite con sapore di nocciole. Odore leggero di geranio. Con fenolo la carne si colora subito e intensamente di violettoporpora.
- Polvere sporica:** da ocre scuro a giallo. Spore 8–12 × 7–9 µm, con aculei ottusi.
- Habitat:** in faggete, in generale su terreno acido. In montagna sotto abete rosso su terreno la cui superficie è acidificata.
- Osservazioni:** Questo fungo a carne soda e compatta, con gambo in prevalenza rossastro, può essere ben separato dalla simile *R. alutacea* (Pers. ex Fr.) Fr., che ha sempre il gambo bianco e il cappello a colori più brillanti. (Trad.: E. Zenone)



Russula olivacea (Schff. ex Secr.) Fr., Rotstieliger Ledertäubling
Foto: Dr. A. Michel, Bern