

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie  
**Herausgeber:** Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde  
**Band:** 61 (1983)  
**Heft:** 12

**Artikel:** Clitocybe vermicularis (Fr.) Quél., Lärchentrichterling = Clitocybe à rhizomorphes  
**Autor:** Kobler, B.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-936780>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 24.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## **Clitocybe vermicularis (Fr.) Quél., Lärchentrichterling**

- Hut** Fleischrötlich bis braunrötlich, trocken ledergelb, leicht hygrophan, etwas glänzend. Rand eingerollt, wellig. Trichterförmig, feinst filzig, 3–6 cm, dünnfleischig.
- Lamellen:** Herablaufend, am Stiel leichte Anastomosen, ablösbar, cremeweiss, dann rötlich-braun, dünn und schmal.
- Stiel:** Oft gekrümmt, dem Hut gleichfarben, bald hohl. Spitze mehlig-flockig. Stielbasis mit mehreren Zentimeter langen Mycelrhizoiden, die einen «Erdballen» zusammenhalten.
- Fleisch:** Crèmerötlich, etwas elastisch-zäh. Mild mit leicht säuerlichem Geruch.
- Sporenpulver:** Weiss. Sporen: hyalin, 4–5×3 µm.
- Standort:** Nadelwald, besonders bei Lärchen. Erscheint im Frühjahr! Einzeln oder fast büschelig.
- Bemerkung:** Nicht zu verwechseln mit *Cl. radicellata* Gill., der ebenfalls im Frühjahr fruktifiziert und Mycelrhizoiden besitzt, aber einen graubraunen bis lederfarbenen Hut hat, der einen Glanz aufweist. B. Kobler

## **Clitocybe vermicularis (Fr.) Quél., Clitocybe à rhizomorphes**

- Chapeau:** 3–6 cm, rougeâtre carné à brun rougeâtre, jaune cuir par le sec, légèrement hygrophane; cuticule un peu brillante; marge enroulée, ondulée; cyathiforme et finement feutré; chair mince.
- Lames:** décurrentes, séparables, minces et étroites, blanc crème puis brun rougeâtre, avec quelques anastomoses à leur insertion au stipe.
- Stipe:** concolore au chapeau, souvent arqué, vite évidé; farineux floconneux au sommet; base prolongée par des rhizoïdes mycéliens atteignant plusieurs cm de longueur et agglomérant une petite balle de terre.
- Chair:** rougeâtre crème, élastique assez tenace; saveur douce, odeur légèrement acidulée.
- Sporée:** blanche.
- Spores:** hyalines, 4–5×3 µm.
- Habitat:** sous essences à aiguilles, en particulier sous mélèzes; espèce printanière; individus isolés mais aussi en petites touffes.
- Remarques:** ne pas confondre cette espèce avec *C. radicellata* Gill. dont les fructifications apparaissent aussi au printemps, munies aussi de rhizomorphes, mais dont le chapeau brillant est de couleur gris brun à beige, ne tirant pas sur le rougeâtre. (Trad.: F. Brunelli)

## **Clitocybe vermicularis (Fr.) Quél.**

- Cappello:** da rossastro incarnato a rossastro bruno, asciutto giallo cuoio, un poco igrofano e brillante. Orlo involuto, ondulato. Imbutiforme, finemente pubescente, 3–6 cm, scarsamente carnoso.
- Lamelle:** decorrenti, al gambo leggermente anastomosate, separabili, bianco crema e in seguito bruno rossiccio, sottili e strette.
- Gambo:** sovente curvato, concolore al cappello, diventa rapidamente cavo. All'apice farinoso-fioccoso. Alla base con ife miceliari radiceformi, lunghe qualche centimetro, che trattengono un grumo di terra.
- Carne:** crema rossastra, un poco elastica-tenace. Mite e con debole odore acidulo.
- Polvere sporica:** bianca. Spore: ialine, 4–5×3 µm.
- Habitat:** bosco di conifere, specialmente lariceti. Compare in primavera! Isolata o anche quasi cespitosa.
- Osservazioni:** Da non confondere con la *Cl. radicellata* Gill., che fruttifica pure a primavera e che possiede le ife miceliari radiceformi, ma il cappello ha colori da grigio bruni a alutacei, ed è lucente. (Trad.: E. Zenone)
- Foto: Eugen Buob, Samstagern.

