Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie

Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde

Band: 63 (1985)

Heft: 1

Artikel: Panellus serotinus (Pers. ex Fr.) Kühn., Gelbstieliger Zwergknäueling : Syn. Pleurotus seotinus Schrader = Hohenbuehelia serotina (Schrad. ex Fr.) Sing. 1945 = Panellus serotinus (Pers. ex Fr.) Kühner [= Pleurotus serotinus Schrader = Hohenbuehelia sero...

Autor: Kobler, B.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-936854

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Panellus serotinus (Pers. ex Fr.) Kühn., Gelbstieliger Zwergknäueling
Syn. Pleurotus serotinus Schrader = Hohenbuehelia serotina (Schrad. ex Fr.) Sing. 1945

Hut: Olivgrün bis gelbgrün, alt olivbräunlich auf ockerlichem Untergrund, gegen den Stiel samtig-filzig, muschelförmig. Jung etwas klebrig.
Lamellen: Gelblich bis blassocker, alt bräunlich, gedrängt, angewachsen bis leicht herablaufend.
Stiel: Lateral, kurz, dick, goldgelb bis orangeocker, durch bräunliche Schüppchen fein punktiert.
Fleisch: Weisslich, mit gelatinöser Schicht im Hut, geruch- und geschmacklos.
Sporen: 4,5—5,5×1,5—2 µm, hyalin, zylindrisch und leicht gekrümmt.
Standort: An Laubholzstrünken und an am Boden liegenden dicken Ästen. Seltener auch an Nadelholz, einzeln oder reihig wachsend. September bis in den Winter hinein.
Bemerkung: Der schöngelbe Stiel und der an Algenbewuchs erinnernde olivgrüne Hut machen diese Art unverwechselbar. B. Kobler

Panellus serotinus (Pers. ex Fr.) Kühner [=Pleurotus serotinus Schrader = Hohenbuehelia serotina (Schrader ex Fr.) Sing. 1945], **Pleurote tardif**

Chapeau: vert olive à vert jaune, brun olivâtre sur fond ochracé dans la vieillesse, soyeux-feutré au voisinage du pied, en forme de conque. Un peu visqueux dans la jeunesse.
Lames: jaunâtres à ochracé pâle, brunâtres avec l'âge, serrées, adnées à un peu décurrentes.
Pied: latéral, court, épais, jaune doré à orange ochracé, finement ponctué de méchules brunâtres.
Chair: blanchâtre, insipide, inodore, comportant dans le chapeau une couche gélatineuse.
Spores: 4,5—5,5×1,5—2 µm, hyalines, cylindriques et un peu arquées.
Habitat: sur souches de feuillus et sur grosses branches tombées. Plus rarement sur bois de conifères. Solitaire ou par rangées. De septembre jusqu'en plein hiver.
Remarque: cette espèce est facile à reconnaître à son pied d'un beau jaune et à son chapeau dont la couleur vert olive peut faire penser qu'il est envahi par des algues. C'est de plus une espèce hivernale. (Trad.: F. Brunelli)

Panellus serotinus (Pers. ex Fr.) Kühn. Syn. Pleurotus serotinus Schrader = Hohenbuehelia serotina (Schrad. ex Fr.) Sing. 1945

Cappello: da oliva verde a giallo verde, vecchio oliva brunastro su sfondo ocraceo, verso il gambo vellutato-feltrato, conchiforme. Giovane un poco glutinoso.
Lamelle: da giallognole a ocra pallido, vecchie brunastre, fitte, da adnate a leggermente decorrenti.
Gambo: laterale, corto, grosso, da giallo oro a ocra arancio, finemente punteggiato da squamette brunastre.
Carne: biancastra, nel cappello con uno strato gelatinoso, senza odore e senza sapore.
Spore: 4,5—5,5×1,5—2 µm, jaline, cilindriche e leggermente ricurve.
Habitat: su ceppaie di latifoglie e su grossi rami giacenti al suolo. Raramente anche su legno di conifera, cresce sia isolato sia in file. Da settembre fino a inverno inoltrato.
Osservazione: inconfondibile a causa del suo bel gambo giallo e dal cappello oliva verde che ricorda una vegetazione di alghe. (Trad.: E. Zenone)

Pleurotus serotinus Schrader = Panellus serotinus (Pers. ex Fr.) Kühn.

(Aquarelle de Charles Poluzzi)