

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 64 (1986)
Heft: 4

Artikel: Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel (= Pholiota fusca Quél.) : Weissausgezackter Träuschling, Fam. Strophariaceae = Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel (= Pholiota fusca Quél.) : Pholiote frangée de blanc, Fam.: Strophariaceae

Autor: Kobler, B.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-936932>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 08.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel (= Pholiota fusca Quél.) **Weissausgezackter Träuschling, Fam. Strophariaceae**

<i>Hut:</i>	Rotbraun, kastanienbraun bis schwarzbraun, oft vom Scheitel her dunkler geflammt, ø 5–10 (15) cm, jung halbkugelig, dann glockig ausflachend mit stumpfem Buckel, von dreieckigen, flockigen, braungelben und flüchtigen Schuppen bekleidet. Feucht schleimig, trocken glänzend. Rand lange eingerollt und stark ausgefranst behangen.
<i>Lamellen:</i>	Grauviolett, bauchig, fast gedrängt, Schneide weisslich gezähnelt, jung mit milchweissen, ölichen Tröpfchen versehen, angeheftet und mit Zahn herablaufend.
<i>Stiel:</i>	Flockig, sparrig-schuppig, mit fast ringartiger Abgrenzung an der Spitze. Alt mehr oder weniger auskahlend. Basis leicht verdickt.
<i>Fleisch:</i>	Weiss, weich, Geschmack sehr bitter.
<i>Sporenstaub:</i>	Umbrabraun. Sporen: mandelförmig, mit beidseitig zugespitzten Enden. 11–13×5,8 µm.
<i>Standort:</i>	August bis November besonders an Schwarzpappeln (<i>Populus nigra</i>), seltener an Fichten (<i>Picea excelsa</i>) oder Tannen (<i>Abies alba</i>). Wahrscheinlich ist diese Art ein Schwächerparasit.
<i>Bemerkung:</i>	Dieser seltene Pilz ist unbedingt zu schonen. Da sehr bitter, ist diese Art ungenießbar.

B. Kobler

Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel (= Pholiota fusca Quél.) **Pholiote frangée de blanc, Fam.: Strophariaceae**

<i>Chapeau:</i>	Brun rouge, brun châtain à brun noir souvent flammé de plus sombre à partir du disque, diamètre 5–10 (15) cm, hémisphérique dans la jeunesse, devenant plus étalé campanuliforme avec un mamelon obtus, décoré d'écailles triangulaires, floconneuses, jaune brun et fugaces. Visqueux par temps humide, brillant par le sec. Marge longtemps enroulée, fortement appendiculée frangée.
<i>Lames:</i>	Gris violet, ventrues, assez serrées, arête blanchâtre denticulée laissant suinter dans le jeune âge des gouttelettes huileuses d'un blanc laiteux, adnées uncinées.
<i>Pied:</i>	Floconneux, hérisse d'écailles redressées dont la limite en haut est presque annuliforme. Avec l'âge, ces écailles disparaissent plus ou moins. Base légèrement épaissie.
<i>Chair:</i>	Blanche, tendre, très amère.
<i>Sporée:</i>	Bistre foncé.
<i>Spores:</i>	Amygdaliformes, apointies aux deux extrémités. 11–13×5,8 µm.
<i>Habitat:</i>	D'août à novembre, surtout sur <i>Populus nigra</i> (Peuplier noir), plus rarement sur <i>Picea excelsa</i> (Épicéa) ou <i>Abies alba</i> (Sapin blanc). Cette espèce est probablement un parasite de faiblesse.
<i>Remarque:</i>	Cette espèce, rare, est à protéger absolument. Elle est inconsommable en raison de son amer-tume. (trad.: F. Brunelli)

Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel (= Pholiota fusca Quél.) Fam. Strophariaceae

<i>Cappello:</i>	Da bruno castano a bruno nero, rosso bruno, sovente marezato di scuro a cominciare dal disco, ø 5–10 (15) cm, giovane semisferico poi a campana appianata con umbone ottuso e ricoperto da verruche triangolari, fiocose, fugaci e di colore giallo bruno. Mucoso se umido e brillante se asciutto. Orlo a lungo involuto e molto fimbriato.
<i>Lamelle:</i>	Grigio viola, ventricose, quasi fitte con taglio denticolato di bianco, giovani provviste die goccioline oleose lattee, attingenti e decorrenti con dentino.
<i>Gambo:</i>	Fiocoso, squarroso, verso l'alto con una zona pseudoanulare. In vecchiaia calcifica un poco. Base leggermente ingrossata.
<i>Carne:</i>	Bianca, molle e molto amara.
<i>Sporata:</i>	Bruno scuro. Spore a mandorla con ambedue le estremità acute. 11–13×5,8 µm.
<i>Habitat:</i>	Da agosto a novembre su pioppo nero (<i>Populus nigra</i>), raramente su peccio (<i>Picea excelsa</i>) o su abete bianco (<i>Abies alba</i>). Probabilmente questa specie è un debole parassita.
<i>Osservazioni:</i>	Questa rara specie è assolutamente da proteggere. Essendo molto amara, non è nemmeno commestibile. (Trad.: E. Zenone)



Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel.

Aquarelle de Charles Poluzzi