

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie

Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde

Band: 64 (1986)

Heft: 11

Artikel: Entoloma sericatum (Britz) Sacc. : Seidiger Moor-Rötling

Autor: Monthoux, Olivier

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-936968>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Entoloma sericatum (Britz.) Sacc.

- Chapeau:* atteignant 6 cm, campanulé-convexe puis plan convexe, parfois submamelonné, peu charnu, fragile, glabre, non visqueux, hygrophane, strié-pellucide jusqu'au $\frac{1}{3}$ ou à la $\frac{1}{2}$ du rayon, mais pas très distinctement, de couleur variable, soit bistre, surtout chez les jeunes, soit gris-beige, pâlissant par le sec, beige pâle, un peu satiné, à marge très mince et un peu débordante, d'abord enroulée.
- Lamelles:* assez serrées (30 à 45, 7 ou plus rarement 3 lamellules), peu épaisses, atteignant 6 mm de large, à arête un peu sinuée, adnées ou légèrement décourantes par une dent, à faces non ou à peine ridulées, d'abord blanches ou blanchâtres, puis rose-incarnat brunâtre.
- Pied:* atteignant 9 cm de long, ordinairement 5—8 mm de large, exceptionnellement 10, un peu épaisse vers le bas, creux, fragile, fibreux, fissile, glabre, un peu satiné mais non recouvert d'un fibrillum propre, légèrement pruineux-squamuleux en haut, aranéaux à la base, de couleur variable, bistre plus pâle que le chapeau jusqu'à blanc, parfois en partie coloré et en partie blanc.
- Chair:* blanche, mais souvent brune sous la cuticule du chapeau et parfois gris-bistre dans le pied, à odeur et saveur nettes de farine ce qui le distingue de l'*Entoloma nidorosum* qui se trouve aussi dans les tourbières.
- Spores:* roses, 7,5—10/6—8 µm, en moyenne 8,6/7,2 µm. *Basides* tétrasporiques.
- Ecologie:* dans les haut-marais, mais pas uniquement.
- Matériel:* dessins au trait: h, b, s, ca, pi: Chenalotte, 15 sept. 1935; i: Voirons, 23 sept. 1934; planche en couleurs: Chenalotte, 27 août 1934.

(Texte et dessins préparés sur la base de la publication (Bull. Soc. Mycol. France 53: 275—277. 1937) et des notes manuscrites de Jules Favre par Olivier Monthoux.)

Entoloma sericatum (Britz.) Sacc. Seidiger Moor-Rötling

- Hut:* 6 cm erreichend, glockig-gewölbt, dann flachgewölbt, manchmal schwach gebückelt, wenig fleischig, gebrechlich, kahl, nicht schmierig, hygrophane, durchscheinend gerieft bis $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{2}$ des Hutradius, aber nicht sehr markant, von veränderlicher Farbe, entweder dunkelbraun, vor allem bei jungen Exemplaren, oder graubeige ausbleichend wenn trocken, fahl beige, ein wenig seidig, mit sehr dünnem Rand, leicht überlappend, zuerst eingerollt.
- Lamellen:* Ziemlich gedrängt (30—45, 7 oder seltener 3 Lamelletten), wenig dicklich, 6 mm in der Breite erreichend mit etwas buchtiger Schneide, angewachsen oder leicht mit Zahn herablaufend. Lamellenfläche nicht oder kaum runzelig, zuerst weiss oder weisslich, dann rosa-fleischfarben bräunlich.
- Stiel:* 9 cm Länge erreichend, gewöhnlich 5—8 mm breit, ausnahmsweise 10 mm, gegen die Basis ein wenig verdickt, hohl, gebrechlich, faserig, zerspaltend, kahl, ein wenig seidig, aber nicht mit einer eigentlichen Faserung bekleidet, an der Stielspitze leicht feinschuppig bereift, spinnwebig an der Basis, von veränderlicher Farbe, dunkelbraun bis weiss, heller als der Hut, manchmal stellenweise gefärbt, stellenweise weiss.
- Fleisch:* Weiss, doch oft braun unter der Huthaut und manchmal grau-dunkelbraun im Stiel, mit reinem Geruch und Geschmack nach Mehl, was diese Art von *Entoloma nidorosum* unterscheidet, welche auch in Mooren vorkommt.
- Sporen:* rosa, 7,5—10×6—8 µm, im Mittel 8,6—7,2 µm.
- Basidien:* viersporig.
- Ökologie:* in Hochmooren, aber nicht nur in diesem Biotop.



Entoloma sericatum (Britz.) Sacc.

Conservatoire botanique de Genève:
Collection Jules Favre

(Aquarelle de Jeanne Favre)

Material: Strichzeichnungen: h,b,s, ca, pi: Chenalotte, 15. Sept. 1935, i: Voirons, 23. Sept. 1934.
Farbtafel: Chenalotte, 27. August 1934.

(Text und Zeichnungen angefertigt auf Basis der Veröffentlichung (Bull. Soc. Mycol. France 53: 275—277. 1937) und nach den Manuscript-Notizen von Jules Favre durch Olivier Monthoux.) (Übers.: B. Kobler)

Entoloma sericatum (Britz.) Sacc.

- Cappello:* fino a 6 cm, campanulato convesso poi piano convesso, talvolta subumbonato, poco carnoso, fragile, glabro, non viscoso, igrofano, striato-translucido fino a $\frac{1}{3}$ o a $\frac{1}{2}$ del raggio, ma non in modo molto distinto, colore variabile, sia bruno scuro, specialmente nei giovani esemplari, sia grigio-bruno chiaro, che sbiadisce a tempo secco, bruno chiaro pallido, un poco satinato, margine molto sottile e un poco sporgente, all'inizio involuto.
- Lamelle:* abbastanza fitte (30 a 45, con 7 o più raramente 3 lamellule), poco spesse, larghe fino a 6 mm, filo un poco sinuato, adnate o leggermente decorrenti con dentino, la faccia delle lamelle non o appena rugulosa, dapprima bianche o biancastre, poi rosa incarnate brunastre.
- Gambo:* lungo fino a 9 cm, in generale diametro 5—8 eccezionalmente 10 mm, un poco ispessito verso la base, cavo, fragile, fibroso, fissile, glabro, un poco satinato ma non ricoperto da vere fibrille, leggermente pruinoso squamuoso in alto, araneoso alla base, colore variabile, da bruno chiaro più pallido del cappello fino a bianco, talvolta in parte colorato e in parte bianco.
- Carne:* bianca, ma sovente bruna sotto la cuticola del cappello, talvolta grigio-bruno chiaro nel gambo, odore e sapore tipici di farina, e ciò lo distingue dall'Entoloma nidorosum, che cresce pure nelle torbiere.
- Spore:* rosa, 7,5—10/6—8 μm , in media 8,6/7,2 μm . Basidi tetrasporici.
- Ecologia:* nelle torbiere, ma non in modo esclusivo.
- Raccolte:* disegno al tratto: h, b, s, ca, pi: henalotte, 15 sett. 1935; i: Voirons, 23 sett. 1934; tavola a colori: Chenalotte, 27.8.1934.

(Testi e disegni preparati da Olivier Monthoux in base alla pubblicazione (Bull. Soc. Mycol. France 53: 275—277, 1937) e le note manoscritte di Jules Favre) (Trad.: E. Zenone)




Der Botanische Garten der Universität Zürich sucht einen

Pilzkontrolleur

(wenn möglich mit amtlichem Ausweis), welcher zusätzlich Arbeit im Institut für systematische Botanik und im Botanischen Garten zu übernehmen hätte.

Die Besoldung richtet sich nach kantonalem Reglement.
Schriftliche Bewerbung mit Zeugnisabschriften senden Sie bitte an die Direktion des Botanischen Gartens der Universität Zürich, Zollikerstrasse 107, 8008 Zürich.



Entoloma sericatum: Carpophores (grandeur nature): i: Voirons, 23 sept. 1934; h: Chenalotte, 15 sept. 1935; b: baside; s: spores; ca: caulocystides; pi: éléments du revêtement du chapeau; (b, s, ca, pi: Chenalotte, $\times 1000$). (Dessins de Jules Favre reproduits par Suzanne van Hove.)

Entoloma sericatum: Fruchtkörper in natürlicher Grösse: i: Voirons, 23. Sept. 1934; h: Chenalotte, 15. Sept. 1935; b: Basidie; s: Sporen; ca: Caulocystiden; pi: Hyphen der Hutbekleidung. (b, s, ca, pi: Chenalotte, $\times 1000$). (Zeichnungen nach Jules Favres Vorlagen und angefertigt von Suzanne van Hove.)

Entoloma sericatum: carpoforo (grandezza naturale): i: Voirons, 23.9.1934; h: Chenalotte, 15.9.1935; b: basidi; s: spore; ca: caulocistidi; pi: elementi del rivestimento del cappello; (b, s, ca, pi: Chenalotte, $\times 1000$). (Disegni di Jules Favre riprodotti da Suzanne van Hove.)