

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie  
**Herausgeber:** Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde  
**Band:** 65 (1987)  
**Heft:** 12

**Artikel:** Stropharia hornemannii (Weinm. ex Fr.) Lund. & Nannf. : Üppiger Träuschling : ungeniessbar = Strophaire luxuriante, non comestible = non commestibile

**Autor:** Kobler, B.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-936556>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 08.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## ***Stropharia hornemannii* (Weinm. ex Fr.) Lund. & Nannf. Üppiger Träuschling — Ungenießbar**

- Hut:** Elfenbeinweiss, gelbbraun, graubraun bis kastanienbraun, schmierig-klebrig, trocken glänzend, glatt, 5–15 cm breit, zuerst glockig, dann flach gewölbt, fleischig, Rand lange eingerollt, oft vom Velum behangen.
- Lamellen:** Weisslich, dann rauchgrau-violett, bei Sporenreife dunkelbraun, mässig gedrängt, ziemlich breit, angewachsen oder mit Zahn herablaufend.
- Stiel:** Weisslich bis blass gelblich mit weisslichem, weit abstehendem, gerieftem und flüchtigem Ring. Unter diesem grob abstehend und teilweise zurückgebogen schuppig, alt fast ganz verkahlend. Mehr oder weniger zylindrisch mit leicht verschmälter Spitze.
- Fleisch:** Crèmeweisslich, weich, mit unangenehmem Geruch. Geschmack bitterlich.
- Sporen:** 10,5–13×5,5–7 µm, mit deutlichem Keimporus. Sporenstaub dunkelbraun.
- Standort:** August bis Oktober im Nadelwald auf modrigen Fichtenstümpfen, oder in Verbindung mit Holzresten und Nadelstreu. Saprobiont. Kommt bis zur subalpinen Waldgrenze vor.
- Bemerkungen:** Diese Art steht *Stropharia rugoso-annulata* Farlow ex Murr., dem Riesenträuschling nahe, welcher aber auch jung einen kahlen Stiel besitzt und ausser in Kultur eher in wärmeren Lagen vorkommt.
- B. Kobler

## ***Stropharia hornemannii* (Weinm. ex Fr.) Lund. & Nannf. *Strophaire luxuriante*, non comestible**

- Chapeau:** blanc d'ivoire, brun jaune, brun gris à brun châtain, visqueux, brillant par le sec, lisse, diam. 5 à 15 cm, d'abord campanulé puis plan convexe, charnu; marge longtemps enroulée, souvent appendiculée de restes du voile.
- Lames:** blanchâtres, puis gris fumé à violet, brun foncé à la maturité des spores; assez serrées, plutôt larges, adnées à décurrentes par une dent.
- Pied:** blanchâtre à jaunâtre pâle; anneau blanchâtre, strié, fugace et largement écarté du pied; au-dessous, hérissé de peluches grossières écartées et parfois révolutes; devenant presque glabre avec l'âge; plus ou moins cylindrique, légèrement étréci au sommet.
- Chair:** crème blanchâtre, molle, à odeur désagréable, à saveur amarescente.
- Sporée:** brun foncé.
- Spores:** 10,5–13×5,5–7 µm, à pore germinatif évident.
- Habitat:** août–novembre, sur résineux, sur souches pourrissantes de pins, ou bien sur débris ligneux ou litière d'aiguilles. Saprophyte. Jusqu'à l'étage subalpin, à la limite des forêts.
- Remarques:** Cette espèce est proche de *Stropharia rugoso-annulata* Farlow ex Murr., *Strophaire rouge vineux*; le pied de celle-ci est néanmoins nu dès la jeunesse et, culture mise à part, vient plutôt en des stations plus chaudes.

(trad.: F. Brunelli)

## ***Stropharia hornemannii* (Weinm. ex Fr.) Lund. & Nannf. — Non commestibile**

- Cappello:** bianco avorio, bruno giallo, da bruno grigio a bruno castano, viscido-appiccicoso, asciutto brillante, liscio, largo da 5 a 15 cm, dapprima campanulato, poi piano-convesso, carnoso, orlo a lungo involuto, spesso provvisto da residui di velo.
- Lamelle:** biancastre, poi grigio fumo-violetto, bruno scuro a spore mature, moderatamente fitte, abbastanza larghe, adnate oppure decorrenti con dentino.
- Gambo:** da biancastro a giallognolo pallido con anello biancastro, molto distanziato, striato e fugace. Al disotto con squame grossolanamente sporgenti e in parte piegate all'indietro, vecchio glabrescente. Più o meno cilindrico o con apice leggermente attenuato.
- Carne:** biancastra crema, tenera, odore sgradevole, sapore amarognolo.
- Spore:** 10,5–13×5,5–7 µm, con poro germinativo evidente. Sporata bruno scuro.
- Habitat:** Da agosto a ottobre nei boschi di conifera su ceppaie marcescenti di abete rosso, oppure in collegamento con resti di legno e strame di conifera. Saprobionte. Cresce fino al limite subalpino del bosco.
- Osservazioni:** Questa specie è vicina a *Stropharia rugoso-annulata* Farlow ex Murr., la quale però anche giovane ha il gambo glabro e, salvo in cultura, cresce in luoghi piuttosto caldi.

(trad.: E. Zenone)



*Stropharia hornemannii* (Weinm. ex Fr.) Lund. & Nannf.

(Aquarelle de Jean Mouchet)