

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie  
**Herausgeber:** Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde  
**Band:** 67 (1989)  
**Heft:** 1

**Artikel:** Entoloma mougeotii (Quél.) Hesler (= E. ardosiacus ss. Quél.), Bres. non Fr. : Fam. Entolomataceae, Untergattung Leptonia = Entoloma mougeotii Fr. Hesler : Fam.: Entolomataceae ss.-g.: Leptonia  
**Autor:** Kobler, B.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-936432>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 08.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## **Entoloma mougeotii** (Quél.) Hesler (= E. ardosiacus ss. Quél.), Bres. non Fr. Fam. Entolomataceae, Untergattung Leptonia

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Hut:</b>         | 1,5–4(5) cm breit, niedergedrückt, meist deutlich genabelt bis fast trichterig, blass blauviolett bis rosabräunlich, mit feinsten angedrückten und radial angeordneten Schüppchen bedeckt, die den helleren Untergrund kaum durchscheinen lassen, matt, Rand glatt. Im Alter verblasst die blaue Farbtönung. |
| <b>Lamellen:</b>    | Ausgebuchtet angewachsen, relativ breit, weiss, selten mit Lilaton, dann zartrosa, mässig gedrängt mit zahlreichen Lamelletten.  |
| <b>Stiel:</b>       | Zylindrisch mit leicht verdickter Basis, 5–7 cm lang, 4–5 mm breit, faserig gestreift, dem Hut gleichfarben, enghohl, Basis weiss.   |
| <b>Fleisch:</b>     | Schmutzig bräunlichweiss, geruch- und geschmacklos, im Hut sehr dünnfleischig.   |
| <b>Sporen:</b>      | 9,5–13×6,5–8,5 µm, eiförmig-elliptisch, 5–8eckig. Sporenpulver rosa.   |
| <b>Standort:</b>    | Feuchte Magerwiesen und Weiden, moosige Stellen, mit Vorliebe in montanen bis voralpinen Gebieten, im Sommer, nicht selten.  |
| <b>Bemerkungen:</b> | Diese Art ist makroskopisch an ihren schönen violettblauen Farbtönen auf Hut und Stiel, der deutlichen Nabelung und der für diese Gruppe eher grossen Fruchtkörper gut zu erkennen. Die Farbtäfel zeigt den Pilz leicht vergrössert.   |
|                     | B. Kobler  |
| <b>Foto:</b>        | Michael Stappung, Döttingen  |

## **Entoloma mougeotii** (Fr.) Hesler Fam.: Entolomataceae ss.-g.: Leptonia

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Chapeau:</b>   | 1,5–4 (5) cm de diamètre, en général nettement déprimé à quasi cyathiforme; bleu violet pâle à rose brunâtre, recouvert de très petites mèches arrangées radialement et laissant à peine entrevoir le fond plus pâle; mat, à marge lisse. Les tonalités bleues pâlissent avec l'âge.   |
| <b>Lames:</b>     | Adnées échancrées, assez larges, blanches, rarement lilacines, puis rose tendre; moyennement serrées; nombreuses lamelles et lamellules.   |
| <b>Pied:</b>      | Cylindrique, légèrement épaisse vers la base; 5–7 cm × 4–5 mm; d'apparence striée par des fibrilles; concolore au chapeau, fistuleux, blanc à la base.   |
| <b>Chair:</b>     | Blanc brunâtre sale; très mince dans le chapeau; insipide et inodore.  |
| <b>Sporée:</b>    | Rose.  |
| <b>Spores:</b>    | 9,5–13×6,5–8,5 µm, ovoïdes elliptiques, avec 5–8 angles.   |
| <b>Habitat:</b>   | Lieux humides et moussus, dans les prairies maigres et les pâturages, de préférence aux étages alpins à subalpins; pas rare espèce estivale.   |
| <b>Remarques:</b> | Espèce relativement reconnaissable macroscopiquement à ses belles tonalités bleu violet sur le chapeau et le pied, à son ombilic évident et à sa taille plutôt grande pour le groupe dont elle fait partie. La photographie montre des sujets légèrement agrandis. Selon M. E. Noordeloos («Entoloma in Europe» 1987), l'épithète <i>ardosiacum</i> , parfois synonymisée avec <i>mougeotii</i> , est à exclure, en raison d'interprétations diverses par les auteurs (Bulliard 1792, Quélet 1882, Bresadola 1929, Pearson & Dennis 1948). Hesler (Nov. Hedw.) a redéfini et nommé l'espèce en 1967. |
| <b>Photo:</b>     | Michael Stappung, Döttingen<br>(trad., compl.: F. Brunelli)  |

## **Entoloma mougeotii** (Quél.) Hesler (=E. ardosiacus ss. Quél.) Bres. non Fr. Fam. Entolomataceae sottogenere Leptonia

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Cappello:</b>     | Largo 1,5–4 (5) cm, depresso, per lo più chiaramente ombelicato fino a quasi imbutiforme, da azzurro viola pallido a brunastro rosa, ricoperto da fini squamette appressedate e ordinate radialmente, che vagamente lasciano intravvedere il sottofondo più chiaro, opaco, margine liscio. In vecchiaia sbiadiscono le tonalità azzurre. |
| <b>Lamelle:</b>      | Adnate-smarginate, relativamente larghe, bianche, raramente con toni lilla, poi rosa delicato, moderatamente fitte e con numerose lamellule.   |
| <b>Gambo:</b>        | Cilindrico, base leggermente ingrossata, lungo 5–7 cm, largo 4–5 mm, striato fibrilloso, concolore al cappello, fistoloso, base bianca.  |
| <b>Carne:</b>        | Bianca-brunastra sporca, priva di odore e sapore significativi, molto sottile nel cappello.  |
| <b>Spore:</b>        | 9,5–13×6,5–8,5 µm, ovali-ellittiche, a 5–8 angoli. Sporata rosa.   |
| <b>Habitat:</b>      | Prati umidi, pascoli, posti muschiosi, con preferenza per le zone montane e subalpine, in estate, non raro.  |
| <b>Osservazioni:</b> | Questa specie è ben caratterizzata dalle belle tonalità viola azzurro del cappello e del gambo, e per questo gruppo, dai carpofori relativamente grandi e chiaramente ombeliciati. La tavola a colori mostra funghi un poco ingranditi.  |

Foto: Michael Stappung, Döttingen  
(trad. E. Zenone)

