

Gerandete Kohlenbeere, *Biscogniauxia marginata* (Fr.) Pouzar, ein wenig bekannter Ascomycet aus der Familie der Xylariaceae (Sphaeriales) = *Biscogniauxia marginata* (Fr.) Pouzar, un ascomycète peu connu de la famille des xylariacées (sphérialies)

Autor(en): **Buser, Peter**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **73 (1995)**

Heft 1

PDF erstellt am: **03.02.2023**

Persistenter Link: <http://doi.org/10.5169/seals-936564>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Gerandete Kohlenbeere, *Biscogniauxia marginata* (Fr.) Pouzar,
ein wenig bekannter Ascomycet aus der Familie der Xylariaceae (Sphaeriales)

Die Familie der Xylariaceae oder Sphaeriales gehört in die grosse Gruppe der Kernpilze (Pyrenomycetes). Die charakteristische Eigenschaft dieser meist auf pflanzlichem Gewebe fruktifizierenden Gruppe besteht darin, dass die eigentlichen Fruchtkörper (Kernbecherchen oder Perithechien) in ein Stützgewebe (Stroma) eingesenkt sind. In den Perithechien befindet sich die Fruchtschicht (Hymenium) mit den Asci. Die reifen Sporen werden durch eine vorgebildete Öffnung (Ostiolum) nach aussen freigegeben.

Anfangs Januar 1994 fand ich in Arlesheim oberhalb der Ermitage Koordinate 615/260 an einem abgestorbenen, noch stehenden Mehlbeerbaum (*Sorbus aria*) einige schwarze becherlingsartige Pilze aus der Familie Xylariaceae, die ganz in der Rinde eingesenkt waren, eine eher seltene Wachstumsform aus dieser Familie. Meistens sitzen die Fruchtkörper in dieser Familie dem Substrat kugelig, halbkugelig, kissenförmig oder flachausgebildet auf.

Das Bestimmen dieser Fruchtkörper war mir nur möglich dank dem «Schlüssel zu den europäischen Gattungen der Familie der Xylariaceae (Sphaeriales)» erschienen 1986 in *Mycologia Helvetica* Vol. 1, No. 7.



Biscogniauxia marginata

a. Rindenfragment mit Fruchtkörpern / Fragment d'écorce avec fructifications – b. Fruchtkörper in der Aufsicht und im Querschnitt / Fructification (vue d'en haut, coupe) – c. Halber Querschnitt, 4× vergrössert / Coupe de la moitié d'une fructification (×4) – d. Paraphyse – e. Ascus / Asque – f. Sporen / Spores – g. Apikalapparat / Appareil apical

Makroskopische Beschreibung

Fruchtkörper (Stromata) 4–9 mm, rundlich bis oval, schüsselförmig – konkav, in der Rinde eingesenkt, diese nicht überragend, Oberfläche mit punktförmigen, eingesenkten Ostiolen (Lupe), schwarz, Perithezien birnenförmig, im unteren Stromateil eingesenkt.

Mikroskopische Beschreibung

Asci achtsporig, zylindrisch, unitunicat, 145–180×12–16 µm mit amyloidem Apikalapparat.

Paraphysen fadenförmig, hyalin, wenig septiert, mit Tropfen, 140–160×2–3 µm.

Sporen 11–19×9–15(16) µm, ellipsoid, mit Keimspalt, reif dunkelbraun, äussere Wandschicht hyalin, noch unreife Sporen haben einen grossen Tropfen, der bei reifen Sporen nur noch schwer sichtbar ist.

Anmerkung

Nach der Literatur scheint *Biscogniauxia marginata* an Sorbus-Arten gebunden zu sein. Junge Fruchtkörper sind von einer Nebenfruchtform (Anamorph) hellbraun bedeckt, und erst nach deren Verschwinden wird das schwarze Stromata sichtbar.

Peter Buser Ameisenholzstrasse 28, 4142 Münchenstein

Literatur:

Petrini L.E. und E. Müller: Haupt- und Nebenfruchtformen europäischer Hypoxylon-Arten und verwandter Pilze. In: Mycologia Helvetica 17 (1986).

Biscogniauxia marginata (Fr.) Pouzar, un Ascomycète peu connu de la famille des Xylariacées (Sphérialés)

La famille des Xylariacées, ordre des Sphérialés, appartient au vaste groupe des Pyrénomycètes. Caractéristiques du groupe: espèces se développant généralement sur les tissus de plantes supérieures, fructifications (périthèces) immergées dans un tissu de soutien (stroma), couche hyméniale (asques) recouvrant l'intérieur des périthèces, libération des spores par une ouverture (ostiole) à la surface du champignon.

Au début janvier 1994, j'ai trouvé à Arlesheim, au-dessus de l'Ermitage (coordonnées: 615/260), sur un alisier (*Sorbus aria*) mort encore dressé, quelques champignons noirs et cupuliformes, de la famille des Xylariacées, complètement immergés dans l'écorce, ce qui constitue une forme de croissance plutôt rare dans ladite famille. La plupart du temps, on trouve les fructifications des Xylariacées **sur** le substrat et elles sont sphériques, hémisphériques, pulvinées ou aplanies-étalées. Je n'ai pu déterminer ma récolte que grâce à la «Clé de détermination des genres européens de la famille des Xylariacées (Sphérialés)», publiée en 1986 dans MYCOLOGIA HELVETICA, Vol. 1, fasc. 7.

Macroscopie

Fructifications (stromata) 4–9 mm, subsphériques à ovoïdes, cupuliformes-concaves, immergées dans l'écorce, non émergentes; surface parsemée d'ostioles noirs ponctiformes en creux (loupe!); périthèces piriformes, immergées dans la partie infère du stroma.

Microscopie

Asques octosporiques, cylindriques, unituniqués, 145–180×12–16 µm, appareil apical amyloïde.

Paraphyses filiformes, hyalines, peu septées, guttulées, 140–160×2–3 µm. *Ascospores* 11–19×9–15(16) µm, ellipsoïdales, avec fente germinative, brun foncé à maturité, couche pariétale externe hyaline; spores immatures avec une grosse guttule, difficile à voir à maturité.

Remarques

Selon la littérature, il semble que *Biscogniauxia marginata* soit lié à des espèces de sorbiers. Les jeunes fructifications sont recouvertes par un anamorphe brun clair (stade imparfait, produisant des conidies) et les stromata noirs ne sont visibles qu'après sa disparition.

Peter Buser, Ameisenholzstrasse 28, 4142 Münchenstein

Littérature: cf. texte original en allemand.

(Trad.: F. Brunelli)