

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie  
**Herausgeber:** Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde  
**Band:** 80 (2002)  
**Heft:** 1

**Artikel:** Der Pilz des Monats (1) : Diplocarpa bloxami (Berkeley) Seaver :  
Erstmeldung für die Schweiz = Le champignon du mois (1) : Diplocarpa  
bloxami (Berkeley ex W. Phillips) Seaver : nouvelle découverte signalée  
pour la Suisse

**Autor:** Roffler, Urs

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-936039>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 03.05.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

**Diplocarpa bloxami**  
(Berkeley) Seaver

**Erstmeldung für die Schweiz**

**Urs Roffler**

Ruod 344, 7214 Grüşch GR

**Makroskopie**

Fruchtkörper 5–35 mm breit, ohrförmig, ausgebreitet-wellig, stiellos dem Substrat aufsitzend, Rand glatt. Fruchtschicht olivdunkelgrün, olivbraun bis schwarzbraun; Aussenseite oliv, olivbraun, deutlich heller als die Fruchtschicht, kleiig, bei trockener Witterung feldrig-schorfig aufreissend, Basis oft weissfilzig; Fleisch purpurfarben; einzeln, gesellig oder stark büschelig wachsend.

**Mikroskopie**

**Sporen:** elliptisch, schlank-spindelig, eiförmig, glatt, mit zwei Tropfen. Masse im Abwurf: 6,5–12 (–14) x 3–5 µm (in H<sub>2</sub>O).

*H. O. Baral an meinem Herbarmaterial: (6,5–) 7–9(–10,3) x 3,5–4 (–4,3) µm.*

**Asci:** achtsporig, gegen die Spitze biserial, 60–90 x 6–8 µm (in H<sub>2</sub>O). In Melzer-Reagens negativ.

**Paraphysen:** an der Spitze spindelig verdickt bis 6 µm und mehrfach septiert, mehr oder weniger braun gefärbt, zur Basis gegabelt und ebenfalls septiert (in H<sub>2</sub>O).

**Medular-Excipulum:** bestehend aus dicht verwobenen schlanken, septierten Hyphen, in H<sub>2</sub>O mit hell blutrotem, extrazellulärem Pigment.

**Äusseres Excipulum:** in H<sub>2</sub>O aus hellbraunen Zellen einer *Textura angularis* (*H. O. Baral an meinem Herbarmaterial: Excipulumauswüchse sind kegelige Gebilde aus kugeligen Zellen, Gebilde etwa 70–100 µm lang und 70–100 µm breit*) an der Basis mit dicht besetzten hyalinen Haaren, die teilweise einen weisslichen Filz bilden.

Am Rand mit graubraunen, dickwandigen, septierten und oftmals verzweigten Haaren, die zur Spitze stumpf auslaufen und an der Basis grössere kugelige Zellen besitzen, die dann kettenartig miteinander verbunden sein können, 40–70 (–100) x 3–4 (–6,5) µm.

**Ergänzungen H. O. Baral:**

Farbe und KOH-Reaktion der Medulla ist ionomidotisch, also weinrotbraun ins Medium austretend, wobei die Medulla bei Druck auf das Deckglas schön hell violett-lila erscheint, bei Loslassen dann wieder dunkler rotbraun.

**Ökologie/Standort**

Mischwald mit Buchen, Fichten, Grauerlen usw. in einem Bergtobel mit kleinem Bach. Auf vermoostem, morschem, zu etwa einem Drittel in Erde/Laub liegendem Buchenstamm.

**Fundort:** Gemeinde 7213 Valzeina GR, im Gebiet Chleiwasser, Sagen, Koord.: 765.200/202.000, Höhe 1000 m, am 16. August 2000, Herbar U. R. 450-451, H. B. 7014; am 10. August 2001, Herbar U. R. 450-452, H. B. 7015.

**Fotos:** U. R. **Holzbestimmung:** H. O. Baral.



### **Bemerkungen**

Grosse Fruchtkörper ähneln im Aussehen der Ohrförmigen Lorchel *Helvella silvicola*, im Wachstum erinnern sie mich eher an eine Art aus der Gattung *Encoelia*. Die Randbehaarung konnte ich auch mit dem Mikroskop nicht bei jedem Exemplar feststellen!

Auch H. O. Baral hält diese Art für einen Vertreter der *Encoelioideae*, obwohl sie bisher teils bei den Hyaloscyphaceen steht (aufgrund der teilweise vorhandenen Randbehaarung) oder bei den Dermateaceen (aufgrund der isodiametrischen Excipulumzellen).

### **Datenbank der Makromyceten der Schweiz**

Meine Anfrage bei Frau Dr. Beatrice Senn-Irlet hat ergeben, dass es sich bei dieser seltenen Art um eine Erstmeldung für die Schweiz handelt.

### **Dank**

Mein Dank gilt Herrn Hans Otto Baral aus Tübingen (D) für die Bestimmung dieser sehr seltenen Art und für seine wertvollen Ergänzungen zu diesem Artikel.

### **Literatur**

R. W. G. Dennis, *British Ascomycetes*, 1981, Seite 164.

**Diplocarpa bloxami**  
(Berkeley ex W. Phillips) Seaver

**Nouvelle découverte signalée pour la Suisse**

**Urs Roffler**, Ruod 344, 7214 Grüşch GR

(Traduction: J.-J. Roth)

**Macroscopie**

Fructification mesurant 5 à 35 mm de large, en forme d'oreille, étalée à ondulée, sessile, marge glabre; surface hyméniale vert olive foncé, brun olivâtre à brun noirâtre; surface externe olive, brun olivâtre, nettement plus claire que l'hyménium, furfuracée, crustacée à craquelée par temps sec, la base est souvent feutrée de blanc; chair colorée de pourpre; isolé, grégaire à densément fasciculé.

**Microscopie**

**Ascospores:** elliptiques, étroitement fusiformes, ovoïdes, lisses, avec deux guttules.  
6,5–12 (–14) x 3–5 µm.

*H. O. Baral: mesures effectuées sur matériel frais:*  
(6,5–) 7–9 (–10,3) x 3,5–4 (–4,3) µm.

**Asques:** octosporés, bisériés vers le sommet, 60–90 x 6–8 µm. Négatifs dans le lugol.

**Paraphyses:** en fuseau, renflées à l'apex jusqu'à 6 µm, pluriseptées, plus ou moins colorées de brun, fourchues à la base qui est moins densément septée. (Toutes ces mesures ont été effectuées dans l'eau).

**Excipulum médullaire:** se compose d'hyphes densément enchevêtrées, étroites et septées, montrant un pigment extracellulaire violacé clair.

**Excipulum externe:** dans H<sub>2</sub>O constitué de cellules brun clair de textura angularis, (*observation de H. O. Baral à partir de mon matériel d'herbier: les excroissances de l'excipulum sont formées de cellules coniques à sphériques, 70–100 µm*).

La base est densément garnie de poils hyalins, formant un feutrage blanc. A la marge se trouvent des poils brun gris, à paroi épaisse, septés, souvent ramifiés, à sommet tronqué, à base composée de plus grandes cellules sphériques, qui peuvent parfois être reliées les unes aux autres comme des chaînes, 40–70 (–100) x 3–4,5 (–6,5) µm.

**Commentaire de H. O. Baral:**

La couleur et la réaction de la médulla dans le KOH est appelée ionomidotique, c'est-à-dire qu'elle laisse échapper dans le milieu d'observation une couleur brun rouge vineux. Dans ce milieu, en l'écrasant, la médulla apparaît sur le porte-objet d'un beau lilas violet et elle redeviendra brun rouge foncé en la rinçant.

**Ecologie**

Forêt mêlée comprenant des hêtres, épicéas, aulnes blanchâtres, au bord d'un petit ruisseau, au fond d'une gorge étroite. Habitat: sur écorce de tronc moussu, pourri, imbu, à terre, enfoui jusqu'au tiers dans la litière de feuilles.

**Station:** Commune de Valzeina (7213), GR, dans la région de Chleiwasser, Sagen. Coord.: 765.200/202.000, altitude: 1000 m. Le 16 août 2000, herbier U. R. 450–451, H. B. 7014; le 10 août 2001, herbier U. R. 450–452, H. B. 7015.

**Photos:** U. R. **Détermination:** H. O. Baral.

## Remarques

Les grandes fructifications ressemblent à *Helvella silvicola*, Helvelle en forme d'oreille. Lors de la croissance, cette espèce fait penser à une espèce du genre *Encoelia*. Je n'ai pas pu observer clairement au microscope la marge garnie de poils sur chaque jeune exemplaire.

H. O. Baral, également, pense que cette espèce appartient aux *Encoelioideae*, bien que jusqu'à maintenant elle ait été classée dans les *Hyaloscyphaceae* à cause de la marge garnie de poils, ou parfois parmi les *Dermataceae* (à cause des cellules isodiamétriques de l'excipulum).

## Littérature


R. W. G. Dennis, *British Ascomycetes*, 1981, page 164.

## Banque de données des Macromycètes de Suisse

Sur ma demande, M<sup>me</sup> Dr Beatrice Senn-Irlet confirme que cette découverte représente une première découverte signalée pour la Suisse.

## Remerciements

Je suis reconnaissant envers M. Hans Otto Baral de Tübingen pour la détermination de cette espèce très rare et pour ses compléments très précieux à cet article.



## Zeichnungen / dessins

- A – Ascosporen / ascospores
- B – Ascus mit Ascosporen / asque avec ascospores
- C – Paraphyse / paraphyse
- D – Randhaare / poils de la marge