

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 80 (2002)
Heft: 6

Artikel: Der Pilz des Monats (12) : Rutstroemia calopus (Fr.) Rehm : =
Rutstroemia paludosa (Cash & Davidson) Groves & Elliot = Le
champignon du mois (12)

Autor: Roffler, Urs
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-936080>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 27.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Rutstroemia calopus (Fr.) Rehm

= *Rutstroemia paludosa* (Cash & Davidson) Groves & Elliott

Urs Roffler

Ruod 344, 7214 Grüşch GR

Makroskopie

Fruchtkörper bis 6 mm im Durchmesser, mehr oder weniger flach, zur Mitte etwas eingedellt, gestielt. Fruchtschicht haselnussbraun, glatt. Aussenseite etwas heller, bei Trockenheit weisslich bereift. Stiel bis 4 mm lang, gleichfarbig, an der Anwachsstelle von einem feinen, bräunlichen Filz überzogen. Kein Sklerotium gefunden, lediglich schwarze Punkte auf dem Substrat.

Mikroskopie

- Sporen:** unregelmässig elliptisch, auch mit ausgefallenen Formen, glatt, hyalin, mit wenigen mittelgrossen und vielen kleinen Tropfen, die oft zu den Polen hin orientiert sind, bei Überreife einfach septiert, stark nach allen Seiten auskeimend, vital 12–20 x 5,5–8 µm.
- Asci:** 190–220 x 14–16 µm. In Lugol positiv (blau).
- Paraphysen:** fast zylindrisch, stark wellig, gegabelt, bis etwa 4 µm breit, Spitze kaum verdickt, septiert, häufig mit Guttulen.
- Excipulum:** aus einer langgestreckten Textura prismatica-porrecta, mit teilweise stark angeschwollenen Zellen und eingelagerten Oxalat-Kristallen. Austretende keulenförmige, hyaline, septierte Excipulumhyphen.

Fundort

7212 Seewis GR, Ganey Alt Säss, 26. Mai 2001 und 5. Mai 2002, 1300 m ü. M., Koord.: 767.875/211.550, Herbar: U.R. 400-441, = H.B. 7140. Fotos U.R.

Ökologie

Binsen-Quellwasserbiotop, auf faulenden, toten Seggen/Binsen.

Dank

Dass dieser Fund richtig bestimmt werden konnte, verdanke ich Hans Otto Baral aus Tübingen (D). Ihm möchte ich auch für seine guten Tipps und Hinweise zu diesem Artikel danken. Seiner Meinung nach weicht die in «Pilze der Schweiz», Band 1, abgebildete *Rutstroemia spec.* (Nr. 156) durch J-negative Asci, ein gelatinisiertes Ectalexipulum aus schmalen Hyphen sowie durch sehr kurz gestielte Apothezien ab.

R. calopus wurde wahrscheinlich mehrfach unter verschiedenen Namen beschrieben (siehe Baral & Krieglsteiner 1985: 21), deren Klärung jedoch noch aussteht. So ist z.B. fraglich, ob *R. calopus* und *R. henningsiana* (Ploettn.) Dennis in Ellis & Ellis (1985: 498,544) nicht dieselbe Art meinen.

Literatur

Baral H. O. & Krieglsteiner G. J. (1985). Bausteine zu einer Askomyzeten-Flora der Bundesrepublik Deutschland. *Zeitschrift für Mykologie*, Beiheft 6.

Ellis, M. B. & Ellis, J. P. (1985). *Microfungi on land plants. An identification handbook*. London, Sydney: Croom Helm, 818 pp.

Rutstroemia calopus (Fr.) Rehm

= *Rutstroemia paludosa* (Cash & Davidson) Groves & Elliott

Urs Roffler, Ruod 344, CH-7214 Grüşch GR

Macroscopie

Fructification mesurant jusqu'à 6 mm de diamètre, plus ou moins étalées, un peu déprimée en son centre, stipitée. La couleur de l'hyménium est de couleur brun noisette, la surface est lisse. La surface externe est plus claire, blanchâtre par temps sec, pruineuse. Le stipe est long de 4 mm, concolore; à sa base, il est revêtu d'un fin tomentum brunâtre.

Aucun sclérote n'a été trouvé, seuls quelques ponctuations noires ont été remarquées sur le substrat.

Microscopie

Spores: irrégulièrement elliptiques, parfois de forme inattendue, lisses, hyalines, garnies de quelques guttules moyennement grandes et de nombreuses petites, situées souvent près des pôles, uniseptées lorsqu'elles sont mûres, germant fréquemment en tous sens. Mesures des spores vivantes: 12–20 x 5,5–8 µm.

Asques: 190–220 x 14–16 µm. Ils sont positifs dans le lugol (coloration bleue).

Paraphyses: presque cylindriques, fortement flexueuses, bifurquées, mesurant jusqu'à 4 µm de largeur, à peine épaissies à l'apex, septées, montrant souvent des guttules.

Excipulum: constitué de cellules oblongues de *textura prismatica-porrecta*, avec des cellules en partie fortement renflées garnies de cristaux d'oxalates. Les hyphes de l'excipulum sont septées, hyalines et claviformes.

Station et Ecologie

7212 Seewis i. P., Ganey Alt Säss, trouvé le 26 mai et le 5 mai 2002, à 1300 mètres d'altitude. Coordonnées: 767.875 / 211.550. Parmi les joncs d'une source d'eau, sur tiges mortes et pourries de joncs et de Carex.

Herbier: U. R. 400-441. = H. B. 7140. Photos: U. R.

Remerciements

Je remercie chaleureusement M. Hans Otto Baral de Tübingen (D), qui a déterminé avec exactitude cette récolte. Au travers de cet article, j'aimerais lui témoigner de ma reconnaissance pour ses bons conseils et indications judicieuses.

D'après lui, l'espèce figurée dans le tome 1 des «Champignons de Suisse» sous le nom de *Rutstroemia spec.* (N° 156), apparemment réagissant négativement à l'iode, montrant un excipulum ectal gélifié et constitué d'hyphes étroites ainsi que des apothécies très brièvement stipitées, devrait vraisemblablement se nommer *R. calopus*. Celle-ci apparaît de plus avoir été décrite sous de multiples et différents noms (voir Baral & Kriegersteiner 1985: 21) dont des éclaircissements sont encore à attendre. L'on peut ainsi se poser la question si *R. calopus* et *R. henningsiana* (Ploelttn.) Dennis in Ellis & Ellis (1985: 498,544) ne sont pas une seule et même espèce.

Littérature: voir le texte en allemand

Traduction: J.-J. Roth

Zeichnungen / dessins

A – Sporen / ascospores

B – Ascus mit Sporen / asque avec Ascospores

C – Paraphysen / paraphyses



Rutstroemia calopus

