

**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie

**Herausgeber:** Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde

**Band:** 82 (2004)

**Heft:** 6

**Artikel:** Der Pilz des Monats (12) : Jahnoporus hirtus (Cooke) Nuss : Brauner Haarstielporling = Le champignon du mois (12)

**Autor:** Wilhelm, Markus

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-935890>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 21.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## **Der Pilz des Monats (12)**

### **Jahnoporus hirtus (Cooke) Nuss Brauner Haarstielporling**

**Markus Wilhelm**

Felsenweg 66, CH-4123 Allschwil  
amwilhelm@hispeed.ch

An der Schweizerischen Pilzbestimmertagung in Bettlach (21. August 2004) gab es einige interessante und seltene Arten zu bewundern. Einen dieser Pilze möchte ich nachfolgend vorstellen. Es handelt sich um einen grossen Porling, von dem weltweit nur wenige Nachweise bekannt sind. In der Schweiz fand ihn z. B. Hansueli Aeberhard 1997 im Val de Ruz, ein älterer Fund ist 1878 aus dem Kanton Neuenburg notiert.

#### **Makroskopie**

- Hut:** etwa 13 cm, flach, Rand leicht nach unten gebogen und gekerbt-wellig. Oberfläche uneben, teils etwas aufgerissen, trocken und fein samtig-kurzhaarig, unter der Lupe mit verklebten Haarbüschen (kleine Pyramiden bildend). Farbe hellbraun, haselbraun, gleichmässig durchgefärbt. (Korn.& Wanscher: 5E6, 5D5: senfbraun, lehmfarbig).
- Hymenium:** Poren gross, 1–2 mm, Rand uneben, durch labyrinthische Tendenz oft viel länger, eckig und mit unvollendeten Wänden, verletzt z.T. etwas gilbend. Röhren bis 6 mm lang, stark herablaufend.
- Stiel:** kurz, zentral, 4 x 3 cm, eigentlicher Stiel ohne Röhren 3 cm, etwas zugespitzt. Oberfläche bräunlich mit eingewachsenen Substrat- und Erdteilen.
- Fleisch:** fest und dicht, längsfaserig, zäh, im Stiel härter, rein weiss und ungezont. Geruch schwach, süßlich aromatisch und mit etwas unangenehmer Komponente. Geschmack im Context (Fleisch) mild, in den Röhren sehr unangenehm und lange anhaltend bitter.

#### **Mikroskopie**

- Sporen:** Spp. weiss, inamyloid. Sporen langoval, spindelig, Appendixende etwas abgeborgen, ähnlich den Röhrlingssporen, glatt, mit Öltropfen oder körnigem Inhalt. Masse: 12–15 x 4,5–5,0 µm.
- Hymenium-aufbau:** monomitisch, mit hyalinen Hyphen, 2–3 µm breit, die mit auffallenden kleinen Öltröpfchen perlchnurartig gefüllt sind. Basidien 4-sporig, 30–40 x 9–11 µm. Ohne oder mit nur basidiolenartigen Zystiden. Schnallen vorhanden.
- HDS:** aus 2–3 µm breiten Haaren, die zu Büscheln zusammenkleben, Pigment intrazellulär, vakuolär und körnig.
- Context:** aus dickwandigen, knorriegen, blasigen und vielgestaltig gewundenen Hyphen, mit Schnallen.

#### **Fundort**

In der Gegend von Schangnau, 1150 m ü. M., im Fichtenwald auf morschem Strunk.  
Finder: A. Brunner & K. Rohner.



### ***Jahnoporus hirtus*, Brauner Haarstielporling**

#### **Bemerkungen**

Der Pilz wurde zuerst als Bergporling *Bondarzewia mesenterica* (=montana) angesprochen, es gibt ja nicht viele grössere, gestielte Porlinge mit grossen Poren. Der Bergporling hat jedoch einen eher fächerartigen Wuchs, scharfe Röhren und natürlich völlig andere Mikromerkmale wie rundliche, amyloide, täublingsartige Sporen. Möglich wäre auch eine (oberflächliche) Verwechslung mit *Meripilus giganteus* (Riesenporling, mit kaum sichtbaren Poren und schwärzend). Aufgrund des zentralen Stiels lief die Gattung früher unter *Albatrellus*.

#### **Verwechlungen, Häufigkeit**

Wie erwähnt, eigentlich nur mit *Bondarzewia mesenterica*; dessen Stiel ja zufällig auch einmal sehr zentral ausgebildet sein kann.

Der Braune Haarstielporling wird überall als «sehr selten» beschrieben, auch im Internet gibt es nur wenige Seiten, offensichtlich ist er aber weltweit verbreitet. Ziemlich sicher wird er öfter gefunden; aber nur mykologisch Interessierte mit der nötigen Literatur haben die Chance, diese Rarität überhaupt zu erkennen. Daher besteht viel Unsicherheit in Bezug auf die Häufigkeit dieses Pilzes! Vielleicht erkennt jemand auf Grund dieses Beitrages einen früheren, damals nicht bestimmhbaren Fund?

#### **Literatur**

Jülich, W. (1984) – Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora II/b1. S. 313.

Moser, M. & W. Jülich (1985–2003) – Farbatlas der Basidiomyceten. Tafel 1.

Rote Liste der gefährdeten Grosspilze Deutschlands (1992).

Ryvarden L. & R. L. Gilbertsen – European Polypores.

## **Jahnoporus hirtus (Cooke) Nuss**

**Markus Wilhelm**

Felsenweg 66, CH-4123 Allschwil

amwilhelm@hispeed.ch

Lors de la session de la «Pilzbestimmertagung» à Bettlach (le 21 août 2004), nous avons pu admirer quelques espèces rares et intéressantes. Je voudrais présenter ici l'une de celles-ci. Il s'agit d'un grand polypore dont seules quelques rares découvertes ont été signalées. Hansueli Aeberhard le trouva dans le Val de Ruz en 1997. La précédente trouvaille de cette espèce a été notifiée dans le canton de Neuchâtel en 1878.

### **Macroscopie**

- Chapeau:** env. 13 cm, étalé, la marge légèrement incurvée vers le bas, crénelée, ondulée. La surface est inégale, en partie légèrement déchirée, sèche et finement veloutée, velue, sous la loupe formant de petites touffes de poils collées (en forme de petites pyramides). Couleur: brun clair, brun noisette, couleur égale (Korn. & Wanscher: 5E6, 5D5, brun moutarde, couleur argilacée).
- Hyménium:** pores grands, 1–2 mm, inégaux, avec une tendance labyrinthiforme, plus grands vers la marge, anguleux et montrant des parois incomplètes, jaunissant quelque peu aux endroits blessés. Les tubes ont jusqu'à 6 mm de long., fortement décourants.
- Stipe:** court, central, 4 x 3 cm, le stipe mesure 3 cm véritablement sans pores, un peu acuminé. Surface brunâtre colorée avec des fragments de substrat et de terre.
- Chair:** ferme et dense, fibrilleux, coriace, plus ferme encore dans le stipe, blanc pur et non zoné. Odeur faible, douce, aromatique avec un léger arrière-fond désagréable. Saveur douce (chair), très désagréable dans les tubes et laissant longtemps un goût amer.

### **Microscopie**

- Spores:** spores hyalines, non amyloïdes, longuement ovales, fusiformes, la terminaison de l'appendice un peu courbée, semblables aux spores des bolets, lisses, avec une guttule ou un contenu granulaire. Mesures: 12–15 x 4,5–5,0 µm.
- Structure de l'hyménium:** monomitique, avec des hyphes de 2–3 µm, emplies de petites gouttules huileuses, semblables à des perles. Basides tétrasporiques, 30–40 x 9–11 µm. Sans cystides ou alors seulement avec des cystides en forme de basidioles. Boucles présentes.
- Revêtement piléique:** composé de poils larges de 2–3 µm, qui sont agglomérés en petites touffes, pigment intracellulaire, vacuolaire et granulaire.
- Texture de la chair:** constituée d'hyphes à parois épaisses, noueuses, vésiculeuses et vrillées, bouclées.

### **Habitat**

Région de Schangnau, 1150 m d'alt. Dans une forêt d'épicéas sur un tronc pourri, récolté par M. A. Brunner & K. Rohner.

### **Remarques**

Ce champignon a tout d'abord été rapproché de *Bondarzewia mesenterica* (=montana), car il n'existe guère d'autres polypores stipités, de grande taille, avec de grands pores. Cette espèce se différencie par une croissance particulière, des tubes à saveur forte ainsi que naturellement, plusieurs autres caractéristiques microscopiques, comme les spores russuloïdes, sphériques et

amyloïdes. Il pourrait également être confondu avec *Meripilus giganteus*, qui a des pores à peine visibles et noircissants. A cause de son stipe central, ce genre faisait partie anciennement du genre *Albatrellus*.


### Confusion, répartition

Comme déjà évoqué plus haut, il n'y a confusion possible qu'avec *Bondarzewia mesenterica*, dont le stipe, par hasard, peut se former parfois avec un stipe central.

Cette espèce a été décrite partout comme très rare. Sur Internet il n'y a que peu de pages sur cette espèce, qui semble pourtant répartie largement dans le monde. Il est probable qu'elle est récoltée plus fréquemment, mais seuls ceux qui s'y penchent profondément et qui possèdent la littérature nécessaire, peuvent avoir la chance de la déterminer exactement.

**Littérature:** voir le texte en allemand.

**Traduction:** J.-J. Roth



Sporen / spores



Hyphen Context / hyphes de la chair