

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie
Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde
Band: 87 (2009)
Heft: 3

Artikel: Il fungo del mese 5 : Hysterographium fraxini = Der Pilz des Monats 5 =
Le champignon du mois 5
Autor: Mordasini, Eli
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-935591>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Hysterographium fraxini

ELI MORDASINI

Key words: Fungi, Ascomycota, Dothideomycetes, Hysteriales, Hysteriaceae, *Hysterographium fraxini*.

Introduzione

Ho trovato questo ascomicete di dimensioni minuscole, cercando altri funghi con crescita lignicola. In Valle Onsernone il frassino (*Fraxinus excelsior*) è albero largamente diffuso, praticamente una monocultura. Il primo ritrovamento è stato effettuato nel mese di ottobre del 2007, il secondo, molto più conspicuo, il 20 novembre 2008.

Materiali e metodi

I funghi sono stati analizzati allo stato fresco e reperiti su legno corticato di *Fraxinus* secco e non deteriorato. Per la microscopia ho usato KOH al 5% e il reagente di Melzer. Le osservazioni micro-

scopiche sono state eseguite con un microscopio ottico con obiettivo da 400x e da 1000x in immersione. Disegni dei caratteri microscopici al tratto con matita.

Hysterographium fraxini (Pers.) De Not. 1847

Sinonimi: *Hypoderma fraxini* (Pers.) DC. 1805, *Hysterium elongatum* Wahlenb. 1842, *Hysterium fraxini* Pers. 1794, *Hysterographium elongatum* (Wahlenb.) Corda 1842, *Sphaeria sulcata* Bolton 1789.

Etimologia: Per la crescita su *Fraxinus excelsior*.

Descrizione

Ascoma > A forma di pseudotecio lungo circa 2 mm, largo 0,5 mm, a forma di chicco di caffè; punte a volte quasi acute con un solco longitudinale su tutta la lunghezza. Di colore nero, consistenza



***Hysterographium fraxini*:** Corpi fruttiferi | Fruchtkörper

carboniosa, dura, erompente dalla corteccia secca.
Aschi > Claviformi-cilindracei, a volte ricurvi biseriati, $180-200 \times 18-30 \mu\text{m}$, contenenti otto spore, più raramente sei spore.

Parafisi > (o pseudoparafisi) assenti.

Spore > Irregolarmente ellisoidali, alcune schiacciate lateralmente, spesso con leggera strozzatura mediana, muriformi, con 7-10 setti trasversali e 2-3 longitudinali, lisce, di color bruno chiaro, bruno oro fino a bruno scuro. Misure $34-41 \times 6-18 \mu\text{m}$ (in Ellis & Ellis 1985: $35-50 \times 16-20 \mu\text{m}$). .

Habitat ed ecologia

Su ramoscelli secchi e asciutti di *Fraxinus* al suolo. Coordinate 687.250/117.125, altitudine 1050 m s.l.m.

Materiale studiato

Zona Ertà, Spruga (Comune di Onsernone, TI). Leg. e det. E. Mordasini. Exsiccata depositati presso il Museo di storia naturale di Lugano: LUG 11683 e nell'erbario personale dell'autore con la dicitura M. Eli N° 131.

Abbastanza raro. Si tratta del primo ritrovamento a sud delle Alpi, poco diffuso anche al nord. Pochi i ritrovamenti segnalati durante gli ultimi 20 anni. Forse data la piccolezza e il colore passa inosservato e il frassino non è così ampiamente diffuso in tutte le zone del Ticino e della Svizzera.

Discussione


Il genere *Hysterographium* Corda comprende molte specie che si differenziano poco a livello macroscopico: *Hysterographium elongatum* (Wahlb.) Corda ha spore marroni di $36-48 \times 12-16 \mu\text{m}$ e cresce su *Salix* o, più raramente, su altre latifoglie. *Hysterographium mori* (Schwein.) Rehm ha spore bruno dorate con riflessi rossicci, $18-25 \times 7-10 \mu\text{m}$ e cresce su legno marcescente.

Il genere *Hysterium* Pers. e il genere *Gloniopsis* De Not. sono macroscopicamente molto simili al genere *Hysterographium*, ma hanno spore differenti. Il genere *Cucurbitaria* Gray e il genere *Pleospora* Rabenh. ex Ces. & De Not. presentano spore muriformi simili a quelle di *Hysterographium*, ma sono macroscopicamente molto differenti.

Bibliografia vedi traduzione in tedesco.



***Hysterographium fraxini*:** Aschi | Ascì



Spruga: bosco misto con frassino | Eschen-Mischwald

Hysterographium fraxini

ELI MORDASINI

Key words: *Fungi, Ascomycota, Dothideomycetes, Hysteriales, Hysteriaceae, Hysterographium fraxini.*

Einleitung

Diesen winzigen Ascomyzeten habe ich bei der Suche nach anderen holzbewohnenden Pilzen entdeckt. Im Onsernonetal ist die Esche ein weit verbreiteter Baum, zum Teil wächst sie gar in «Monokulturen». Den ersten Fund konnte ich im Oktober 2007 machen, den zweiten auffälligeren am 20. November 2008.

Material und Methoden

Die Fruchtkörper wurde in frischem Zustand untersucht auf berindetem, nicht morschem Eschenholz. Für die Mikroskopie wurde KOH (5 %) und Melzer-Reagens benutzt. Die mikroskopischen Beobachtungen wurden mit einer 400-fachen und einer 1000-fachen Vergrösserung gemacht, die Zeichnungen der Mikromerkmale mit Bleistift.

***Hysterographium fraxini* (Pers.) De Not. 1847**

Synonyme: *Hypoderma fraxini* (Pers.) DC. 1805, *Hysterium elongatum* Wahlenb. 1842, *Hysterium fraxini* Pers. 1794, *Hysterographium elongatum* (Wahlenb.) Corda 1842, *Sphaeria sulcata* Bolton 1789.

Etymologie: bezieht sich auf das Substrat: *Fraxinus*.

Beschreibung

Fruchtkörper > In Form eines Pseudotheziuns, ca. 2 mm lang, 0,5 mm breit, kaffeebohnenförmig. Die Enden manchmal zugespitzt mit einer Längsfurche auf der Seite. Schwarz, Konsistenz wie Kohle, hart, aus der trockenen Rinde herausbrechend.

Asci > Keulenförmig bis zylindrisch, manchmal gekrümmmt, zweireihig, 180–200×18–30 µm, mit 8 Sporen, selten mit 6.

Paraphysen > (oder Pseudoparaphysen) keine.

Sporen > Unregelmässig ellipsoid, einige seitlich abgeflacht, häufig mit einer Einschnürung in der Mitte, mauerförmig mit 7–10 Quersepten und 2–3 Längssepten, glatt, von hellbraun über goldbraun bis dunkelbraun. 34–41×6–18 µm (bei Ellis & Ellis 1985: 35–50×16–20 µm).

Habitat und Ökologie

Auf dürren und trockenen Eschenästchen auf dem Boden. Koordinaten 687.250/117.125, 1050 m ü.M.


Untersuchte Funde

Erta bei Spruga (Gemeinde Onsernone, TI). Leg. und det. E. Mordasini. Die Exsikkata sind im Museo di storia naturale in Lugano (Nr. LUG 11683) und im persönlichen Herbar des Autors (Nr. 131) deponiert.

Ziemlich selten. Es handelt sich hier um den ersten Fund südlich der Alpen, jedoch auch nördlich der Alpen nur selten gefunden. In den letzten 20 Jahren wurden nur wenige Funde gemeldet. Vielleicht wegen der geringen Grösse oder der unscheinbaren Farbe oder weil die Esche im Tessin und der ganzen Schweiz nicht in grossen Beständen vorkommt.

Diskussion

Die Gattung *Hysterographium* Corda beinhaltet zahlreiche sehr ähnliche Arten, die sich nur mikroskopisch unterscheiden: *Hysterographium elongatum* (Wahlb.) Corda hat braune Sporen mit den Massen 36–48×12–16 µm und wächst auf Weide (*Salix*) oder seltener auf anderen Laubbäumen. Hy-



***Hysterographium fraxini*:** Spore | Sporen

sterographium mori (Schwein.) Rehm hat goldbraune Sporen mit rostrottem Schimmer, 18–25×7–10 µm, und wächst auf morschen Holz.

Die Gattungen *Hysterium* Pers. und *Gloopsis* De Not. sind makroskopisch sehr ähnlich wie *Hysterocephalium*, besitzen jedoch andere Sporen. Die Gattungen *Cucurbitaria* Gray und *Pleospora*

Rabenh. ex Ces. & De Not. haben zwar ähnlich mauerförmige Sporen wie *Hysterocephalium*, sind jedoch makroskopisch sehr verschieden.

Übersetzung N. KÜFFER

BIBLIOGRAFIA | LITERATUR

- BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN 1984. Champignons de Suisse. Tome 1. Les Ascomycètes. Mykologia, Lucerne.
CETTO B. 1992. Funghi dal vero Vol. 7. Saturnia. Trento.
DENNIS R.W.G. 1978. British Ascomycetes. Cramer, Vaduz.
ELLIS M.B. & J.P. ELLIS 1985. Microfungi on Land Plants, An Identification Handbook. Macmillan Pub Co, London.
MEDARDI G. 2006. Ascomiceti d'Italia. AMB Centro studi micologici, Vicenza.

DER PILZ DES MONATS 6 LE CHAMPIGNON DU MOIS 6 IL FUNGO DEL MESE 6

Hygrophorus arbustivus

FRANÇOIS FRELÉCHOUX

Hygrophorus signifie littéralement «qui porte l'humidité». Ce genre ne montre pas une grande homogénéité macro- et microscopique, ni écologique. Aussi, le genre *Hygrophorus* sensu lato a-t-il été séparé en plusieurs nouveaux genres: *Hygrocybe*, *Camarophyllus* et *Hygrophorus* sensu stricto (= *Limacium*).

Les espèces d'*Hygrocybe* sont fragiles, de petites dimensions, humides, pas toujours visqueuses sur le chapeau. Ces champignons sont en général vivement colorés, leurs lames rarement décurrentes. Les représentants du genre *Camarophyllus* sont de petites dimensions, ont un chapeau et un pied secs; ils n'ont pas de voile général et leurs lamelles sont décurrentes. Les espèces du genre *Hygrophorus* s.s. sont généralement de grande dimension, charnues. Leurs fructifications montrent un pied et un chapeau généralement visqueux par un voile général abondant. Leurs lames sont adnées à nettement décurrentes.

Les différences macroscopiques se retrouvent aussi dans la microscopie. En effet, la trame des lames est distincte: régulière chez *Hygrocybe*, irrégulière chez *Camarophyllus* et bilatérale chez *Hygrophorus* s.s.

Les trois genres diffèrent aussi par leur habitat. Les espèces d'*Hygrocybe* et *Camarophyllus* sont des espèces qui vivent principalement dans les prés. En raison de l'utilisation des engrangements par l'agriculture et de dépôts apportés par les pluies, la plupart de nos milieux sont trop riches en azote et ceci amène à la disparition de nombreuses espèces de plantes (par exemple les Orchidacées et les Fabacées) et champignons. Les espèces de ces deux genres se sont nettement raréfiées avec l'intensification de l'agriculture en plaine et en moyenne montagne. Elles sont encore fréquentes et abondantes dans les pâtures subalpines et alpines mais elles pourraient s'y trouver menacées actuellement par l'emprise de la forêt.