**Zeitschrift:** Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie

Herausgeber: Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde

**Band:** 99 (2021)

Heft: 2

**Artikel:** Ascomycètes urinophiles trouvés dans les pâturages boisés

Autor: Stöckli, Elisabeth

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-956353

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

# Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Ascomycètes urinophiles trouvés dans les pâturages boisés

ELISABETH STÖCKLI • TRADUCTION: J.-J. ROTH

Les images des pâturages forestiers avec des chevaux et des vaches sont souvent utilisées pour mettre en valeur la région des Franches-Montagnes. Elles sont connues dans toute la Suisse. Les arbres plantés ça et là avec des prairies entre deux caractérisent ces plateaux. Les épicéas imposants aux branches largement étalées qui atteignent souvent le sol prennent beaucoup de place. L'exploitation des pâturages et du bois évite l'émergence d'une forêt dense.

Dans une section peu boisée d'un pâturage forestier, l'autrice a remarqué des taches brunes lors de la recherche de tiges de fougère dans la mousse. En y regardant de plus près, des fructifications de différentes couleurs parsemaient ces endroits moussus couverts d'aiguilles, de feuilles et de brindilles. La recherche ciblée sur des sites imbibés d'urine animale a mis en évidence un nombre étonnant d'Ascomycètes.

# **Spooneromyces velenovskyi** (Vacek ex Svrcek) Van Vooren

Fructifications de 1–8 mm, cupuliformes quand elles sont jeunes, étalées, aplanies avec une marge incurvée, sessiles, hyménium et surface externe blanche, avec l'âge jaunissante, marge couverte de poils bruns hérissés; solitaire à grégaire.

Asques:  $160-175 \times 10-12 \, \mu m$ , avec crochets, réaction négative à l'iode.

Spores elliptiques, hyalines,  $13,5-15,25\times6,5-7,75~\mu m$  à guttules polaires, réticulées, cyanophiles, nœuds du réseau en relief.

Paraphyses droites, septées et avec un apex clavé, renflé garni de guttules. Poils raides, multicellulaires, pointus à l'apex, à base simple, à paroi épaisse et brune. Grâce aux découvertes les plus récentes, cette espèce est classée dans le genre Spooneromyces.

Littérature: Van Vooren N. 2014. ascomycete.org, 6 (4): 89-92.

Remarque: Spooneromyces laeticolor (Karsten) Schum & Moravec (de couleur orange à blanche) et Byssonectria terrestris (Alb. & Schwein.:Fr.) Pfister (de couleur orange, de plus en plus dense) ont été trouvées aux mêmes endroits. Ces espèces peuvent être facilement séparées des espèces ci-dessus en raison de leurs caractéristiques macroscopiques, de la forme et de la taille des spores et des paraphyses.

**Peziza tarembergensis** Moyne, Stöckli, c. Page & Van Vooren

Fructifications de 10-15 mm, sessiles à légèrement stipitées, patelliformes, hyménium et surface extérieure blanche, croissant individuellement ou de manière dispersée, en petits groupes.

Asques,  $200-250 \times 10-12 \mu m$ , avec crochets et réaction positive à l'iode.

Spores largement elliptiques, hyalines,  $13-15 \times 7-8 \mu m$ , lisses avec une guttule polaire. Paraphyses minces, cloisonnées, avec des guttules, à peine élargies à l'apex. Cette Peziza est décrite sur la base de deux découvertes de Suisse.

Litterature: Van Vooren, Stöckli & Moyne 2017. ascomycete.org, 9(7): 259-265.

Remarque: *Peziza merdae* Donadini se rencontre aux mêmes endroits. Ses fructifications sont blanchâtres à l'état jeune, puis brunes, les spores sont elliptiques, légèrement ponctuées et moniliformes; les paraphyses ont une forme de crosse.

**Pseudombrophila petrakii** (Sacc.) Brummelen

Fructifications de 3-12 mm, sphériques à l'état jeune, puis étalées, patelliformes, à stipe court. Leur hyménium est brun clair avec une nuance pourpre, marge remontante, croissant individuellement, en petits groupes ou en grand nombre.

Asques  $175-190 \times 11-12 \, \mu m$ , sans crochet, avec une réaction négative à l'iode.

Spores elliptiques, hyalines,  $11-12.5 \times 6.5-8 \mu m$ , cyanophiles, ornementation ponctuée de manière transversale obliques.

Paraphyses filiformes, avec une granulation à l'apex. C'est la seule espèce avec une telle ornementation de spores.

Littérature: Brummelen J. (van) 1995. Une monographie mondiale du genre Pseudombrophila, IHW-Verlag, Eching.

Remarque: *Pseudombrophila ramosa* (Velen.) Brumm. a été trouvée sur les mêmes stations. Macroscopiquement très similaires, leurs spores sont plus petites et recouvertes d'un fin réseau.



### Ascobolus lignatilis Alb. & Schwein.

Fructifications de 3-11 mm, convexes à marge dentelée, stipitées et jaunes, hyménium brun foncé lorsqu'il est vieux, croissance isolée à grégaire.

Asques  $185-235 \times 15-20 \mu m$ , avec crochets et réaction positive à l'iode dans la paroi des asques.

Spores 17-19 x 8-9,5 µm, violets à bruns, à côtes longitudinales, reliées par des anastomoses, paraphyses filiformes, cloisonnées, partiellement fourchues et légèrement clavées à l'apex. Cette

espèce se trouve en grande abondance sous les dortoirs des Pinsons du Nord.

Littérature: Breitenbach J. 1979. Untersuchung einer aspektbildenden Pilzsukzession auf Vogeldung. Journal of Mycology 45 (1): 15-34.

C'est grâce aux circonstances particulières de cette année que les espèces susmentionnées ont pu être observées dans les pâturages forestiers des Franches-Montagnes de septembre à novembre, période qu'a offert des conditions météorologiques favorables. Les pâturages provoquent une augmentation de la concentration d'azote à certains endroits grâce à l'urine, ce qui, lié à l'humidité, semble favoriser la croissance de ces Ascomycètes. Les chevaux en particulier semblent éviter autant que possible les stations sur un sol dur, car celles-ci impliquent des contacts désagréable avec le sol dur. On peut supposer que de tels endroits ne se rencontrent pas très souvent dans la nature ou sont souvent simplement négligés.











