Zeitschrift: Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

Band: 57 (1995)

Heft: 4

Artikel: Soja : technique culturale et lutte contre les mauvaises herbes

Autor: Irla, Edward

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1084651

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Bons rendements avec peu ou pas d'herbicides

Soja: Technique culturale et lutte contre les mauvaises herbes

Edward Irla, Station fédérale de recherche en économie d'entreprise et en génie rural (FAT), CH-8356 Tänikon

Les fèves de soja, avec leur teneur de quelque 40% en protéines et 20% en huile, servent principalement à l'alimentation du bétail mais également à la fabrication de denrées alimentaires. Avec une surface de 1900 à 2000 ha, la limite fixée par la Confédération a été rapidement atteinte. Les progrès en matière de sélection des variétés et de technique culturale permettent l'obtention de rendements satisfaisants jusqu'à une altitude de 550 mètres. Une technique de culture respectueuse de l'environnement et couronnée de succès implique un travail du sol adapté aux conditions locales, un semis soigné et une lutte mécanique contre les mauvaises herbes.

Le problème le plus souvent évoqué dans la culture de soja est la lutte contre les mauvaises herbes. Dans la pratique, elle se réalise la plupart du temps par un traitement herbicide appliqué à deux reprises. Les méthodes de lutte mécanique sans herbicides ou combinée avec une utilisation restreinte d'herbicides constituent une alternative intéressante. L'utilisation d'une sarcleuse à betteraves améliore l'aération du sol et favorise ainsi l'activité des rhizobiums. L'essai de la FAT a été consacré à des méthodes exclusivement mécaniques ainsi qu'en combinaison avec un traitement en bandes, conduisant à une économie de 60 à 100% des quantités de produits phytosanitaires,

ceci dans l'optique des systèmes de productions intégrée et biologique. Les résultats indiqués ici figurent également dans le rapport FAT no 464.

Travail du sol adapté

La production intégrée exige une stratégie de régulation des mauvaises herbes spécifique. Le choix de la méthode de travail adéquate dépend de l'endroit, de l'assolement et des conditions météorologiques. Dans les sols lourds et moyens, le travail de fond du sol doit se faire de préférence lors des périodes estivales chaudes et sèches. Par exemple, les opérations

suivantes suivent la moisson: déchaumage, labour, préparation du lit de semences et semis de la culture dérobée (tab.1). Un déchaumage superficiel provoque la germination des pertes de récolte et des graines de mauvaises herbes. Les mauvaises herbes problématiques peuvent ainsi être mieux combattues que plus tard dans le soja. Les procédés mentionnés et la couverture presque constante du sol ménagent celui-ci, améliorent sa structure, diminuent le délavage des éléments nutritifs ainsi que l'érosion et l'emprise des mauvaises herbes.

Préparation du lit de semences

Afin d'assurer un bon approvisionnement en éléments nutritifs, en eau et en air, la couche arable ne doit pas être compactée au cours des travaux printaniers préparatoires. En regard à la croissance du soja, à l'activité des rhizobiums et à l'utilisation des sarcleuses et herses-étrilles, un sol meuble avec une structure stable moyennement grumeleuse s'avère plus favora-





Fig. 1: Le semis exact monograins du soja avec traitement herbicide en bandes simultané facilite la lutte contre les mauvaises herbes. Un peuplement pratiquement exempt d'adventices après deux passages avec la sarcleuse (à droite).

2 TA 4/95

Tab. 1: Lutte contre les mauvaises herbes dans le soja: données techniques relatives aux essais.

ltinéraire cultural	1992	1993	1994		
Type de sol	Limon faiblement argileux	Sol argileux	Sol sabloneux		
Précédent cultural	Triticale	Blé d'hiver	Blé d'hiver		
Travail du sol et culture dérobée	Labour, hersage Phacélie (19.8.1991)	Labour, hersage, vesces d'été + tournesols (19.8.1992)	Cultivateur, hersage, vesces d'été + tournesols (19.8.1993)		
Traitement de surface ¹⁾	Touchdown 3 l/ha (10.4.)	Roundup 3 I/ha (19.3.)	Labour (13.1.)		
Préparation du lit de semences	Cultivateur, rotovateur	Cultivateur, rotovateur	Herse rotative + rouleau packer		
Semis monograins, variété, précocité	(6.5.) Silvia/précoce	(22.4.), Paradies/très précoce	(4.5.) Maple Arrow/précoce		
Dist. entre les lignes et les graines	45/4 cm (=55 graines/m²)	45/4 cm (= 125 kg/ha à 225 g PMG)	45/4 cm		
Lutte contre les mauvaises herbes:	utilisation des outils				
A. Traitement de surface	2,5 kg/ha Trapan 8.5.	2,5 kg/ha Trapan 22.4.	2,5 kg/ha Trapan 5.5.		
B. Trait. en bandes ²⁾ /sarcl.à socs	3 I/ha Basagrane 5.6. 6.5. / 26.5. und 10.6.	22.4. / 17.5. und 7.6.	4.5. / 31.5. und 27.6.		
C. Trait. en bandes ²⁾ /sarcl. étoile	6.5. / 26.5. und 10.6.	22.4. / 17.5. und 7.6.	4.5. / 31.5. und 27.6.		
D. Herse-étrille	26.5. und 10.6.	17.5. und 27.5.	31.5. und 13.6.		
E. Sarcl. à socs/Herse-étrille	26.5. und 10.6./26.5.	17.5. und 7.6. / 27.5.	31.5. und 27.6. / 13.6.		
Récolte / Humidité des graines %	30.9. / 21,2	20.9. / 22	10.10. / 21,4		

Adventices: Mouron des oiseaux, bourse-à-pasteur, chénopode blanc, pensée des champs, arroche, géranium, agrostide, gaillet gatteron, amarante, lamier, colza, chardon, pied de coq

ble. Pour un lit de semences de 12 cm de profondeur, ferme et régulier dans un sol mi-lourd, un seul passage avec une herse à dents vibrantes et une émotteuse suffit en général après labour. Dans les essais de 1992/93 en sol séchant lentement, par contre, un travail en sous-solage de 15 à 18 cm a été nécessaire. Les restes du précédent cultural et les germes des mauvaises herbes ont tout d'abord été travaillés avec une herse rotative munie d'un rouleau packer à dents.

Semis monograins – mise en place exacte de la semence

Le semis du soja, avec ou sans traitement en bandes, a été effectué au moyen d'un semoir monograins pneumatique à six rangs à une température du sol de 8–10°C (fig.1). En cas d'inoculation avec des rhizobiums, les indications du mode d'emploi doivent être scrupuleusement observées, particulièrement celles relatives au rapport semence-substrat-eau. Les graines de soja humides ont tendance à coller, glissent mal et peuvent provoquer des bourrages et des irrégularités d'ensemencement.

Les 55 graines par m² à 3 – 4 cm de profondeur et 4 cm de distance ont pu être mises en place au moyen de socs à disque pour soja et de socs à disque pour betterave. Pour cela, il faut veiller à une dépression suffisante, à un réglage exact des doigts régulateurs et à une vitesse d'avancement lente correspondant à 3 km/h.

Lutte contre les mauvaises herbes: comparaison des procédés

De la sixième à la huitième semaine suivant le semis, le soja n'est pas compétitif par rapport aux adventices. Afin d'éviter la prolifération tant précoce

Tab. 2: Quantité d'adventices et rendement du soja selon le procédé de lutte contre les mauvaises herbes et l'année d'essai.

Lutte contre les mauvaises herbes	Surface couverte de mauvaises herbes MS kg/a			Rendement *) dt/ha		
	1992	1993	1994	1992	1993	1994
A. Traitement de surface	7,4	5,2	1,5	33,1	16,7	31,9
B. Trait. en bandes/Sarcleuse à socs	2,9	1,8	0,7	34,9	18,4	33,8
C. Trait. en bandes/Sarcleuse étoile	1.5	1,2	0,2	33,2	18,7	35,2
D. Herse-étrille	8,4	7,0	1,6	34,3	13,8	33,6
E. Sarcleuse à socs/Herse-étrille	4,9	3,4	0,5	33,5	17,5	34,6
K. Surface non traitée	11,1	11,3	3,4	-	-	-
PPDS (95%)	5,1	3,5	0,4	1,6	1,8	2,8

^{*)} Teneur en eau

¹⁾ Contre les repousses de colza et les mauvaises herbes précédentes

²⁾ Largeur des bandes 18 cm = 1 kg/ha Trapan au semis

PPDS = Plus petite différence significative (sûre à 95%) En caractères gras: différence assurée statistiquement, comparé à la méthode A

que tardive des mauvaises herbes, une lutte adéquate, adaptée aux conditions locales et entreprise au bon moment, se révèle nécessaire. Lors des essais, le développement des adventices est resté modéré une faible proportion de gaillet gratteron en 1993 (tab. 1). La lutte contre les mauvaises herbes a été fort diverse en fonction du procédé, des conditions météorologiques et de la variété de soja. Les variétés Maple Arrow et Silvia, avec leur taille atteignant 90 à 100 cm, ont un effet inhibiteur plus important à l'encontre des mauvaises herbes que la variété Paradies qui ne dépasse pas 60 à 70 cm.

Traitement de surface. Avec Trapan en prélevée, un effet modeste a été observé contre les adventices (tab.2, ill.6). Un second traitement en 1992 avec Basagrane contre le chénopode blanc, l'arroche et le millet s'est avéré insuffisant. L'effet insatisfaisant du Trapan s'explique par des pertes d'évaporation importantes dues à la chaleur et à la surface desséchée.

Traitement en bandes et sarclage. Le traitement en bandes lors du semis et le sarclage à deux reprises ont donné les meilleurs résultats. La sarcleuse à socs ou étoile a été utilisée alors que

les plantes avaient une taille de 4 – 6 cm et 15 – 30 cm. La profondeur de travail était de 4 – 5 cm et la vitesse de 4,5 – 5,1 km/h (fig.1 et 2). Ainsi, les phénomènes de battance et de croûtage ont pu être évités.

Hersage. Aux stades 1, 2, 3, 4 feuilles du soja, le hersage à une profondeur de 2 – 3 cm et une vitesse de 4 – 5 km/h a permis de contenir efficacement les adventices à germination précoce (fig.4). Contre les mauvaises herbes à racine pivotante et le gaillet, cela n'a pas suffit en 1992/93 particulièrement. En 1993, les plants de soja en terre sèche






Fig. 2: Lutte efficace contre les mauvaises herbes. A gauche et à droite: premier et second passages, largeur de sarclage de 31 cm pour les lames coudées et de 28 cm pour les socs «patte d'oie».





Fig. 3: La sarcleuse étoile avec socs fouilleurs permet d'ameublir et de retourner la terre et de lutter contre les adventices. Un léger buttage des lignes n'a pas eu d'incidences négatives sur le battage avec des plantes bien dressées (à droite). Des pierres en surface ont rendu la récolte plus difficile.

4

étaient facilement endommagés, voire arrachés, même avec une pression modérée des dents.

Combinaison herse-étrille/sarcleuse. Cette combinaison s'est révélée plus efficace que le simple hersage ou le traitement de surface (fig.5). Après un ameublissement avec la sarcleuse à socs, un passage avec la herse-étrille a été effectué, suivi d'un second passage avec la sarcleuse. Lors de la récolte, seuls le chénopode, l'amarante et le gaillet gratteron étaient faiblement représentés.

Rendements identiques ou supérieurs

Les procédés mécaniques ou combinés avec le traitement en bandes montrent une tendance, parfois significative, à des rendements supérieurs à ceux obtenus avec des traitements conventionnels (tab.2, fig.6). Cela provient à l'évidence du fait que le croûtage est évité et que l'amélioration de l'aération et de l'alimentation en eau du sol favorisent l'activité des rhizobiums. Une répartition inégale des précipitations en 1993 et une période sèche ont influencé négativement le rendement en 1993. Un maniement précis et une vitesse modérée lors du battage permettent de limiter les pertes de récolte.

Temps de travail et coûts

Le temps de travail des procédés combinés avec sarclage à deux unités-




Fig. 4: Le hersage n'a été satisfaisant que presqu'uniquement en combinaison avec le sarclage. Une vitesse modérée, une faible pression des dents et un contrôle attentif du travail sont vivement recommandés.

Déroulement de l'essai, sarcleuse et herse-étrille

- Les trois essais en plein champs ont eu lieu à Tänikon, à une altitude de 540 mètres avec des précipitation stannuelles d'environ 1200 mm (tab.1).
- Essais en «blocs» avec quatre répétitions et des parcelles de 81 m^2 (2,7 \times 30 m).
- Herse et sarcleuse portées six rangs avec réglage de précision:
 Sarcleuse à socs 2,7 m avec deux lames coudées et un soc «patte d'oie» de 16 cm de large par rang (Rau).

Sarcleuse étoiles 2,7 m avec socs fouilleurs de 19 cm de large et deux jeux d'étoiles par rang (Haruwy). Herse-étrille 2,8 m avec dents en acier à profil rond, 2,5 cm de distance, roue de soutien et effaceur de trace (Haruwy).

- Herbicides: en prélevée: Trapan (matière active: Pendiméthaline + Linuron). En postlevée (en 1992 seulement): Basagran (matière active: Bentazone). Application avec le pulvérisateur pour parcelles FAT (310 lt/ha) ou par traitement en bandes (200 lt/ha) lors du semis (tab.1).
- Relevés: données de technique de travail, quantités de mauvaises herbes (matière fraîche et matière sèche par m²) les 22.9.92, 6.9.93 et 94, récoltes de parcelles par 15 m² à la main et avec la moissonneuse pour parcelles.



Fig. 5: A gauche: non traité et après traitement de surface (1994).



A droite: peuplement de soja pratiquement exempt de mauvaises herbes avant récolte, après traitement en bandes et deux passages de sarcleuse.

travail dépasse de 4 – 5 h/ha celui nécessaire à la pulvérisation ou au hersage (fig.7).

Le coût des procédés dépend des frais découlant de la location ou de l'achat des machines, des conditions locales et du choix des herbicides. Lorsque les machines sont louées, les procédés de sarclage, avec traitement en bandes ou hersage, sont tout à fait concurrentiels par rapport au traitement de surface. Les coûts inférieurs d'environ Fr. 270.—/ha ne peuvent se réaliser qu'avec des conditions locales particulièrement favorables. Le coût des procédés peuvent se calculer à l'aide des données figurant dans l'illustration 7.

Conclusions

Cet essai, conduit sur trois ans, a montré que le soja pouvait être cultivé avec succès à condition de préparer le sol, choisir la variété, appliquer une technique de semis et maîtriser le développement des adventices en tenant compte des conditions locales. La lutte contre les mauvaises herbes peut se limiter exclusivement à des procédés mécaniques (sarcleuse/herse-étrille) lorsque les conditions culturales et météorologiques sont favorables.

Dans les essais de 1992 à 1994, trois passages avec sarcleuse et herse-étrille se sont avérés nécessaires en mai et juin. Après traitement en bandes, deux passages avec la sarcleuse à socs pour betteraves ou sarcleuse étoile ont cependant suffit (60% d'économie d'herbicides). En terrain lourd avec forte pression des mauvaises herbes. la combinaison traitement en bandes lors du semis et passage à deux reprises avec une sarcleuse à socs ou étoile s'est révélée la méthode la plus sûre. Les phénomènes de battance et de croûtage sont ainsi évités tout en améliorant l'aération et l'alimentation en eau du sol, ce qui influence favorablement le développement du soja. Le coût des procédés combinés se révèle jusqu'à 17% plus favorable que celui d'un double traitement de surface. Le coût trois fois inférieur du simple hersage ne peut être obtenu qu'en cas de faible développement d'adventices. Le soja ne nécessite en général ni traitement fongicide ou insecticide, ni




Fig. 6: Différences quant à la quantité d'adventices et au rendement selon les procédés de lutte contre les mauvaises herbes (moyenne sur trois ans). Rendement de 27,2 dt/ha sans traitement de surface.




Fig. 7: Temps de travail et coûts des procédés de lutte contre les mauvaises herbes avec location du pulvérisateur en bandes, de la sarcleuse et de la herse-étrille (coûts fixes du tracteur et du pulvérisateur non compris). Selon le rapport FAT no 449: tracteur 33 kW (45 CV), pulvérisateur (12 m), herse-étrille (6 m) Fr. 26.—/ha, sarcleuse à socs (2,7 m) Fr. 52.—/ha, pulvérisateur en bandes Fr. 29.—/ha, travail Fr. 22.—/UTh.

épandage d'engrais azotés. Cette culture est donc parfaitement compatible avec les productions intégrée et biologique. Par ailleurs, elle peut être réalisée au moyen de la mécanisation utilisée pour la culture de betteraves ou de céréales.