Zeitschrift: Technique agricole Suisse

Herausgeber: Technique agricole Suisse

Band: 71 (2009)

Heft: 8

Rubrik: AgroSpot

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Épandage de sulfate d'ammonium liquide avec la technique d'injection dans le blé d'automne. (Photos: René Flisch)

Cultan - Procédé de fumure à l'essai

René Flisch*

Dans les sols de nos champs, l'azote des racines est normalement repris sous forme de nitrate de l'eau du sol. Avec les techniques conventionnelles qui épandent l'engrais azoté sous forme d'ammonium ou d'urée, les micro-organismes modifient assez rapidement l'engrais en nitrate. Le nouveau procédé CULTAN (Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition) se base sur le principe ammonium-N en concentration élevée, épandu au moyen d'injecteurs à coutre (cultures à grand espace interligne) ou par injecteurs à roue, et cela près des racines, soit entre 5 et 15 cm de profondeur. On suppose que ces dépôts forment une source de N stable qui reste à long terme à disposition des plantes. Ce procédé compte divers avantages à son actif:

- renfort spécifique de la croissance des racines face au développement des pousses
- * Station de recherches Agroscope ART Reckenholz

- résistance élevée à la verse, au gel et à la sécheresse (vu la croissance dominante des racines)
- amélioration de la résistance aux maladies fongiques pour les céréales
- efficacité de l'azote évaluée à 90 % comparé aux 60 % atteints avec l'épandage conventionnel
- danger de lessivage des nitrates réduit par inhibition de la nitrification
- réduction des coûts en raison d'une fumure N unique.

La dynamique N dans le sol est fortement influencée par les conditions météo, la topographie et le mode de culture. Souvent, les résultats des essais et les expériences faites à l'étranger ne peuvent être appliqués aux conditions suisses. Comme notre pays dispose de peu d'expériences en matière de Cultan et que les avantages précités n'ont pas recu confirmation vu le manque d'essais, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART mène une série de tests en collaboration avec l'agro-entreprise Peter Briner AG, Rickenbach, ZH. Le procédé Cultan est utilisé pour le blé d'automne et le maïs. La technique de la roue-soleil permet d'injecter du sulfate d'ammonium liquide (10 % de N). Le procédé peut être comparé à un épandage «grande surface» avec du salpêtre et des granulés de sulfate d'ammonium en prenant comme base des quantités identiques de N.

Durant les premiers essais en 2008 effectués sur deux parcelles dans le canton de Zurich, aucune différence quant au rendement, à la teneur en protéines, aux prélèvements et à l'efficacité d'azote n'a été constatée, ni dans le blé, ni dans le maïs. Cela a été le cas bien que, dans le blé, l'unique apport élevé en azote ait été fait sitôt après le début de la végétation, ce qui entraîne, par conséquent, un plus fort tallage et un peuplement plus dense qu'avec l'apport d'azote en trois temps de l'épandage conventionnel. Pour le maïs, la minéralisation favorisée par la météo de mai et de juin suite à cet unique apport d'azote du procédé Cultan a causé une fumure excessive irréversible. En considération de l'analyse Nmin au stade 5,6 feuilles, la quantité de N a pu être réduite de 70 à 100 kg, sans pertes de rendement, ce qui a abouti à une teneur nettement plus basse de Nmin dans le sol après la récolte de maïs. Les diverses mesures de Nmin prélevées pendant la végétation ont présenté, au début, des concentrations élevées d'ammonium dans le sol alors qu'avec le Cultan – et après quelques semaines déjà - l'on constatait une hausse de la teneur en nitrate ainsi que des teneurs d'ammonium en baisse. Ce résultat inattendu a démontré que dans ces essais, le dépôt d'ammonium était instable et que ni les avantages pour la plante, ni les avantages écologiques n'ont été atteints, ou alors que partiellement. Des essais répétés montreront si le processus Cultan présente des avantages par rapport à l'épandage traditionnel ou s'il faudra adapter la méthode aux conditions locales, dans la mesure où cela s'avère nécessaire et possible.



Tracteur avec réservoir pour le sulfate d'ammonium. L'engrais liquide est livré par camion citerne.









