

Acknowledgments

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Eclogae Geologicae Helvetiae**

Band (Jahr): **72 (1979)**

Heft 1

PDF erstellt am: **20.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

<i>Polypodorhabdus madingleyensis</i> BLACK: A, G, H	<i>retrocostatum</i> to <i>pallasioides</i> zones
<i>Proculithus charlotteii</i> sp.n.: G	<i>cordatum</i> to <i>densiplicatum</i> zones
<i>Proculithus expansus</i> sp.n.: G, H	<i>levesquei</i> to <i>tenuiserratum</i> zones
<i>Schizosphaerella punctulata</i> DEFLANDRE & DANGEARD: A, G, H	<i>planorbis</i> to <i>cymodoce</i> zones
<i>Sollasites bipolaris</i> ROOD et al.: G	<i>cordatum</i> to <i>densiplicatum</i> zones
<i>Sollasites horticus</i> (STRADNER et al.): G, H	<i>mariae</i> Zone
<i>Sollasites lowei</i> (BUKRY): A, G, H	<i>falciferum</i> to <i>tenuiserratum</i> zones
<i>Staurorhabdus magnus</i> sp.n.: G	<i>mariae</i> to <i>pallasioides</i> zones
<i>Staurorhabdus primulus</i> (ROOD et al.): H	<i>planorbis</i> to <i>cordatum</i> zones
<i>Staurorhabdus quadriarculus</i> (NOËL): A, G, H	<i>spinatum</i> to <i>pectinatus</i> zones
<i>Stephanolithion bigoti</i> DEFLANDRE <i>bigoti</i> ssp.n.: A, G, H	<i>jason</i> to <i>autissiodorensis</i> zones
<i>Stephanolithion bigoti</i> DEFLANDRE <i>maximum</i> ssp.n.: A, G, H	<i>mariae</i> to <i>densiplicatum</i> zones
<i>Stephanolithion carinatum</i> sp.n.: G, H	<i>cordatum</i> to <i>mutabilis</i> zones
<i>Stephanolithion hexum</i> ROOD & BARNARD: A, G, H	<i>zigzag</i> to <i>hudlestoni</i> zones
<i>Stephanolithion speciosum</i> DEFLANDRE <i>speciosum</i> ssp.n.: A, G	<i>sauzei</i> to <i>tenuiserratum</i> zones
<i>Stephanolithion speciosum</i> DEFLANDRE <i>elongatum</i> ssp.n.	<i>retrocostatum</i> Zone
<i>Stradnerlithus asymmetricus</i> (ROOD et al.): A, G, H	<i>sauzei</i> to <i>pectinatus</i> zones
<i>Stradnerlithus bifurcatus</i> NOËL: A	<i>tenuiserratum</i> to <i>eudoxus</i> zones
<i>Stradnerlithus comptus</i> BLACK: A, G, H	<i>athleta</i> to <i>pectinatus</i> zones
<i>Stradnerlithus escovillensis</i> (ROOD & BARNARD): A, G	<i>mariae</i> to <i>cordatum</i> zones
<i>Stradnerlithus octoradiatus</i> sp.n.: A, G, H	<i>athleta</i> to <i>mutabilis</i> zones
<i>Stradnerlithus pauciramosus</i> BLACK: A, G, H	<i>retrocostatum</i> to <i>eudoxus</i> zones
<i>Stradnerlithus rhombicus</i> (STRADNER & ADAMIKER): G	<i>cordatum</i> to <i>eudoxus</i> zones
<i>Stradnerlithus rotatus</i> (ROOD et al.): G	<i>lamberti</i> to <i>cordatum</i> zones
<i>Stradnerlithus sattinii</i> sp.n.: A	<i>mariae</i> to <i>tenuiserratum</i> zones
<i>Tetralithus gothicus</i> DEFLANDRE: A, G, H	<i>semicostatum</i> to <i>pallasioides</i> zones
<i>Tetrapodorhabdus shawensis</i> sp.n.: G	<i>garantiana</i> to <i>cordatum</i> zones
<i>Thoracosphaera deflandrei</i> KAMPTNER: A, G, H	<i>planorbis</i> to <i>pallasioides</i> zones
<i>Thoracosphaera saxea</i> STRADNER: A, G	<i>retrocostatum</i> to <i>tenuiserratum</i> zones
tremaliths: A, G, H	<i>margaritatus</i> to <i>pallasioides</i> zones
<i>Tubirhabdus patulus</i> PRINS: H	<i>semicostatum</i> to <i>tenuiserratum</i> zones
<i>Zeugrhabdotus bussoni</i> (NOËL): A, G, H	<i>bucklandi</i> to <i>pectinatus</i> zones
<i>Zeugrhabdotus erectus</i> (DEFLANDRE): A, G, H	<i>angulata</i> to <i>albani</i> zones
<i>Zeugrhabdotus salillum</i> (NOËL): A, G, H	<i>garantiana</i> to <i>pallasioides</i> zones

Acknowledgments

The author wishes to thank his colleagues at the Institute of Geological Sciences for their help in this work, particularly to Mr. A. Horton in the obtaining of the material and to Miss B.M. Cox in the macrofaunal zonation of it; he also wishes to thank Dr. D. Noël for helpful discussion; Professor P. Allen, FRS, for the use of the facilities of the Sedimentology Research Laboratory, University of Reading; and the British Petroleum Company for a research grant whilst at the Laboratory. He also wishes to record the advice he received from the late Dr. M. Black at an early stage of this work. The DSDP material was supplied through the assistance of the National Science Foundation. This paper is published with the permission of the Director, Institute of Geological Sciences, London, England.

REFERENCES

- AMEZIEUX, J. (1972): *Association de Nannofossiles calcaires du Jurassique d'Aquitaine et du Bassin Parisien (France)*. – Mém. Bur. Rech. géol. min. 77, 143–151.
- BARNARD, T., & HAY, W.W. (1975): *On Jurassic Coccoliths: a tentative zonation of the Jurassic of Southern England and North France*. – *Eclogae geol. Helv.* 67/3, 563–585.