

## II. — Une fonction des côtés.

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **18 (1916)**

Heft 1: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **22.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

on tire

$$a = h \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha + \sin \beta}, \quad b = h \frac{\sin \beta}{\sin \alpha + \sin \beta}$$

et par suite

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \gamma} = h \varphi(\alpha, \beta, \gamma).$$

*Il s'ensuit que*

$$(6) \quad c = (a + b) \cos^2 \frac{\pi - \gamma}{4} (1 \pm \varepsilon),$$

où l'erreur relative  $\varepsilon$  est celle commise sur la fonction  $\varphi$  qu'on vient d'étudier.

En prenant

$$(7) \quad c = (a + b) \cos^2 \frac{\pi - \gamma}{4}$$

on commet une erreur relative qui pour les angles  $\gamma$  supérieurs à  $140^\circ$  n'atteindra pas  $4\%$ , pour les angles supérieurs à  $150^\circ$   $1,8\%$ , pour les angles supérieurs à  $160^\circ$   $0,7\%$ , pour les angles supérieurs à  $170^\circ$   $0,2\%$ , etc.

## II. — Une fonction des côtés.

L'identité

$$3(a^2 + b^2 + c^2) - (a + b + c)^2 = (a - b)^2 + (a - c)^2 + (b - c)^2$$

écrite sous la forme

$$(8) \quad 1 \cong \frac{a^2 + b^2 + c^2}{(a + b + c)^2} = \frac{1}{3} + \frac{(a - b)^2 + (a - c)^2 + (b - c)^2}{3(a + b + c)^2}$$

montre que,  $a, b, c$  étant des quantités positives, dont une ou deux peuvent être nulles, la valeur du rapport

$$(9) \quad \mu = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{a + b + c}$$

est toujours comprise entre  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  et 1, la limite inférieure  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  étant atteinte pour  $a = b = c$  et la limite supérieure 1 étant

atteinte lorsque deux de ces trois quantités deviennent négligeables par rapport à la troisième.

Or, dans le cas plus particulier où  $a, b, c$  sont les trois côtés d'un triangle, la limite supérieure 1 est à remplacer par  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ .

En effet, dans ce cas chacune des trois valeurs  $a, b, c$  est au moins égale à la différence et au plus égale à la somme de deux autres. Soit, pour fixer les idées

$$a \leq b, \quad b - a \leq c \leq b + a;$$

posons

$$c = x, \quad a^2 + b^2 = m, \quad a + b = n,$$

de sorte qu'on ait

$$(10) \quad \mu = \frac{\sqrt{m + x^2}}{n + x}.$$

On a

$$\mu' = \frac{nx - m}{u}, \quad \mu'' = \frac{nx - \mu' u'}{u},$$

avec

$$u = (x + n)^2 \sqrt{m + x^2},$$

de sorte que  $\mu$  présente un minimum unique atteint pour la valeur

$$(11) \quad x = \frac{m}{n} = \frac{a^2 + b^2}{a + b},$$

laquelle est manifestement comprise entre  $b - a$  et  $b + a$ , et la valeur même de ce minimum est

$$(12) \quad y = \sqrt{\frac{m}{m + n^2}} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2 + (a + b)^2}}$$

atteignant bien la valeur  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  pour  $a = b$ .

Lorsque  $x$  décroît de

$$x = \frac{m}{n}, \quad \text{à} \quad x = b - a,$$

$\mu$  croît depuis sa valeur minimum unique (12) jusqu'à la

valeur

$$(13) \quad \mu = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + (b-a)^2}}{2b} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{a}{b} + \left(\frac{a}{b}\right)^2}$$

laquelle, en vertu de  $\frac{a}{b} \leq 1$  est au plus égale à  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ .

Donc :  $a, b, c$  étant les côtés d'un triangle, la valeur du rapport

$$\mu = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{a + b + c}$$

est toujours comprise entre les deux nombres

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = 0,5774 \dots, \quad \text{et} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,7071 \dots$$

On peut l'exprimer sous la forme de l'égalité

$$(14) \quad \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = (A + \theta B)(a + b + c),$$

où  $A$  et  $B$  sont les constantes numériques ayant pour valeurs

$$(15) \quad A = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0,5774 \dots, \quad B = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} = 0,1297 \dots,$$

et où  $\theta$  représente un nombre compris entre 0 et 1.

La limite inférieure  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  (correspondant à  $\theta = 0$ ) est atteinte pour les triangles isocèles; la limite supérieure  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  (correspondant à  $\theta = 1$ ) est atteinte lorsque

$$a = b, \quad c = 0.$$

*Applications.* — On peut en faire bien des applications dont nous n'indiquerons que les suivantes, à titre d'exemples.

I. La relation connue

$$m^2 + n^2 + p^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$$

entre les longueurs  $m, n, p$  des médianes d'un triangle dont les côtés sont  $a, b, c$ , conduit, d'après la proposition pré-

cédente, à la relation

$$(16) \quad \sqrt{m^2 + n^2 + p^2} = \omega(a + b + c),$$

où  $\omega$  est un nombre compris entre

$$\frac{1}{2} = 0,5000 \dots, \quad \text{et} \quad \sqrt{3} = 0,6124 \dots,$$

La longueur de la diagonale  $L$  d'un parallépipède rectangle ayant pour côtés les trois médianes d'un triangle, est donc égale au périmètre  $S$  de ce même triangle multiplié par un coefficient numérique toujours compris entre 0,5000 et 0,6124.

On voit aussi que les seuls triangles rectangles pouvant avoir leurs deux cathètes égales aux longueurs  $L$  et  $S$  rattachées à un même triangle, sont ceux ayant leurs deux angles aigus compris : l'un entre  $26^\circ 30'$  et  $31^\circ 30'$ , l'autre entre  $58^\circ 30'$  et  $63^\circ 30'$ .

II. La résultante de trois vecteurs susceptibles de former un triangle et ayant pour somme scalaire  $S$ , a pour valeur  $\lambda S$ , où  $\lambda$  est un coefficient numérique compris entre 0,5774 ... et 0,7071 ...

III. Etant données trois fonctions

$$f_1(x), \quad f_2(x), \quad f_3(x)$$

positives dans l'intervalle de  $x = a$  à  $x = b$  et telles que dans cet intervalle on ait constamment

$$(17) \quad f_3 - f_1 \leq f_2 \leq f_3 + f_1,$$

on aura

$$(18) \quad \int_a^b dx \sqrt{f_1^2 + f_2^2 + f_3^2} = (A + \theta B) \left[ \int_a^b f_1 dx + \int_a^b f_2 dx + \int_a^b f_3 dx \right],$$

où  $A$  et  $B$  sont les constantes numériques (15) et où  $\theta$  est un nombre compris entre 0 et 1.

IV. Considérons un arc d'une courbe gauche le long duquel, en le parcourant dans une direction déterminée, toutes les trois coordonnées  $x, y, z$  croissent à la fois et de telle

façon que leurs accroissements infiniment petits simultanés sont à chaque instant susceptibles de former un triangle.

*La longueur de l'arc sera égale à la somme des accroissements finis des coordonnées, correspondant au passage d'une extrémité de l'arc à l'autre, multipliée par un coefficient numérique toujours compris entre 0,5774... et 0,7071...*

Lorsque, par exemple, les équations de la courbe sont

$$f(x, y, z) = 0 \quad \varphi(x, y, z) = 0$$

les conditions précédentes qui sont

$$0 \leq dy - dx \leq dz \leq dy + dx$$

(ou bien celles qu'on aurait en intervertissant  $x, y, z$ ), se résument en inégalités suivantes devant être vérifiées pour tous les points de la courbe sur l'arc considéré :

$$(19) \quad 0 \leq \frac{P - T}{T} \leq \frac{Q}{T} \leq \frac{P + T}{T}$$

où

$$(20) \quad P = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial z} & \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} & \frac{\partial \varphi}{\partial x} \end{vmatrix}, \quad Q = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x} & \frac{\partial \varphi}{\partial y} \end{vmatrix}, \quad T = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} & \frac{\partial \varphi}{\partial z} \end{vmatrix}.$$

### III. — Fonctions symétriques des côtés ou des angles.

Soit  $f(x)$  une fonction de  $x$  développable, au voisinage de  $x = 0$ , en séries de puissances

$$(21) \quad a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

chaque coefficient  $a_i$  étant positif ou nul, les deux premiers coefficients  $a_0$  et  $a_1$  pouvant d'ailleurs être réels quelconques.

Partons du fait suivant facile à démontrer : la valeur du rapport

$$(22) \quad \frac{(x + y + z)^p}{x^p + y^p + z^p},$$

où  $x, y, z, p$  sont des quantités positives, est toujours com-