

I.

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **31 (1932)**

Heft 1: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **19.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

SUR CERTAINES CORRESPONDANCES

PAR

Pierre PAPILLON (Prytanée militaire de La Flèche).

1. — Il est utile parfois de revenir sur des sujets connus; à de nouvelles lectures se découvrent certains développements, certaines généralisations primitivement inexplorés: c'est ainsi que ces quelques pages sont nées d'un article fort intéressant de M. P. VINCENSINI, publié dans les *Nouvelles Annales de Mathématiques*, il y a quelque cinq ans, et que, dernièrement, je relisais ¹.

I.

2. — Deux courbes (C) et (C') étant données, respectivement décrites par les points M et M', tout point μ qui divise le segment MM' dans un rapport déterminé a pour lieu géométrique une surface (S _{μ}) d'équations paramétriques

$$\left\{ \begin{array}{l} \xi = \frac{x + ax'}{1 + a}, \\ \eta = \frac{y + ay'}{1 + a}, \\ \zeta = \frac{z + az'}{1 + a}; \end{array} \right. \quad (1)$$

en ces expressions, les fonctions x, y, z du paramètre u sont les

¹ Sur les couples de contours fermés de même longueur et de même surface; 6^{me} série, tome II, pages 199-202, 1927.

coordonnées de M, les fonctions x', y', z' , du paramètre ν , celles de M' et il est enfin posé

$$a = - \frac{\overline{u.m'}}{u.m}.$$

Les équations (1), mises sous les formes

$$\left\{ \begin{array}{l} \xi = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{1+a} x + \frac{2a}{1+a} x' \right], \\ \eta = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots, \\ \zeta = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots, \end{array} \right.$$

montrent que (S_μ) est une *surface de translation*¹ dont les courbes fondamentales sont les transformées de (C) et de (C') dans les homothéties

$$\mathcal{C} \left(0, \frac{a}{1+a} \right)$$

et

$$\mathcal{C}' \left(0, \frac{2a}{1+a} \right);$$

les courbes coordonnées forment donc un réseau conjugué, assertion qu'on vérifie, après avoir calculé les dérivées partielles

$$\begin{aligned} \frac{\partial \xi}{\partial u} &= \frac{1}{1+a} \cdot \frac{dx}{du}, & \frac{\partial \xi}{\partial \nu} &= \frac{a}{1+a} \cdot \frac{dx'}{d\nu}, \\ \vdots & \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots, \\ \vdots & \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots, \end{aligned}$$

et les termes essentiels

$$\left. \begin{array}{l} A \, du \cdot d\nu = \frac{a}{(1+a)^2} (dy \cdot dz' - dz \cdot dy'), \\ B \, du \cdot d\nu = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots, \\ C \, du \cdot d\nu = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots, \end{array} \right\} \quad (2)$$

$$\left. \begin{array}{l} E \, du^2 = \frac{1}{(1+a)^2} (dx^2 + dy^2 + dz^2), \\ F \, du \cdot d\nu = \frac{a}{(1+a)^2} (dx \cdot dx' + dy \cdot dy' + dz \cdot dz'), \\ G \, d\nu^2 = \frac{a^2}{(1+a)^2} (dx'^2 + dy'^2 + dz'^2), \end{array} \right\} \quad (3)$$

¹ Sophus LIE: *Mathematische Annalen*, XIV, p. 332.

par l'identité nullité de l'expression

$$\frac{\partial A}{\partial u} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial v} + \frac{\partial B}{\partial u} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial v} + \frac{\partial C}{\partial u} \cdot \frac{\partial \zeta}{\partial v}$$

proportionnelle à

$$\Sigma (d^2 y \cdot dz' - d^2 z \cdot dy') dx' .$$

3. — *Correspondance par surfaces équivalentes.* — L'expression de l'aire élémentaire sur (S_μ) est

$$d\sigma_\mu = \sqrt{EG - F^2} du dv$$

ou

$$d\sigma_\mu = \frac{|a|}{(1+a)^2} \sqrt{\Sigma (dy \cdot dz' - dz \cdot dy')^2} ;$$

elle est donc la même pour les surfaces nées des points μ et μ' tels que

$$\frac{|a|}{(1+a)^2} = \frac{|a'|}{(1+a')^2}$$

c'est-à-dire, a' différant de a , que

$$a \cdot a' = 1 :$$

ces points sont contraposés pour le milieu du segment MM' .

4. — *Correspondance par arcs équivalents.* — L'expression de l'arc élémentaire sur (S_μ) est telle que

$$ds_\mu^2 = E du^2 + 2F du \cdot dv + G dv^2 ,$$

soit

$$ds_\mu^2 = \frac{1}{(1+a)^2} [(dx^2 + dy^2 + dz^2) + 2a \Sigma dx \cdot dx' + a^2 (dx'^2 + \dots)] .$$

La correspondance précédente ne se poursuit pas en général, les relations

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{(1+a)^2} = \frac{1}{(1+a')^2} , \\ \frac{a}{(1+a)^2} = \frac{a'}{(1+a')^2} , \\ \frac{a^2}{(1+a)^2} = \frac{a'^2}{(1+a')^2} , \end{array} \right. \quad (4)$$

n'étant simultanément réalisées que pour

$$a = a' ;$$

mais si les arcs conjointement décrits par M et M' s'équivalent,

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 = dx'^2 + dy'^2 + dz'^2$$

et les égalités

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1 + a^2}{(1 + a)^2} = \frac{1 + a'^2}{(1 + a')^2} \\ \frac{a}{(1 + a)^2} = \frac{a'}{(1 + a')^2} \end{array} \right. \quad (5)$$

sont simultanément satisfaites quand

$$a \cdot a' = 1 ,$$

c'est-à-dire avec les couples (μ, μ') contraposés pour le milieu du segment MM'.

5. — *Correspondance conservant la courbure totale.* — Etant posé

$$\varrho = \frac{\mathcal{R}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} ,$$

les rayons de courbures principaux \mathcal{R}_1 et \mathcal{R}_2 sont obtenus au moyen de l'équation

$$\varrho^2 \Sigma A \frac{\partial(B, C)}{\partial(u, v)} + \varrho \dots + (A^2 + B^2 + C^2) = 0$$

de sorte que la courbure totale de (S_μ) en μ possède la valeur

$$\frac{\Sigma A \frac{\partial(B, C)}{\partial(u, v)}}{(A^2 + B^2 + C^2)^2} = \frac{a^3}{(1 + a)^6} \mathcal{F}(u, v) = \frac{(1 + a)^2}{a} \mathcal{F}(u, v) ,$$

$$\frac{a^3}{(1 + a)^8}$$

\mathcal{F} étant une fonction qu'il est inutile ici de préciser; cette courbure est la même pour les surfaces nées des points μ et μ' contra-

posés pour le milieu du segment MM' car la relation .

$$\frac{(1 + a)^2}{a} = \frac{(1 + a')^2}{a'}$$

n'est encore vérifiée que si

$$a \cdot a' = 1 .$$

6. — *Conclusion.* — En résumé :

Si deux points M et M' décrivent deux courbes quelconques données, il s'établit entre les points μ et μ' de la droite MM' , contraposés pour le milieu du segment MM' , une correspondance superficielle conservant l'aire et la courbure totale; si, de plus, les arcs simultanément décrits par M et M' ont même mesure, de même ceux que décrivent μ et μ' .

Application. — « Imaginons que M et M' décrivent deux surfaces applicables quelconques (S) et (S'), en restant homologues dans l'application. μ et μ' décrivent alors, d'après ce qui précède, deux surfaces (S_μ) et ($S_{\mu'}$) telles que deux arcs homologues quelconques soient égaux: (S_μ) et ($S_{\mu'}$) sont applicables. A tout couple de surfaces applicables la construction géométrique indiquée ci-dessus en fait donc correspondre une infinité d'autres » (*loc. cit.*).

7. — Prenons deux courbes (C) et (C') fermées et de même longueur l , décrites par M et M' simultanément; la courbe que trace alors μ sur la surface (S_μ) se ferme et sa projection sur le plan xOy limite une aire

$$\int_0^l (\eta d\xi - \xi d\eta) = \frac{1}{(1 + a)^2} \int_0^l \begin{vmatrix} (y dx - x dy) \\ + a(y' dx + y dx' - x' dy - x dy') \\ + a^2(y' dx' - x' dy') \end{vmatrix}$$

en supposant les diverses coordonnées exprimées à l'aide de l'arc de (C), par exemple. Cette aire est la même pour les points μ et μ' dont les paramètres a et a' vérifient précisément les

relations (4); nous les savons incompatibles, a' différant de a . Mais si

$$\int_0^l y dx - x dy = \int_0^l (y' dx' - x' dy') ,$$

c'est-à-dire si les projections de (C) et de (C') sur xOy enferment des surfaces équivalentes, les conditions précédentes font place aux égalités (5), vérifiées pour

$$a \cdot a' = 1 .$$

Ainsi:

Si deux points M et M' décrivent simultanément deux courbes fermées de même longueur et dont les projections sur un plan bordent des surfaces équivalentes, les courbes décrites par les points μ et μ' de la droite MM', contraposés pour le milieu du segment MM', jouissent des mêmes propriétés.

La proposition s'applique particulièrement au cas de la correspondance par arcs équivalents sur des courbes fermées de même longueur; les lieux de μ et de μ' ont, en outre, même longueur.

II.

8. — Plaçons-nous maintenant dans le domaine de la géométrie




Fig 1

plane et soit le point μ transformé du point M' par l'homothétie-rotation de centre M et de rapport complexe r_α (fig. 1); l'égalité vectorielle

$$\vec{M\mu} = r_\alpha \cdot \vec{MM'}$$

(C') s'écrit encore

$$\vec{O\mu} = \vec{OM} + r_\alpha (\vec{OM'} - \vec{OM})$$

et, par suite,

$$\xi + i\eta = (x + iy) + (r \cos \alpha + ir \sin \alpha) [(x' - x) + i(y' - y)]:$$