

# 4. Les variétés caractéristiques des équations de MAXWELL

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **4 (1958)**

Heft 1: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **19.09.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Compte tenu des équations (3. 13), (3. 14), (3. 15), les identités précédentes se réduisent aux équations

$$\begin{aligned} g^{00} \partial_0 Q^0_\alpha &= A^{i\beta}_\alpha \partial_i Q^0_\beta + B^\beta_\alpha Q^0_\beta \\ \partial_0 P^0 &= C^i \partial_i P^0 + (\partial_i C^i - \Gamma^\alpha_{\alpha\beta} C^\beta) P^0 \\ \partial_0 \mathcal{E}^0 &= - \Gamma^\alpha_{\alpha 0} \mathcal{E}^0 \end{aligned}$$

où les  $A^{i\beta}_\alpha$ ,  $B^\beta_\alpha$ ,  $C^\alpha$  sont des fonctions continues. Ces équations sont linéaires et homogènes par rapport aux inconnues  $Q^0_\alpha$ ,  $P^0$ ,  $\mathcal{E}^0$ . Comme  $Q^0_\alpha = P^0 = \mathcal{E}^0 = 0$  sur  $S$ , elles n'admettent pas d'autre solution que la solution identiquement nulle. Il en résulte que si les équations (3. 10), (3. 11), (3. 12) sont vérifiées sur  $S$  par les données de Cauchy  $\mathcal{C}$ , elles sont également vérifiées dans tout le domaine d'espace-temps considéré par la solution des équations du champ.

Le problème de l'intégration des équations du champ consiste finalement dans le choix des données de Cauchy  $\mathcal{C}$  rendant compatibles les équations (3. 10), (3. 11), (3. 12) qui permettent de calculer  $u^\alpha$ ,  $p$ ,  $\delta$ , puis dans l'intégration du système des équations (3. 13), (3. 14), (3. 15) et (3. 6), (3. 7), (3. 8), (3. 9) qui permettent d'étudier l'évolution des champs  $\mathcal{G}$  ( $g_{\alpha\beta}$ ,  $H_{\alpha\beta}$ ,  $\theta$ ,  $u^\alpha$ ,  $p$ ,  $\delta$ ).

## II. ETUDE DES CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUATIONS DE MAXWELL

### 4. Les variétés caractéristiques des équations de MAXWELL.

Dans l'analyse du problème de Cauchy, on met en évidence quatre sortes de variétés exceptionnelles:

- 1) les variétés  $g^{00} = 0$  tangentes aux cônes élémentaires,
- 2) les variétés qui généralisent les fronts d'ondes hydrodynamiques,
- 3) les variétés engendrées par les lignes de courant,
- 4) les variétés  $g^{00} - (1 - \varepsilon\mu) u^0 u^0 = 0$  que nous allons étudier.

Sur les équations (3. 15), on voit que si l'hypersurface  $S$  portant les données de Cauchy est telle que sur  $S$

$$g^{00} - (1 - \varepsilon \mu) u^0 u^0 = 0$$

les dérivées  $\partial_0 H_{0i}$  du champ électromagnétique peuvent être discontinues à la traversée de  $S$ . Il peut exister une infinité de solutions distinctes des équations de MAXWELL correspondant aux mêmes données de Cauchy. La variété  $S$  est une variété caractéristique pour les équations de MAXWELL. Une telle variété sera désignée par  $V_3^M$ .

Dans un système de coordonnées locales arbitraire quelconque, les variétés caractéristiques  $V_3^M$  définies par  $f(x^\alpha) = 0$ , sont les variétés satisfaisant à l'équation

$$(4.1) \quad (g^{\alpha\beta} - (1 - \varepsilon \mu) u^\alpha u^\beta) \partial_\alpha f \partial_\beta f = 0.$$

Ces variétés à la traversée desquelles peuvent se produire des discontinuités des dérivées du champ électromagnétique, constituent l'extension relativiste des fronts d'ondes électromagnétiques classiques. Pour qu'elles aient une signification physique, il faut supposer que les variétés  $V_3^M$  soient orientées dans le temps ou à la rigueur tangentes au cône élémentaire  $ds^2 = 0$  de  $V_4$ . Nous verrons que cette hypothèse est bien en accord avec les exigences de la Physique relativiste. S'il en est ainsi,

$$\Delta_1 f \equiv g^{\alpha\beta} \partial_\alpha f \partial_\beta f = (1 - \varepsilon \mu) (u^\alpha \partial_\alpha f)^2 \leq 0.$$

On en déduit

$$(4.2) \quad \varepsilon \mu \geq 1.$$

Ceci posé, la généralisation de l'hypothèse d'Hugoniot permet d'évaluer ce qui constitue ici la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques considérées. Pour cela, considérons deux surfaces d'ondes voisines  $(V_3^M)_0$  et  $(V_3^M)_\theta$  définies par les équations

$$f(x^\alpha) = 0 \quad f(x^\alpha) = \theta$$

et prenons  $\theta$  pour infiniment petit principal.

La ligne de courant issue du point  $x$  de  $(V_3^M)_0$  coupe  $(V_3^M)_\theta$

en un point défini aux infiniment petits d'ordre supérieur près par  $x + \eta \vec{u}$ ,  $\eta$  étant donné par la relation

$$(4.3) \quad \eta u^\alpha \partial_\alpha f = \theta .$$

Soit  $\vec{n}$  le vecteur normé ( $\vec{n}^2 = -1$ ) normal en  $x$  à la surface d'onde  $(V_3^M)_0$ . Il a pour composantes covariantes en  $x$

$$(4.4) \quad n_\lambda = \frac{\partial_\lambda f}{\sqrt{-g^{\alpha\beta} \partial_\alpha f \partial_\beta f}} .$$

La trajectoire orthogonale des  $V_3^M$  issue de  $x$  coupe  $(V_3^M)_0$  en un point qui, à des infiniment petits d'ordre supérieur près, s'écrit  $x + \eta_1 \vec{n}$ ,  $\eta_1$  étant déterminé par la relation

$$\eta_1 n^\lambda \partial_\lambda f = \theta .$$

On en déduit

$$(4.5) \quad \eta_1 = \frac{\theta}{n^\lambda \partial_\lambda f} = \frac{\theta \sqrt{-g^{\alpha\beta} \partial_\alpha f \partial_\beta f}}{g^{\alpha\beta} \partial_\alpha f \partial_\beta f} = \frac{-\theta}{\sqrt{-g^{\alpha\beta} \partial_\alpha f \partial_\beta f}} .$$

Introduisons le vecteur  $\vec{t} = \eta \vec{u} - \eta_1 \vec{n}$ . En vertu de (4.3) et (4.4), on a

$$\eta (\vec{u} \cdot \vec{n}) = -\eta_1$$

et

$$\vec{t} \cdot \vec{n} = (\eta \vec{u} - \eta_1 \vec{n}) \cdot \vec{n} = \eta (\vec{u} \cdot \vec{n}) + \eta_1 = 0 .$$

Le vecteur  $\vec{t}$  est donc tangent à la surface d'onde. Il est orienté dans le temps car son carré

$$\eta^2 = (\vec{t})^2 = \eta^2 \eta_1^2 - 2 \eta \eta_1 (\vec{u} \cdot \vec{n}) = \eta^2 + \eta_1^2$$

est positif.

Le vecteur  $\eta \vec{u}$  apparaît ainsi comme la somme de deux vecteurs, l'un orthogonal à la surface d'onde et orienté dans l'espace, l'autre tangent à cette surface et orienté dans le temps. La vitesse de propagation  $V$  de l'onde se trouve ainsi définie comme la limite du rapport des modules de ces deux vecteurs, soit

$$V = \lim_{\theta \rightarrow 0} \left| \frac{\eta_1}{\eta_0} \right| .$$

On a ainsi

$$V^2 = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\eta_1^2}{\eta_0^2}$$

soit, en remplaçant  $\eta_1$  et  $\eta_0$  par leurs valeurs

$$V^2 = \frac{1}{\varepsilon \mu}.$$

La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques est donc égale à  $(\varepsilon \mu)^{-\frac{1}{2}}$ . Cette valeur appelle deux remarques. D'abord, elle généralise la valeur obtenue en électromagnétisme classique. De plus, dans nos hypothèses  $\varepsilon \mu \geq 1$ , la vitesse de propagation  $V$  est inférieure à une vitesse limite  $c = 1$ ; cette valeur coïncide avec la valeur de la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide ( $\varepsilon \mu = 1$ ).

## 5. Etude des bicaractéristiques.

L'étude des variétés caractéristiques des équations de MAXWELL fait intervenir le champ de tenseur contravariant symétrique

$$\bar{g}^{\alpha\beta} = g^{\alpha\beta} - (1 - \varepsilon \mu) u^\alpha u^\beta$$

dont la forme quadratique associée représente la forme caractéristique des équations de MAXWELL. Soit  $\bar{g}_{\alpha\beta}$  les coefficients de la forme conjuguée qui a pour expression

$$\bar{g}_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} - \left(1 - \frac{1}{\varepsilon \mu}\right) u_\alpha u_\beta.$$

Nous introduisons la métrique riemannienne dite *métrique associée*

$$d\bar{s}^2 = \bar{g}_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta.$$

Elle est de signature hyperbolique normale comme la métrique d'univers comme on peut le vérifier par un calcul direct en repère propre. Nous désignerons dans la suite par  $\bar{V}_4$  la variété riemannienne définie par la variété différentiable portant l'espace-temps  $V_4$  et munie de la métrique associée  $d\bar{s}^2$ . Nous