

# **Il Monte Generoso e la sua flora micologica (II) : Secondo elenco dei funghi superiori della zona sud alpina del Monto Generoso**

Autor(en): **Riva, Alfredo**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de  
mycologie**

Band (Jahr): **57 (1979)**

Heft 8

PDF erstellt am: **16.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-937333>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ganolettiche. Ecco allora spiegato il perchè di qualche manchevolezza anche in chiare ed esaurienti descrizioni di autori o determinatori di specie fungine.

### **Caso dell'*Amanita eliae* Quélet che si trova nel Montello**

Il Montello (Provincia di Treviso), celebre collina a forma di testuggine che emerge dalla pianura Trevigiana per una lunghezza di circa 13 km, per una larghezza di 6 km e per un'altezza massima di ml. 368, è formato da argille, marne, arenarie e conglomerati calcarei ed era un tempo ricoperto da una rigogliosa, altissima selva di quercie, faggi, castagni, betulle e carpini ma oggi è ridotto a ben poca cosa a motivo delle devastazioni delle due ultime guerre e dei danneggiamenti causati insensatamente dall'uomo.

Nonostante queste gravi mutilazioni, nei suoi boschi rimasti, nei suoi tipici avvallamenti, sotto le sue folte siepi, nei prati, la flora fungina è bene rappresentata e vi si possono trovare delle specie rare e perciò interessanti.

Qui si trova anche l'*Amanita eliae* Quélet. Ogni anno dalla metà di maggio a tutto giugno (a volte anche oltre) non è difficile incontrarla un po' dovunque, particolarmente sotto castagni. Dunque una specie abbastanza comune per questa collina e che mi ha dato modo, in parecchi anni, di esaminarla e studiarla attentamente. La particolarità che ho riscontrato in essa e che la letteratura consultata non riporta è questa: il fungo, dopo una o due ore dalla raccolta emana dalla base del piede un grato odore di frutta matura o di biscotto simile (non uguale) a quello che si riscontra nell'*Amanita excelsa* Fr. L'odore perdura finchè l'esemplare ha l'umidità di vegetazione: nel rinsecchimento lo perde.

Fra le raccolte effettuate dal 1969 al 1977 (una settantina di esemplari) in un solo esemplare dell'annata 1977 non ho percepito il tipico odore riscontrato in tutti gli altri esemplari. Nonostante questa defezione, si potrebbe sostenere che questo carattere olfattivo è costante e ritenerlo come dato valido nella descrizione sistematica della specie, sempre che anche altre raccolte effettuate in località diverse e in altri climi, confermassero la particolarità riscontrata negli esemplari montelliani.

### **Letteratura consultata**

Bresadola, J.: Iconographia Mycologica Vol. XXVII, Suppl. 1. – Gilbert, E.J. (1940): Amanitaceae Fasc. I–II, Milano.

Heim, R. (1957): Les champignons d'Europe, Paris.

Michael/Hennig (1964): Handbuch für Pilzfreunde, Bd. III, Jena.

Parrot, Aimé G. (1960): Amanites du Sud-Ouest de la France, Biarritz.

Kühner, R./Romagnesi, H. (1953): Flore analytique des champignons supérieurs, Paris.

## **Il Monte Generoso e la sua flora micologica (II)**

*Secondo elenco dei funghi superiori della zona sud alpina del Monte Generoso*

Di Alfredo Riva, Via Pusterla 12, 6828 Balerna (agosto 1978)

Con il presente secondo elenco dei macromiceti rinvenuti nella zona protetta del Monte Generoso [1] segnaliamo alcune specie da noi personalmente raccolte e determinate in occasione di uscite di studio nostre o in manifestazioni della Società Micologica Carlo Benzoni di Chiasso. Queste sono state rinvenute nelle selve o nei pascoli delle regioni del Monte Caviano, Dossobello, Baldovana, Cascina di Armirone, Bellavista, e dorsale della Vetta [2].

Si tratta di specie a diffusione abbastanza comune e regolare, sia per ripartizione sul territorio che per comparsa annuale.

Con questa seconda nota i macromiceti raccolti e registrati nella zona del Monte Generoso dal 1863 a tutt'oggi assommano a 301 specie.

## BASIDIOMICETI

### *Boletaceae Chev.*

- Gyroporus castaneus* (Bull. ex Fr.)  
– *cyanescens* (Bull. ex Fr.)  
*Suillus aeruginascens* (Secr.) Snell.  
– *piperatus* (Bull. ex Fr.) O. Kuntze  
*Phylloporus rhodoxanthus* (Schw.) Bres.  
*Xerocomus rubellus* (Krbh.) Mos.  
– *parasiticus* (Bull. ex Fr.) Quél.  
– *subtomentosus* (L. ex Fr.) Quél.  
*Boletus luridus* Fr.  
– *calopus* Fr.  
– *pinicola* Vitt.  
– *aestivalis* Paulet ex Fr.  
*Tylopilus felleus* (Bull. ex Fr.) Karst.  
*Leccinum griseum* (Quél.) Sing.  
– *aurantiacum* (Bull. ex Fr.) S. F. Gray

### *Polyporaceae Fr. em. Sing.*

- Polyporus alveolarius* (D. C.) Bond. e Sing.  
– *ciliatus* Fr.  
– *brumalis*  
– *squamosus* (Huds.) Fr.  
– *varius* Fr.  
*Pleurotus ostreatus* (Jacq. ex Fr.) Kummer

### *Hygrophoraceae Roze*

- Hygrophorus eburneus* (Bull. ex Fr.) Fr.  
*Camarophyllus virgineus* (Wulf. ex Fr.) Karst.  
*Hygrocybe laeta* (Pers. ex Fr.) Karst.  
– *miniata* (Fr.) Kummer

### *Tricholomataceae Roze*

- Gerronema fibula* (Bull. ex Fr.) Sing.  
*Clitocybe nebularis* (Batsch ex Fr.) Kummer  
– *odora* (Bull. ex Fr.) Kummer  
– *inversa* (Scop. ex Fr.) Quél.  
*Tricholoma sulphureum* (Bull. ex Fr.)  
Kummer  
– *columbetta* (Fr.) Kummer  
– *irinum* (Fr.) Kummer  
– *scalpturatum* (Fr.) Quél.  
– *terreum* (Schff. ex Fr.) Kummer

- Melanoleuca evenosa* (sacc.) Konr.  
*Leucopaxillus tricolor* (Peck.) Kühn.  
*Lyophyllum decastes* (Fr.) Sing.  
*Armill. mellea* (Vahl in Fl. Dan. ex Fr.) Karst.  
*Collybia peronata* (Bolt. ex Fr.) Sing.  
– *hariolorum* (D. C. ex Fr.) Quél.  
– *dryophila* (Bull. ex Fr.) Kummer  
– *butyracea* (Bull. ex Fr.) Quél.  
– *maculata* (A. e S. ex Fr.) Quél.  
*Tephrocybe putida* (Fr.)  
*Strobilurus esculentus* (Wulf. ex Fr.) Sing.  
*Flammulina velutipes* (Curt. ex Fr.) Sing.  
*Marasmius wynnei* Bk. e Br.  
*Mycena haematopoda* (Pers. ex Fr.) Kummer  
– *pura* (Pers. ex Fr.) Kummer  
– *inclinata* (Fr.) Quél.  
*Lepista sordida* (Fr.) Sing.  
– *glaucocana* (Bres.) Sing.  
– *nuda* (Bull. ex Fr.) Cooke  
*Clitopilus prunulus* (Scop. ex Fr.) Kummer

### *Rhodophyllaceae Sing.*

- Rhodophyllus nidorosus* (Fr.) Quél.

### *Amanitaceae Roze*

- Amanita crocea* (Quél.) Sing.  
– *fulva* (Schff. ex) Pers.  
– *gemmata* (Fr.) Gill.  
– *verna* Bull.  
– *citrina* (Schff.) S. F. Gray  
– *spissa* (Fr.) Kummer  
*Limacella guttata* (Fr.) Konr. e Maubl.  
*Pluteus atricapillus* (Secr.) Sing.

### *Agaricaceae Fr.*

- Agaricus arvensis* Schff. ex Fr.  
*Lepiota clypeolaria* (Bull. ex Fr.) Kummer

### *Coprinaceae Roze*

- Coprinus comatus* (Müll. in Fl. Dan. ex Fr.)  
S. F. Gray  
– *disseminatus* (Pers. ex Fr.) S. F. Gray  
*Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Quél.  
*Anellaria semiovata* (Sow. ex Fr.) Pears e  
Dennis

### *Bolbitiaceae Sing.*

*Pholiotina blattaria* (Fr.) Fay.

*Bolbitius vitellinus* (Pers.) Fr.

### *Strophariaceae Sing. e Smith.*

*Stropharia coronilla* (Bull. ex Fr.) Quél.

– *rugosoannulata* Farlow ex Murr.

– *aeruginosa* (Curt. ex Fr.) Quél.

*Hypholoma fasciculare* (Huds. ex Fr.)

Kummer

*Pholiota carbonaria* (Fr.) Sing.

*Kuehneromyces mutabilis* (Schff. ex Fr.) Sing.  
e Smith

### *Cortinariaceae Roze*

*Inocybe geophylla* (Sow. ex Fr.) Kummer

*Hebeloma radicosum* (Bull. ex Fr.) Ricken

– *mesophaeum* (Pers. ex Fr.) Quél.

– *sinapizans* (Paulet ex Fr.) Gill.

*Cortinarius violaceus* (L. ex Fr.) Fr.

– *orellanus* (Fr.) Fr.

– *praestans* (Cord.) Gill.

*Cortinarius bolaris* (Pers. ex Fr.) Fr.

– *alboviolaceus* (Pers. ex Fr.) Fr.

– *torvus* (Bull. ex Fr.) Fr.

*Phaeocollybia lugubris* (Fr.) Heim

*Tubaria furfuracea* (Pers. ex Fr.) Gill.

### *Russulaceae Roze*

*Russula nigricans* (Bull.) Fr.

– *foetens* Fr.

– *fellea* Fr.

– *furcata* (Gmelin ex Fr.) F. ss. Schff.

– *vesca* Fr.

– *cyanoxantha* Schff. ex Fr.

– *amoena* Quél.

– *violeipes* Quél.

– *rosacea* Pers. ex S. F. Gray

– *aurata* With.

– *atropurpurea* Krbh.

*Lactarius pergamenus* (Swartz ex Fr.) Fr.

– *necator* (Bull. em. Pers. ex Fr.) Karst.

– *semisanguifluus* Heim et Léclaire

– *uvidus* Fr.

– *chrysorrheus* Fr.

– *blennius* Fr.

– *pallidus* Pers. ex Fr.

### *Cantharellaceae Kühn.-Romagn.*

*Cantharellus cornucopioides* (Fr. ex L.)

Kühn. Romagn.

– *Friesii* Quél.

### *Auriculariaceae Bourdot-Galzin*

*Auricularia auricula Judae* L. Bull.

*Tremella mesenterica* Retz.

### *Gasteromyceti s.l.*

*Lycoperdon perlatum* Pers.

– *pyriforme* Pers.

*Bovista plumbea* Pers.

*Scleroderma aurantium* (L.) ex Pers.

### ASCOMICETI

*Xylosphaera polymorpha* (Pers. ex Mérat)

Dumortier

*Leotia lubrica* Pers.

*Sclerotinia tuberosa* (Hedw.) Fr.

*Rutstroemia echinophila* (Bull. ex Mér.)

v. Höhn

*Tuber mesentericum* Vitt.

– *excavatum* Vitt.

*Morchella esculenta* Pers. ex St. Amans

*Mitrophora semilibera* (DC ex Fr.) Lév.

*Disciotis venosa* (Pers.) Boud.

*Otidea onotica* (Pers.) Fuckel

### Bibliografia

- 1 BSM No 4/1979: Il Monte Generoso e la sua flora micologica I.
- 2 Cartina zona Monte Generoso, 1:75 000, Lugano e Sottoceneri.
- 3 M. Moser: Die Röhrlinge und Blätterpilze, Band II b/2, Imst 1967.  
R. Kühner/H. Romagnesi: Flore analytique des champignons supérieurs. Chanterelles. Parigi 1953.  
H. Bourdot/A. Galzin: Hymenomycetes de France. Parigi 1927.  
A. Pilát: Flora ČSR, Gasteromycetes. Praga 1958.  
M. Moser: Ascomyceten, Band IIa. Imst 1963