

Polyporus umbellatus Fr., Eichhase = Polypore en ombelle, poule des bois = Poliporo umbellato

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de
mycologie**

Band (Jahr): **60 (1982)**

Heft 7

PDF erstellt am: **21.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-937237>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Polyporus umbellatus Fr., Eichhase

= *Grifola umbellata* (Pers. ex Fr.) Donk = *Boletus ramosissimus* Schaeff.

- Fruchtkörper:** Aus einem kurzen, dicken Strunk verzweigen sich zahlreiche gelbbraune bis graubraune Hütchen mit fein angedrückt faserschuppiger Oberfläche und welligem Rand.
- Poren:** weisslich bis cremefarbig, am Stiel oft wellig herablaufend, 1–3 per mm.
- Röhren:** gleichfarbig, nur 2–3 mm lang.
- Fleisch:** weiss, jung saftig und weich, später zähfaserig, trocken hart und brüchig. Geschmack mild, teilweise mit herbem Nachgeschmack.
- Sporen:** zylindrisch, glatt und dünnwandig, hyalin, 8–10 × 2,5–3,5 µm.
- Standort:** Auf Erde, an oder bei Stümpfen von alten Laubbäumen, besonders bei Eichen. Juli–Oktober.
- Bemerkung:** Durch die rundlichen, zentral gestielten Hütchen leicht vom etwas ähnlichen Riesenporling (*Meripilus giganteus* [Fr.] Karst.) und dem Klapperschwamm (*Grifola frondosa* [Fr.] S.F.Gray) zu unterscheiden, welche beide spatelförmige, exzentrisch gestielte Hütchen besitzen. B. Kobler

Polyporus umbellatus Fr., Polypore en ombelle, poule des bois

= *Grifola umbellata* (Pers. ex Fr.) Donk = *Boletus ramosissimus* Schaeff.

- Carpophore:** une souche épaisse et courte se ramifie en multiples rameaux portant chacun un petit chapeau de moins de 3 cm, de teinte brun jaune à brun gris; sa surface est ornée de fines écailles fibrilleuses apprimées; sa marge est ondulée.
- Pores:** blanchâtres à crème, souvent décurrents en alignements onduleux, 1–3 par mm.
- Tubes:** concolores, ne dépassant pas 2–3 mm de longueur.
- Chair:** blanche, tendre et imbue dans la jeunesse, puis fibreuse coriace, enfin dure et friable à l'état sec. Saveur douce, irrégulièrement âpre en arrière-goût.
- Spores:** cylindriques, lisses, à membrane mince, hyalines, 8–10 × 2,5–3,5 µm.
- Habitat:** de juin à octobre, sur le sol ou dans le voisinage de vieilles souches de feuillus, en particulier de chênes.
- Remarque:** cette espèce, dont les chapeaux présentent un stipe central, est facile à distinguer du Polypore géant (*Meripilus giganteus* [Fr.] Karst.), qui lui ressemble un peu, comme aussi du Polypore arborescent (*Grifola frondosa* [Fr.] S.F.Gray): tous deux sont caractérisés par des chapeaux spatulés et stipités latéralement. (Trad.: F. Brunelli)

Polyporus umbellatus Fr., Poliporo umbellato

= *Grifola umbellata* (Pers. ex Fr.) Donk = *Boletus ramosissimus* Schaeff.

- Carpoforo:** da un tozzo ceppo centrale si diramano numerosi piccoli cappelli giallo bruni o grigio bruni, fibroso-squamosi, ondulati al bordo.
- Pori:** da biancastri a color crema, spesso decorrenti sul gambo in modo ondulato, 1–3 per mm.
- Tuboli:** dello stesso colore, lunghi solo 2–3 mm.
- Carne:** bianca, da giovane succosa e tenera, in seguito tenace e fibrosa, nel fungo secco rigida e fragile. Gusto dolce, talvolta con retrogusto acerbo.
- Spore:** cilindriche, lisce, a parete sottile, ialine, 8–10 × 2,5–3,5 µm.
- Habitat:** Terricolo oppure su ceppaie di vecchie latifoglie, specialmente querce, da luglio a ottobre.
- Osservazioni:** I cappellini arrotondati sorretti dal gambo centrale permettono di distinguerlo facilmente dal *Meripilus giganteus* (Fr.) P.Karst. e dal griffone (*Grifola frondosa* [Fr.] S.F.Gray) che hanno entrambi cappelli spatoliformi e gambo eccentrico. (Trad.: G. Lucchini)



Polyporus umbellatus Fr., Eichhase
Foto: O. Hotz, Zürich