

# **Dermocybe sanguinea (Wulf. ex Fr.) Wünsche, Blutroter Hautkopf = Cortinaire couleur de sang**

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **60 (1982)**

Heft 8

PDF erstellt am: **22.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-937241>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## **Dermocybe sanguinea (Wulf. ex Fr.) Wünsche, Blutroter Hautkopf**

- Hut:* halbkugelig, dann stark gewölbt, 2–5 cm breit, mit fein haarig-filziger Oberfläche, dunkel blutrot, in der Mitte manchmal mit zimtbraunem Hauch.
- Lamellen:* dem Hut gleichfarben, bei Sporenreife zimtbraun mit blutrotem Reflex, Schneide rot bleibend, fast entfernt, schwach ausgebuchtet angewachsen.
- Stiel:* ± zylindrisch, dem Hut gleichfarben, gegen Basis oft orangeockerfarben.
- Fleisch:* blutrot, in Stielbasis orangegelblich. Geruch stark rettichartig, Geschmack bitterlich.
- Cortina und Velum:* blutrot.
- Sporen:* kernförmig bis ellipsoid, feinst warzig, 6–7,5 × 4,5 µm, Sporenstaub rostbraun.
- Standort:* in Nadel- und Mischwald, besonders bei *Picea* an feuchten, moosigen Stellen, auch in Moorgebiet.
- Bemerkung:* Dieser ungenießbare Pilz ist gut charakterisiert durch die im ganzen Fruchtkörper vertretene auffallend blutrote Farbe. B. Kobler

## **Dermocybe sanguinea (Wulf. ex Fr.) Wünsche, Cortinaire couleur de sang**

- Chapeau:* hémisphérique, puis nettement convexe, 2–5 cm de diamètre, cuticule finement fibrilleuse-feutrée, rouge sang profond, parfois nuancé de brun cannelle au disque.
- Lames:* concolores au chapeau, évoluant au brun cannelle à reflet rouge sang avec la maturité des spores, l'arête gardant la couleur rouge originale, subespacées, adnées à faiblement échancrées.
- Pied:* plus ou moins cylindrique, concolore au chapeau, souvent ocre orangé vers la base.
- Cortine et voile général:* rouge sang.
- Spores:* en forme d'amande à ellipsoïdes, très finement verruqueuses, 6–7,5 × 4,5 µm, sporée brun rouille.
- Habitat:* bois de feuillus et de conifères, surtout sous épicéas sur sol moussu et humide, aussi en station marécageuse.
- Remarque:* Cette espèce non comestible est bien caractérisée par la couleur rouge sang, très frappante, qui envahit toutes les régions du carpophore. (Trad.: F. Brunelli)

## **Dermocybe sanguinea (Wulf. ex Fr.) Wünsche**

- Cappello:* emisferico, poi fortemente convesso, 2–5 cm di diametro, a superficie finemente pelosa, feltrata, rosso sangue scuro, talvolta con sfumature bruno cannella al centro.
- Lamelle:* concolori al cappello, alla maturazione delle spore bruno cannella con riflessi rosso sangue; l'orlo rimane rosso; quasi rade, debolmente smarginate.
- Gambo:* ± cilindrico, concolore al cappello, verso la base sovente arancio ocraceo.
- Carne:* rosso sangue, in fondo al gambo arancio giallastra. Forte odore rafanoide, gusto amarognolo.
- Cortina e velo:* rosso sangue.
- Spore:* noccioliformi o ellissoidali, finemente verrucose, 6–7,5 × 4,5 µm. Sporata bruno ruggine.
- Habitat:* In boschi di conifere o misti, specialmente sotto peccio in luoghi umidi, muscosi, anche nelle paludi.
- Osservazioni:* Questo fungo non commestibile è ben caratterizzato dai colori rosso sangue presenti in ogni parte del carpoforo. (Trad.: G. Lucchini)



*Dermocybe sanguinea* (Wulf. ex Fr.) Wünsche, Blutroter Hautkopf  
Foto: K. Lauber, Liebefeld