

Cortinarius elegantior Fr., Strohgelber Klumpfuss = Cortinaire jaune paille

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **62 (1984)**

Heft 11

PDF erstellt am: **20.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936143>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Cortinarius elegantior Fr., Strohgelber Klumpfuss

Untergattung: *Phlegmacium*, Fam. *Cortinariaceae*

- Hut:** Gelb, olivgelb bis olivbraun, seltener orangefuchsig, eingewachsen faserig, 4–12 cm Durchmesser. Jung halbkugelig mit eingerolltem Rand, dann ziemlich flach. Scheitel oft mit Velumresten.
- Lamellen:** Strohhocker bis wachsgelb, mässig gedrängt, schwach bis stark ausgebuchtet. Schneide gesägt bis ausgefressen.
- Stiel:** Dick, derb und fest mit meist schräg gerandeter Knolle, volvaartig umsäumt, blass strohgelblich, seidig glänzend. Mycel weiss.
Cortina blass gelbbraunlich, reichlich ausgebildet.
- Fleisch:** Blass gelblich, in Basis vielfach rhabarberötlich (Färbung nicht konstant!). Mit NH₃ rosa färbend. Geruch unbedeutend. Geschmack mild.
- Sporenpulver:** Rotbraun. Sporen: 12–16 × 6–9 µm, zitronenförmig, warzig.
- Standort:** Fichtenwald auf Kalk und Dolomit, bis 1800 m Höhe aufsteigend. Selten auch im Laubwald. Gesellig und relativ häufig.
- Bemerkung:** Diese Art ist essbar. Doch sei Vorsicht am Platze, da die Bestimmung der Phlegmacien dem wenig geübten Pilzfreund Mühe macht! B. Kobler

Cortinarius elegantior Fr., Cortinaire jaune paille

Sous-genre: *Phlegmacium*, Fam. *Cortinariaceae*

- Chapeau:** jaune, jaune olivacé à brun olivacé, plus rarement fauve orangé; fibrilles innées; diamètre 4–12 cm; hémisphérique à marge enroulée dans la jeunesse, assez étalé à l'âge adulte; présence fréquente au disque de vestiges du voile général.
- Lames:** de couleur ocracé paille à jaune de cire; moyennement serrées; faiblement à profondément échancrées; arête serrulée à denticulée.
- Pied:** épais, ferme et robuste; généralement bulbeux marginé obliquement, le rebord simulant une volve; jaunâtre paille pâle, soyeux et brillant; mycélium blanc; cortine abondante, jaune brunâtre pâle.
- Chair:** jaunâtre pâle, souvent d'un rougeâtre rhabarbe à la base (cette coloration est inconstante!); virage au rose par NH₃; odeur insignifiante; saveur douce.
- Sporée:** brun rouge.
- Spores:** 12–16 × 6–9 µm, citriformes, verruqueuses.
- Habitat:** sous épicéas, sur terrain calcaire et dolomitique, jusqu'à 1800 m d'altitude; rarement aussi sous feuillus; relativement fréquent et en troupes.
- Remarque:** espèce comestible; la prudence est néanmoins de rigueur car la détermination sûre des *Phlegmacium* est malaisée pour un amateur peu expérimenté! (Trad.: F. Brunelli)

Cortinarius elegantior Fr.

Sottogenere: *Phlegmacium*, Fam. *Cortinariaceae*

- Cappello:** giallo, giallo oliva fino a oliva bruno, raramente arancio fulvo, con fibrille innate, da 4 a 12 cm di diametro. Giovane semisferico con orlo involuto, in seguito abbastanza piano. Spesso con resti di velo al disco.
- Lamelle:** da ocracé paglierino a giallo cera, moderatamente fitte, da poco a molto smarginate, e con orlo da seghettato a eroso.
- Gambo:** spesso, compatto e duro, in generale con bulbo a margine obliquo, orlato similmente a una volva, giallognolo paglierino pallido. Micelio bianco. Cortina giallo brunastro pallido, molto ben formata.
- Carne:** giallognolo pallido, alla base per lo più rossiccio rabarbaro (colorazione non costante!). Con NH₃ si colora di rosa. Odore insignificante. Sapore mite.
- Polvere sporica:** rosso bruno. Spore 12–16 × 6–9 µm, a forma di limone e verrucose.
- Habitat:** boschi di abete rosso su calcareo e dolomite, fino a 1800 m di altitudine. Raramente anche sotto latifoglie. Gregario e relativamente frequente.
- Osservazioni:** Questa specie è commestibile. Occorre però prudenza, perchè la determinazione dei *Phlegmacium* presenta difficoltà ai non esperti. (Trad.: E. Zenone)

Foto: Eugen Buob, Samstagern

