

**Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quél. var. ferulae  
Lanzi, Kräuterseitling, Fam. Polyporaceae =  
Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quél. var. ferulae  
Lanzi = P. nebrodensis (Inz.) Quél. : pleurote de  
ombellifères, Fam. Polyporaceae ss. lat.**

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de  
mycologie**

Band (Jahr): **63 (1985)**

Heft 5/6

PDF erstellt am: **26.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936880>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quél. var. ferulae Lanzi, Kräuterseitling, Fam. Polyporaceae**

- Hut:** 4–10 cm, fleischig, stumpf gebuckelt, dann niedergedrückt bis leicht trichterig, schmutzig weisslich bis fuchsig bräunlich überhaucht, exzentrisch bis fast zentral gestielt.
- Lamellen:** Weisslich bis strohfalbe, mässig gedrängt, deutlich herablaufend, gegabelt und in Anastomosen auslaufend.
- Stiel:** Weisslich, hartfleischig, wurzelnd. Spitze fast netzig durch Anastomosen.
- Fleisch:** Weisslich, jung zäh-elastisch, Geruch unbedeutend, Geschmack angenehm und mild.
- Sporen:** 10–14×4–5 µm, hyalin mit körnigem Inhalt, Sporenstaub cremeweiss.
- Standort:** Am Wurzelstock von Umbelliferen (Doldenblütlern) der Bergregion wachsend (meist Süd- und Westalpen). September–Oktober.
- Bemerkungen:** Die abgebildete Varietät «ferulae Lanzi» unterscheidet sich vom Typ durch einen kräftigeren Habitus und weniger stark pigmentierten Hut. Die in Südeuropa und Nordafrika auf *Ferula communis* (Steckenkraut) wachsenden Exemplare sind im Aussehen identisch mit den in den Süd- und Westalpen vorkommenden Pilzen, die dann aber auf *Eryngium alpinum* (Mannstreu) oder auf *Laserpitium latifolium* oder *L. siler* (Berglaserkraut) wachsen. B. Kobler

**Pleurotus eryngii (DC ex Fr.) Quél. var. ferulae Lanzi = P. nebrodensis (Inz.) Quél. Pleurote des ombellifères, Fam. Polyporaceae ss. lat.**

- Chapeau:** 4–10 cm, charnu, basement mamelonné puis déprimé à légèrement infundibuliforme, blanchâtre sale à fumé de roux brunâtre.
- Lames:** blanchâtre à couleur de paille, moyennement serrées, nettement décourbées, fourchues et anastomosées.
- Pied:** excentré à presque central, blanchâtre, à chair ferme, radicant. Le haut du stipe présente un aspect presque réticulé, dû aux anastomoses des lames.
- Chair:** blanchâtre, ferme et élastique dans le jeune âge, odeur insignifiante, saveur douce et agréable.
- Sporée:** blanc-creme.
- Spores:** 10–14×4–5 µm, hyalines, à contenu granuleux.
- Habitat:** sur racines mortes d'ombellifères, dans les régions montagneuses (surtout dans les Alpes méridionales et occidentales). Septembre–octobre.
- Remarques:** La variété photographiée ici («ferulae Lanzi») se distingue du type par sa taille plus grande et plus robuste et par un chapeau moins pigmenté. Les carpophores venant sur *Ferula communis* en Europe méridionale et en Afrique du Nord ont le même aspect que les exemplaires décrits ici; cependant, ceux-ci se développent sur les racines en décomposition d'*Eryngium alpinum* (Panicaut) ou de *Laserpitium latifolium* ou *L. siler*. (Trad.: F. Brunelli)

**Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quél., var. ferulae Lanzi, Fam. Polyporaceae**

- Cappello:** 4–10 cm, carnosu, umbone ottuso, ma in seguito da depresso a leggermente imbutiforme, da biancastro sporco a quasi fulvo brunastro.
- Lamelle:** da biancastre a paglia pallido, moderatamente fitte, chiaramente decorrenti, forcate e anastomosate.
- Gambo:** da eccentrico a quasi centrale, biancastro, carne dura, radicante. Alla sommità quasi reticolato per la presenza di anastomosi.
- Carne:** biancastra, giovane elastica-tenace. Odore insignificante, sapore gradevole e amabile.
- Spore:** 10–14×4–5 µm, jaline, a contenuto granuloso. Sporata bianco crema.
- Habitat:** Su rizomi di ombellifere delle zone montane (in prevalenza Alpi meridionali e occidentali).
- Osservazioni:** La varietà «ferulae Lanzi» qui raffigurata si distingue dal tipo perchè è più robusta e ha il cappello meno colorato. Gli esemplari che crescono nell'Europa meridionale e nell'Africa del nord su *Ferula communis*, nell'aspetto sono identici ai funghi che crescono nelle Alpi meridionali e occidentali, i quali però crescono sull'*Eryngium alpinum* e sul *Laserpitium latifolium* e *L. siler*. (Trad.: E. Zenone)



*Pleurotus eryngii* var. *ferulae* (DC. ex Fr.) Quel.

Photo Charles Poluzzi