

**Lactarius alpinus Peck (= alpigenes Kühn. =
kühneri Joss. = luteus ss. Neuh. non Blytt) :
Gebirgsmilchling = Lactarius alpinus Peck (=
alpigenes Kühn. = kühneri Joss. = luteus ss.
Neuh. non Blytt) : lactaire montagnard**

Autor(en): **Kobler, B.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de
mycologie**

Band (Jahr): **66 (1988)**

Heft 9/10

PDF erstellt am: **26.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-936287>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

1. Entre l'observation matinale et l'observation vespérale d'un même jour, aucun carpophore nouveau n'est jamais apparu: ne surgissent-ils de terre que durant la nuit? Est-ce ainsi pour tous les Gastéromycètes?
2. Des mesures ont été effectuées sur 59 sujets. Bon nombre d'entre eux ont été cueillis — par d'autres personnes — en cours d'observation.
 - 2.1 En 24 h, le diamètre de 15 carpophores a passé de 1 à 3 cm (volume multiplié par 28); 14 carp. de 2 à 5 cm ($\times 15$); 4 carp. de 3 à 5 cm ($\times 4,5$); 3 carp. de 3 à 6 cm ($\times 8$); 1 carp. de 3 à 7 cm ($\times 13$).
 - 2.2 Deux carpophores ont été découverts le matin du 1. 9. 1975 et ils ont pu être mesurés pendant les 4 jours suivants. Tableau comparatif:

	1.9.	2.9.	3.9	4.9.	5.9.
A	1 cm ($\times 126$)	5 cm ($\times 2,7$)	7 cm ($\times 5$)	12 cm ($\times 2$)	15 cm
B	2 cm ($\times 3,5$)	3 cm ($\times 7,7$)	6 cm ($\times 3,4$)	9 cm ($\times 3$)	13 cm

La vitesse de croissance, très différente dans le temps pour les deux sujets, montre que les conditions pédologiques sont prépondérantes, pour des conditions météorologiques identiques.

- 2.3 Deux carpophores ont pu être observés jusqu'à maturité: L'exopéridium se lacère au matin du 4^e jour, l'endopéridium le même soir, les spores mûres s'échappent au soir du 5^e jour.
- 2.4 Plus le diamètre initial (moyen) est petit, plus la croissance en 72 heures est importante: diamètre initial 1 cm, $\times 370$ en volume; diamètre initial 2 cm, $\times 83$ en volume et diamètre initial 3 cm, $\times 15$ en volume.


(F. B.)

Lactarius alpinus Peck (= *alpigenes* Kühn. = *kühneri* Joss. = *luteus* ss. Neuh. non Blytt) **Gebirgsmilchling**

- Hut:** 2—4 (6) cm, breit, konvex-genabelt, dann ausgebreitet, vielfach trichterig und oft mit Papille; Rand jung eingerollt, alt zurückgebogen und oft schwach gerippt; Huthaut angewachsen, fein flockig-filzig, trocken, matt, in der Struktur an *Lact. helvus* Fr. erinnernd, orangegelb bis ockerlich, die Huthautbekleidung dunkler als der Untergrund.
- Lamellen:** Gelbocker mit orangem Schein, etwas heller als der Hut, mässig gedrängt mit zahlreichen Lamelletten, am Hutrand oft kurz gegabelt, etwa 3 mm breit, etwas herablaufend.
- Stiel:** Weisslich-ockergelb, heller als der Hut, mehr oder weniger zylindrisch, feinst flockig bereift und bisweilen exzentrisch, bald hohl.
- Fleisch:** Weisslich, Milch weiss, unveränderlich, ziemlich reichlich, zuerst mild, dann mit deutlicher Schärfe, jedoch nicht brennend scharf. Geruch etwas fruchtig.
- Sporen:** 7—9 (10) \times 6—7, μ m, oval bis breit ellipsoid, Ornamentation weit netzig, fein rundwarzig. Ganz amyloid. Sporenpulver weiss.
- Standort:** An feuchten moosig-grasigen Stellen entlang eines Quellbächleins. Unter *Alnus viridis* (Grünerlen). Acquacalda, 1753 m, beim Lukmanierpass, 16. September 1987.
- Bemerkungen:** Dieser eher seltene hübsche, kleine Pilz ist durch seinen an *Clitocybe* erinnernden Habitus, die auffällig orangeockerliche Farbe und den Standort bei Grünerlen (selten auch bei Birken) gut charakterisiert. Erscheint stets subalpin bis alpin.

Foto: Franco Patanè, 8902 Urdorf

Text und Skizzen: B. Kobler



Lactarius alpinus

Epikutis: a. allantoïde, kettenartig angeordnete Hyphenelemente; b. zahlreiche verschiedendicke Laticiferen ($\times 1000$) — c. Sporen ($\times 2000$).

Epicutis: a. hyphes allantoïdes, disposées en chaînes; b. nombreux laticifères de diamètres différents ($\times 1000$); c. spores ($\times 2000$).

Epicutis: a. elementi ifali allantoïdi a catena; b. numerose lattifere di diverso spessore ($\times 1000$); c. spore ($\times 2000$).

Lactarius alpinus Peck (= alpigenes Kühn. = kühneri Joss. = luteus ss. Neuh. nec Blytt) **Lactaire montagnard**

Chapeau: 2—4(6) cm de diamètre, convexe ombiliqué puis étalé, fréquemment cyathiforme à la fin, souvent papillé; marge d'abord enroulée, récurvée avec l'âge, souvent faiblement cannelée; cuticule adnée, finement feutrée floconneuse, sèche, mate, rappelant *L. helvius* par sa structure, jaune orange à ocracée; les flocons sont plus colorés que le fond.



- Lames:* Ocre, jaune à reflet orangé, un peu plus claires que le chapeau, modérément serrées, entremêlées de nombreuses lamellules, souvent courtement fourchues à la marge, larges d'environ 3 mm et un peu décurrentes.
- Pied:* Jaune orangé blanchâtre, plus clair que le chapeau, plus ou moins cylindrique, finement prineux floconneux, parfois excentré, vite creux.
- Chair:* Blanchâtre; lait blanc immuable, assez abondant, d'abord doux puis très âcre mais non brûlant. Odeur un peu fruitée.
- Sporée:* Blanche.
- Spores:* 7—9(10)×6—7 μm, ovales à largement ellipsoïdales; ornementation à fines verrues arrondies reliées en formant un réseau lâche; entièrement amyloïdes.
- Station:* Sur places humides herbeuses moussues de long d'un ruisselet, sous *Alnus viridis*, Acquacalda, 1753 m, près du col du Lukmanier, le 16 septembre 1987.
- Remarques:* Ce joli petit champignon, plutôt rare, est bien caractérisé par son port clitocyboïde, sa remarquable coloration ocre orangé et son écologie — sous aulnes et, plus rarement, sous bouleaux. C'est, de plus, une espèce alpine à subalpine. (n.d.t.: trouvé aussi en Valais, près d'un petit marais à sphaignes, sous *Alnus*, à Champex, 1480 m, le 14 septembre 1985).

Photo: Franco Patanè, 8902 Urdo

(trad.: F. Brunelli)

Texte: B. Koble

Lactarius alpinus Peck (= *alpigenes* Kühn. = *kühneri* Joss. = *luteus* ss. Neuh. non Blytt)

- Cappello:* Largo da 2—4(6) cm, convesso-ombelicato, poi espanso e sovente imbutiforme, spesso con papilla, orlo giovane involuto, vecchio riflesso e spesso debolmente costolato, cuti cola adnata, finemente fioccosa feltrata, asciutta, opaca, la sua struttura ricorda *Lact helvus* Fr., da arancio giallo a ocraceo, il rivestimento della cuticola è più scuro del sottofondo.
- Lamelle:* Giallo ocre con riflessi arancio, un poco più chiare del cappello, moderatamente fitte, con numerose lamellule, spesso brevemente forcato all'orlo del cappello, larghe circa 3 mm, un poco decorrenti.
- Gambo:* Biancastro-ocra giallo, più chiaro del cappello, più o meno cilindrico, molto finemente fioccoso prinoso e talvolta eccentrico, diventa rapidamente cavo.
- Carne:* Biancastra, lattice bianco immutabile, piuttosto abbondante, dapprima mite poi chiaramente acre, ma non acre bruciante. Odore leggero di frutta.
- Spore:* 7—9(10)×6—7 μm, da ovali a largamente ellissoidi, ornamentazione a largo reticolo, con fini verruche sferiche. Completamente amiloidi. Sporata bianca.
- Habitat:* In posti muschiosi-erbosi umidi lungo un ruscelletto di sorgente. Sotto *Alnus viridis* (ontano verde). Acquacalda, 1753 m, passo del Lucomagno, 16 settembre 1987.
- Osservazioni:* Questo bel funghetto, piuttosto raro, è ben caratterizzato dal portamento che ricorda le Clitocibi, dal colore appariscente arancio ocre e dall'habitat vicino a *Alnus viridis* (raramente anche presso betulle). E' da subalpino a alpino.

Foto: Franco Patanè, 8902 Urdorf

(trad.: E. Zenone)

Testo e schizzi: B. Kobler