

Objektyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Naturwissenschaftlicher Anzeiger der Allgemeinen
Schweizerischen Gesellschaft für die Gesamten
Naturwissenschaften**

Band (Jahr): **4 (1820)**

Heft 7

PDF erstellt am: **16.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

NATURWISSENSCHAFTLICHER ANZEIGER

der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten
Naturwissenschaften.

Den 1. Jenner

No. 7.



*Synopsis Hieraciorum in Helvetia sponte
nascentium.*

Autore J. Gaudin, V. D. M.

(Beschluss.)

** *Caulis foliosus.*

40. *HIERACIUM hyoseridifolium* Vill. —
H. caule folioso unifloro apice incrassato, fo-
liis petiolatis runcinatis glabriusculis, calyce
imbricato hirsuto.

Vill. voy. 11. (obiter.) Catal. H. Argent.
p. 186. in not. Vill. in not. amat. scient. nat. 1.
p. 70. tab. 2. (mediocr.) Zollik. ic. lithogr.
ined. Pers. syn. 2. p. 370. Poir. enc. suppl. 2.
p. 365. (inter minus cognita.)

Species nova, insignis ab omnibus distinctis-
sima. *Radix* atrofusca, crassa, brevis, truncata,
obliqua, fibris crassis, rectis, simplicibus lon-
gisque stipata. *Caulis* 2-3 uncialis, teres, in-
terne tenuis glaberque, superne sensim incras-
satus, strictus, lanuginoso-pubescens pilisque
longissimis obsitus, foliosus, uniflorus. *Folia*
omnia petiolata, laete virentia, fere usque ad
costam pinnatifido-runcinata, caulis longitudi-
nem aequantia v. superantia, laciniis utrin-
que 3-5, scapo retroversis, subinde acutis,
saepius rotundatis, obtusissimis, integris v.
sursum denticulatis, lobo terminali integro v.
trilobo ceteris majore. *Petioli* albi, subulati,
semunciales et ultra, subinde pilis longis, gra-
cilibus, albis (ut et foliorum lacinae costae-
que) ciliati. *Pili* totius herbae perinde graci-
les et omnino edentuli. *Flos* terminalis, fla-
vus, maximus, diametro saltem sexunciali.
Calix imbricatus: phylla 3-4 ordinum valde

Alter Jahrg.

inaequalia, late lanceolata, pilis rufis hirsutis-
sima, atro-liventia, margine membranacea.
Flosculi 2-3 lineas lati. *Semina* brevissima,
angulata, fere ovalia, dilute castanea. *Pappus*
copiosus, lacteus, basi tamen subsordidus (ut
fortasse haecce species ad sectionem priorem
referenda sit), tenuissime remoteque denticu-
latus. (D. S.)

Hab. in M. Hohen-Mesmer pagi Abba-
tiscellani, ubi Cl. ZOLLIKERUS primus om-
nium detexit, qui mihi specimina optima ico-
nemque suam humanissime suppeditavit. — Fl.
Julio et Augusto 24.

41. *HIERACIUM prunellaefolium* Gouan. —
H. caule decumbente ramoso paucifloro, foliis
subcordatis ovatis petiolisque dentatis.

Hall. helv. 42. Catal. rar. n. 981. — Gouan
illustr. 57. tab. 22. fig. 3. (optima.) H. *brunel-
laefolium* Ser. Cichor. n. 20. (Spec. in M.
Ventoux Galloprovinciae lectum, a nostro fo-
liis facie calyceque tomentosum paululum dif-
fert.) — H. *pumilum* (non Hoppe) Sut. fl.
helv. 2. p. 137.

42. *HIERACIUM succisaefolium* Allion. —
H. caule anguloso apice paniculato, foliis lan-
ceolatis obsolete dentatis pilosiusculis semiam-
plexicaulibus: radicalibus oblongis petiolatis.

Hall. helv. 47. Ser. Cichor. n. 14. Allion.
pedem. n. 747. — H. *molle* Smith brit. 832.
(descr. aptissima). H. *integrifolium* Hoppe
in Sturm fl. germ. fasc. 39. (et exs. Cent. 3.
auct. Cl. CANDOLLO).

43. *HIERACIUM blattarioides* L. — H. fo-
liis lanceolatis sagittato-amplexicaulibus: auri-
culis acuminatis, pedunculis axillaribus solita-
riis unifloris, calyce exteriori maximo laxo.