Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Acta Tropica**

Band (Jahr): **33 (1976)**

Heft 3

PDF erstellt am: **22.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

le traitement moderne de l'amibiase

FLAGYL

(métronidazole - 8823 R.P.)

amœbicide diffusible, et de contact, d'action rapide et puissante par voie buccale, sans contre-indications.

dysenterie amibienne

amibiase hépatique

une proportion éloquente de guérisons cliniques, rectoscopiques et parasitologiques.

une efficacité pratiquement constante à bref délai.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

- **Doses journalières :**
  - **Adultes :** 1,50 g (soit 6 comprimés) } en **3 ou 4 prises**
  - **Enfants :** 40 mg par kg de poids }
- **Durée du traitement :**
  5 à 7 jours consécutifs, quelle que soit la localisation clinique.
- **N.B. :** Le traitement par le **Flagyl** de l'amibiase hépatique à la phase suppurative doit évidemment être effectué conjointement à l'évacuation du pus de l'abcès ou des abcès.

PRÉSENTATIONS

Comprimés dosés à 250 mg (flacons de 20)

Suspension buvable dosée à 4 p. 100 de benzoyl-métronidazole (flacons de 120 ml). 1 cuillerée à café contient l'**équivalent de 125 mg** de métronidazole.

SPECIA
RHÔNE-POULENC

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE - **S.P.E.C.I.A.** - *S.A.*
CAPITAL 18.400.000 FRANCS - R.C. PARIS B 562.071.878
SIÈGE SOCIAL : 21, RUE JEAN-GOUJON 75008 PARIS
DÉPARTEMENT PATHOLOGIE TROPICALE ET PARASITAIRE :
16, RUE CLISSON, 75646 PARIS CEDEX 13 - TÉL. (1) 584.11.33

Annonces et Publicité - Paris

Printed in Switzerland
Druck von Friedrich Reinhardt AG, Basel