Note sur quelques plantes rares pour la flore lausannoise récoltées par. Mr C., dans les environs de Lausanne

Autor(en): **Muret, J.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletins des séances de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles**

Band (Jahr): **7 (1860-1863)**

Heft 48

PDF erstellt am: **16.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-253508

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

J'ai encore pu comparer mon empreinte avec des feuilles de Cycadées provenant du Jurassique supérieur (Kimmeridgien !) de Chanay près Seyssel (Ain) déterminées *Zamia seneonis*, mais ce n'est évidemment pas la même espèce.

Il serait bien à désirer qu'un de nos zélés botanistes voulût bien entreprendre la détermination et la description de tous ces végétaux fossiles, qui me paraissent bien en valoir la peine.

NOTE SUR QUELQUES PLANTES RARES POUR LA FLORE LAUSANNOISE

récoltées par M^r^ C., dans les environs de Lausanne.

M. C., botaniste distingué par son zèle et ses talents autant que par sa modestie, m'a communiqué les plantes qu'il a récoltées dans les environs de Lausanne, dans les dernières années, en y joignant des notes, qui portent essentiellement sur une critique aussi bienveillante qu'ingénieuse du *Guide du botaniste*, au point de vue de l'indication des localités.

J'ai communiqué à M. Rapin les observations de M. C.; il s'en est montré fort reconnaissant et en tirera bon parti pour la seconde édition du *Guide*, qui ne tardera pas à paraître.

J'ai pensé que la Société des sciences naturelles aurait quelque plaisir à connaître les plantes les plus remarquables trouvées par M. C.; j'en fais le sujet d'une communication, qui a fort peu de valeur scientifique, mais qui peut être de quelque intérêt pour ceux qui herborisent dans nos environs.

Torilis nodosa. Gärtn. Chamblande, 8 novembre 1853.
Bromus. Voisin du *squarrosus*. L. Chamblande.
Barkausia setosa. Dec. Monrepos, Chamblande.
Centaurea solstitialis. L. Chamblande, Pierre à Portai. Plaines.
Isatis tinctoria. L. Pierrettes, plaines du Loup, Croisettes.

Ces cinq premières espèces sont de celles qui paraissent de temps en temps, probablement apportées avec des graines étrangères; les deux premières n'ont été vues dans les environs de Lausanne que par M. C.

Blitum virgatum. L. Chauderon, tout à fait accidentelle.
Tanacetum vulgare. L. Plaines du Loup, la Sallaz; spontanéité fort douteuse.
Panicum verticillatum. L. B. Denantou.
Phleum asperum. L. Mousquines.
Dianthus barbatus. L. Bois des grandes Roches, Sauvabelin.

Trifolium elegans. Savi. Talus de la route d'Oron au delà de Rovéréaz.

Helosciadium nodiflorum. Koch. St. Sulpice.

Galium spurium. L., etc., *fruct. glab*. Planches du Mont, parmi le lin.

Asperula arvensis:. L. Pierre à Portai.

Campanula rhomboïdalis. L. Sauvabelin.

Pyrola uniflora. L. Au bord d'un chemin de devestiture qui traverse la forêt à quinze ou vingt minutes au nord-ouest du Chalet à Gobet.

Mentha gentilis. L. Montrion.

Potamogeton heterophyllum. Schreb. Mare près le port aux pierres, Pierrettes.

Carex paradoxa. W. Vidi.

Carex pilosa. Scop. Ravin sur le chemin du Mont à Cugy.

Veronica montana. L. Dans les bois à dix minutes nord-est du Chalet à Gobet.

Les seize espèces qui précèdent n'avaient jusques à aujourd'hui point été reconnues dans les environs de Lausanne ; les espèces suivantes, bien que ayant été déjà signalées, sont rares pour la flore lausannoise.

Epilobium romarinifolium. Hke. Romanel.

Eragrostis megastachya. Lk. Bord d'un sentier entre le Denantou et Pierre à Portai ; ne se trouve plus à Malley.

Eragrostis præoides. P. B. Chauderon. Se trouve encore dans une vigne près des Mousquines.

Aristolochia Clematitis. L. Montoye.

Galega officinalis. L. Vidi, embouchure de la Chamberonne.

Althæa cannabina. L. Haie au-dessous de Belle vue.

Nasturtium sylvestre. R. Br. Au pied de la colline d'Epeney. Y a été vu aussi par M. Rambert.

Barkausia foetida. De C. Colline d'Epeney.

Veronica Buxbaumii. Ten. Mornex, Petit-Château, etc. Cette plante se répand et se multiplie d'année en année davantage dans toute la Suisse.

Juncus acutiflorus. Ehrh. Planches du Mont. Cette plante signalée dans le Jorat il y a plus de trente ans par M. J. Delaharpe, y est assez abondamment répandue.

Carex pilulifera. L. Planches du Mont.

Festuca loliacea? Huds. Au-dessous du pont de la Maladière. Cette plante que j'ai aussi trouvée dans cette localité, pourrait bien n'être qu'une variété de la *F. pratensis*, L.

Ceterach officinarum. Murs au-dessous des Mousquines. Murs de la Vigie.

Scolopendrium. Bois de Vaud.

Polysticum Thelipteris. Pierrettes.
Asplenium Adianthum nigrum. Clochate, Jouxtens.
Polypodium Phægopteris. Chalet à Gobet, Cugy, Froideville.
Blechuum Spicant. Froideville.

J. MURET, Dr en droit.

PARTICULARITÉS D'UN HALO INCOMPLET

le 4 juillet 1860, à 7 heures 5 minutes du matin.

Par Mr J. MARGUET.

Le ciel était parsemé de cirrus très déliés s'épanouissant à l'orient en forme d'un immense éventail dont le soleil était la charnière. Ayant l'habitude de regarder au ciel toutes les fois qu'il est couvert de ces légers tissus d'aiguilles de glace, j'ai vu le phénomène suivant :

A la distance d'environ 44° du soleil brillait un arc de halo formé de deux parties tengentes et ressemblant exactement à la partie médiane d'un S allongé et couché horizontalement. La partie concave de l'arc répondait à plomb au-dessus du centre du soleil. Au point de rencontre de la verticale avec l'arc, on apercevait confusément un arc tangent au premier, mais non coloré. Ce phénomène s'est évanoui vers 7 h. 10 m. et j'ignore à quel moment il a commencé.

Hier, à 3 $^1/_4$ h. de l'après-midi, j'ai vu un magnifique cercle de *halo* autour du soleil et il a été visible jusqu'à 3 $^1/_2$ h. Le ciel vers le zénith était voilé très uniformément par un tissu serré de cirrus. Rarement les couleurs bien connues du halo solaire ont brillé d'un plus vif éclat.

NOTE SUR LA MÉTÉOROLOGIE DE 1860.

Par Mr J. DELAHARPE.

Au mois de février de cette année j'ai eu l'honneur, conjointement avec M. L. Dufour, de présenter à la Société quelques aperçus météorologiques sur l'état de l'atmosphère pendant l'hiver 1859-60 à chaque rupture d'équilibre (voir Bulletin n° 47, p. 348 et 457). La même série de phénomènes s'est reproduite, à quelques variations insignifiantes près, à chaque nouvel orage, durant le cours de 1860; et vous savez, Messieurs, combien ils ont été fréquents. Cette succession de courtes périodes calmes et claires, suivies de longs jours d'orage et de pluie, a duré jusqu'à la fin d'octobre passé. A cette