

II. — Carrés d'Euler.

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **30 (1931)**

Heft 1: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **29.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

doit, dans chacune des rangées du carré, trouver en premier indice et aussi en second, tous les nombres 1 à n .

Le carré satisfaisant à ces conditions est un carré d'Euler.

Le problème ne consiste pas à construire des carrés, fussent-ils nouveaux ou inédits, mais à épuiser toutes les solutions que peut fournir un module donné.

Les considérations précédentes sur les carrés latins permettent de comprendre qu'il a été possible de le résoudre en ce qui concerne les modules premiers.

Ainsi, un carré d'Euler résulte de l'association terme à terme de deux carrés latins convenablement disposés. Il faut que ces *deux carrés composants soient réguliers, les carrés irréguliers ne peuvent pas en produire.*

Tout carré latin régulier peut donner un grand nombre de carrés d'Euler. Essayons d'en construire un avec le carré (α) donné précédemment.

La base de nos carrés d'Euler sera uniformément la suite naturelle 11 . 22 . 33 ... nn ; cela permet de pouvoir les comparer.

Accolons, ou mieux, associons l'unité en second indice aux nombres soulignés dans le carré (α), ce qui donnera

11	2	3	4	5	6	7	8	9
8	9	6	<u>7</u> 1	4	5	2	3	1
3	1	5	2	7	4	9	<u>6</u> 1	8
6	8	4	9	<u>2</u> 1	7	1	5	3
5	<u>3</u> 1	7	1	9	2	8	4	6
4	6	2	8	1	<u>9</u> 1	3	7	5
7	5	9	3	8	1	6	2	<u>4</u> 1
2	4	1	6	3	8	<u>5</u> 1	9	7
9	7	<u>8</u> 1	5	6	3	4	1	2

On remarquera que ces nombres sont tous différents et qu'ils appartiennent à des rangées (lignes ou colonnes) différentes. La condition est nécessaire. Ceci étant, reproduisons dans chaque ligne, en *second indice*, celle du carré latin dans laquelle l'unité occupe précisément le rang du nombre souligné. Nous aurons ainsi

11	22	33	44	55	66	77	88	99
85	93	67	71	49	52	28	34	16
39	17	58	25	76	43	94	61	82
64	86	42	98	21	79	13	57	35
53	31	75	12	97	24	89	46	68
47	65	29	83	18	91	36	72	54
78	59	96	37	84	15	62	23	41
26	48	14	69	32	87	51	95	73
92	74	81	56	63	38	45	19	27

C'est bien un carré d'Euler. Un même carré latin a donné ses deux composants. Cette remarque est importante. Les deux carrés qui constituent un carré eulérien doivent être de *même formation*; il n'est pas nécessaire qu'ils soient identiques. On le comprendra facilement en *substituant* une autre série à celle des seconds indices de la base et en faisant dans le carré les substitutions correspondantes; mais dans ce cas, la base du carré d'Euler sera *différente de la série naturelle*. Pour que le carré eulérien ait cette base, il importe que les deux carrés composants ne diffèrent que par l'ordre de leurs lignes.

Ce procédé de détermination des carrés eulériens, procédé qui consiste à trouver, dans chaque ligne d'un carré latin, le nombre auquel on doit associer l'unité est d'une application difficile, sinon théoriquement impossible, dès que le module dépasse 7. On peut imaginer plusieurs méthodes pour obtenir toutes les solutions que fournit un carré latin; une des plus simples et relativement des plus rapides est celle qui a été incidemment signalée plus haut et que nous ferons connaître brièvement. Soit le carré eulérien ci-après ayant pour carré latin générateur celui construit *par permutations circulaires* sur la série naturelle prise pour base

11	22	33	44	55	66	77	88	99
25	36	47	58	69	71	82	93	14
38	49	51	62	73	84	95	16	27
42	53	64	75	86	97	18	29	31
54	65	76	87	98	19	21	32	43
67	78	89	91	12	23	34	45	56
79	81	92	13	24	35	46	57	68
83	94	15	26	37	48	59	61	72
96	17	28	39	41	52	63	74	85

On remarquera tout d'abord que lorsque, dans la première colonne, les premiers indices sont disposés dans l'ordre naturel, la série des seconds indices de cette colonne suffit pour *déterminer le carré d'Euler sans ambiguïté* et, par suite pour le définir. C'est une convention simple et commode pour désigner un carré d'Euler.

On remarquera aussi que le carré des seconds indices est *semi-diagonal gauche*. Ce caractère est général, on peut le démontrer.

Donc, étant donné un carré latin construit par permutations circulaires dont la base et la première colonne sont disposées dans l'ordre naturel (on observera que cette condition n'est pas indispensable; il suffit pour la facilité des opérations que la base et la première colonne soient disposées dans le même ordre), on produira un carré d'Euler en lui associant terme à terme un carré latin semi-diagonal gauche ayant même base et aussi construit par permutations circulaires.

Un carré latin de module 5 ne peut donner que trois carrés d'Euler; comme ce module possède six carrés latins essentiellement distincts, le nombre des carrés d'Euler du module *ayant pour base la série naturelle*, est de dix-huit. Un carré latin de module 7 donne dix-neuf carrés d'Euler essentiellement distincts. Les 120 carrés essentiellement distincts du module en produisent 2280.

La carré latin de module 9 qui a été étudié donne 225 carrés d'Euler; le module possède 6720 carrés latins essentiellement distincts. La formation étudiée donne donc 1.512.000 carrés d'Euler ayant pour base la série eulérienne naturelle.

Il est clair que le nombre de tous les carrés d'Euler que fournissent ces modules est infiniment plus considérable, si l'on tient compte du fait que leurs bases peuvent être quelconques et qu'il est possible d'effectuer dans leurs rangées toutes les permutations qu'elles comportent.