

Zeitschrift: L'Enseignement Mathématique
Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band: 38 (1939-1940)
Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

Artikel: SUR LE THÉORÈME DE PILATTE
Autor: Thébault, V.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-515789>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

SUR LE THÉORÈME DE PILATTE

PAR

V. THÉBAULT, Le Mans (Sarthe).

Dans un récent article, M. Ervin FELDHEIM a obtenu plusieurs relations concernant des triangles inscrits à un triangle donné et une généralisation pour certains polygones ¹. Les propositions qu'il a signalées ne sont pas nouvelles et la bibliographie de ces questions est assez riche.

Etant donné l'intérêt que présente ce sujet de géométrie élémentaire, nous pensons présenter un travail utile en reprenant des développements déjà publiés ailleurs, pour les réunir et leur apporter quelques compléments.

1. — THÉORÈME I. — *Etant donnés deux polygones (P) et (P') homothétiques, on désigne par (π) un troisième polygone circonscrit au premier et inscrit au second. Sa surface est moyenne proportionnelle entre celles des deux proposés ².*

Soient $A_1 A_2 A_3 \dots A_n$ le polygone (P), $a_1, a_2, \dots, a_n$ les longueurs des côtés $A_1 A_2, A_2 A_3, \dots, A_n A_1$, $A'_1 A'_2 A'_3 \dots A'_n$ le polygone (P'), $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ les distances mutuelles des côtés homologues des deux polygones et, enfin, $B_1 B_2 B_3 \dots B_n$ le polygone (π).

Appelons σ la surface de (π), S celle de (P), (S') celle de (P'). On a la relation d'aires, en grandeur et en signe,

$$\begin{aligned} \sigma = B_1 B_2 B_3 \dots B_n &= A_1 A_2 A_3 \dots A_n + A_1 B_1 A_2 + A_2 B_2 A_3 + \dots \\ &= S + \frac{1}{2} (a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + a_3 \alpha_3 + \dots) . \end{aligned}$$

¹ *L'Enseignement mathématique*, 1938, p. 329-335.

² Ce théorème a été énoncé dans le cas du triangle par PILATTE (*Annales de GERGONNE*, 1811, p. 93), puis étendu aux polygones par L. ANNE (*Nouvelles Annales de Mathématiques*, 1844, p. 27).

Posons

$$a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + a_3 \alpha_3 + a_4 \alpha_4 + \dots = 2 \Delta ,$$

il vient

$$\sigma = S + \Delta . \quad (1)$$

Soient O le centre d'homothétie de (P) et de (P'); $x_1, x_2, x_3, x_4, \dots$, ses distances aux côtés $A_1 A_2, A_2 A_3, A_3 A_4, \dots$, de (P). Ses distances aux côtés homologues de (P') seront

$$x_1 + \alpha_1, x_2 + \alpha_2, x_3 + \alpha_3, x_4 + \alpha_4, \dots ,$$

et on aura

$$\frac{x_1 + \alpha_1}{\alpha_1} = \frac{x_2 + \alpha_2}{\alpha_2} = \frac{x_3 + \alpha_3}{\alpha_3} = \frac{x_4 + \alpha_4}{\alpha_4} = \dots ;$$

d'où

$$\frac{x_1}{\alpha_1} = \frac{x_2}{\alpha_2} = \frac{x_3}{\alpha_3} = \frac{x_4}{\alpha_4} = \dots = \frac{a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + \dots}{a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + a_3 \alpha_3 + \dots} = \frac{2 S}{2 \Delta} = \frac{S}{\Delta} ;$$

d'ailleurs, le rapport d'homothétie de (P') à (P) est

$$\frac{x_1 + \alpha_1}{\alpha_1} = 1 + \frac{x_1}{\alpha_1} = 1 + \frac{\Delta}{S} = \frac{S + \Delta}{S} = \frac{\sigma}{S} ,$$

la dernière égalité résultant de la relation (1).

Le rapport des surfaces étant égal au carré du rapport d'homothétie, on a

$$\frac{S'}{S} = \frac{\sigma^2}{S^2} , \quad \text{ou} \quad S \cdot S' = \sigma^2 . \quad (2)$$

C.Q.F.D.

Pour construire (π) connaissant (P) et (P'), menons par A_1 une droite quelconque rencontrant $A'_1 A'_2$ en B''_1 , $A'_n A'_1$ en B'''_n ; $B''_1 A_2$ coupe $A'_2 A'_3$ en B''_2 , $B''_2 A_3$ coupe $A'_3 A'_4$ en B''_3 , ..., $B''_{n-1} A_n$ coupe $A'_n A'_1$ en B''_n . Les points B''_n et B'''_n forment sur $A'_n A'_1$ deux divisions homographiques dont les points doubles résolvent la question. Le problème admet donc deux solutions.

COROLLAIRE (Théorème de PILATTE). — *Si deux triangles ABC, A' B' C' ont leurs côtés parallèles, et sont l'un inscrit et l'autre circonscrit à un même triangle $A_1 B_1 C_1$, la surface de ce dernier est moyenne proportionnelle entre les surfaces des deux autres.*

Ce théorème, depuis longtemps classique, est employé dans la démonstration habituelle de la formule du volume du tronc de pyramide à bases parallèles triangulaires. Nous avons utilisé le théorème général relatif aux polygones pour obtenir la formule du volume du tronc de pyramide dont les bases sont des polygones de n côtés, sans passer au préalable, comme on le fait dans certains traités de géométrie, par le cas où les bases sont triangulaires ¹.

Remarque. Pour que la relation (2) existe, il n'est pas nécessaire que les triples de points (B_1, A_2, B_2) , ..., soient collinéaires, les points $B_1, B_2, \dots$, pouvant être pris arbitrairement sur les côtés $A'_1A'_2, A'_2A'_3, \dots$, de (P') .

2. — THÉORÈME II. — *Si par les sommets A, B, C d'un triangle ABC on mène des droites $\beta\gamma, \gamma\alpha, \alpha\beta$ rencontrant les côtés $B'C', C'A', A'B'$ d'un triangle $A'B'C'$, de même sens que ABC , sous l'angle θ dans le même sens de rotation et que par A', B', C' on mène les droites $\beta'\gamma', \gamma'\alpha', \alpha'\beta'$ rencontrant BC, CA, AB sous l'angle $\pi - \theta$ dans le même sens de rotation que précédemment, les aires des triangles $\alpha\beta\gamma, \alpha'\beta'\gamma'$ ainsi déterminés satisfont à la relation ²*

$$\text{aire } ABC \cdot \text{aire } \alpha'\beta'\gamma' = \text{aire } A'B'C' \cdot \text{aire } \alpha\beta\gamma .$$

Faisons tourner le système des deux triangles ABC et $\alpha\beta\gamma$ d'un angle θ dans le sens de rotation donné, autour d'un point du plan. Ces triangles prennent les positions nouvelles $A_1B_1C_1, \alpha_1\beta_1\gamma_1$ telles que le triangle $A_1B_1C_1$ a ses côtés parallèles à ceux de $\alpha'\beta'\gamma'$ et que le triangle $\alpha_1\beta_1\gamma_1$ a les siens parallèles à ceux de $A_1B_1C_1$. Inscrivons alors dans le triangle $A_1B_1C_1$ un triangle $A''B''C''$ ayant ses côtés parallèles à ceux de $\alpha_1\beta_1\gamma_1$. Les figures $A_1B_1C_1 A''B''C''$ et $\alpha'\beta'\gamma' A'B'C'$ sont homothétiques, de sorte que

$$\frac{\text{aire } A'B'C'}{\text{aire } \alpha'\beta'\gamma'} = \frac{\text{aire } A''B''C''}{\text{aire } A_1B_1C_1} .$$

¹ V. THÉBAULT, *L'Education mathématique*, 1920, 22^{me} année, p. 129.

² V. THÉBAULT, *Journal de VUIBERT*, 1919, 43^{me} année, 88. — *Annales de la Société scientifique de Bruxelles*, 1921, pp. 152 à 157.

D'autre part, en vertu du corollaire précédent (théorème de PILATTE), nous avons

$$\frac{\text{aire } A''B''C''}{\text{aire } A_1B_1C_1} = \frac{\text{aire } A_1B_1C_1}{\text{aire } \alpha_1\beta_1\gamma_1} = \frac{\text{aire } ABC}{\text{aire } \alpha\beta\gamma}.$$

Par conséquent,

$$\frac{\text{aire } A'B'C'}{\text{aire } \alpha'\beta'\gamma'} = \frac{\text{aire } ABC}{\text{aire } \alpha\beta\gamma}. \quad (3)$$

C.Q.F.D.

CAS PARTICULIERS. — Dans les hypothèses où l'on a $\theta = 0$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$, on peut énoncer les théorèmes suivants:

1. Si par les sommets A, B, C d'un triangle on mène les parallèles $\beta\gamma$, $\gamma\alpha$, $\alpha\beta$ aux côtés $B'C'$, $C'A'$, $A'B'$ d'un triangle $A'B'C'$, de même sens que ABC, et que par A', B', C' on mène les parallèles $\beta'\gamma'$, $\gamma'\alpha'$, $\alpha'\beta'$ aux côtés BC, CA, AB de ABC, les aires des triangles $\alpha\beta\gamma$, $\alpha'\beta'\gamma'$ déterminés satisfont à la relation ¹

$$\text{aire } ABC \cdot \text{aire } \alpha'\beta'\gamma' = \text{aire } A'B'C' \cdot \text{aire } \alpha\beta\gamma. \quad (4)$$

2. Si par les sommets A, B, C d'un triangle on mène les perpendiculaires $\beta\gamma$, $\gamma\alpha$, $\alpha\beta$ aux côtés $B'C'$, $C'A'$, $A'B'$ d'un triangle $A'B'C'$, de même sens que ABC, et que par A', B', C' on mène les perpendiculaires $\beta'\gamma'$, $\gamma'\alpha'$, $\alpha'\gamma'$ aux côtés BC, CA, AB de ABC, les aires des triangles $\alpha\beta\gamma$, $\alpha'\beta'\gamma'$ déterminés satisfont à la relation ²

$$\text{aire } ABC \cdot \text{aire } \alpha'\beta'\gamma' = \text{aire } A'B'C' \cdot \text{aire } \alpha\beta\gamma. \quad (5)$$

Si les droites $A\beta\gamma$, $B\gamma\alpha$, $C\alpha\beta$ concourent en un point P, les points α , β , γ seront confondus en ce point, l'aire du triangle $\alpha\beta\gamma$ est alors nulle, et par suite, il en est de même de l'aire du triangle $\alpha'\beta'\gamma'$, ce qui exige que les droites $A'\beta'\gamma'$, $B'\gamma'\alpha'$, $C'\alpha'\beta'$ soient concourantes. On peut donc énoncer le théorème suivant qui caractérise les triangles *isologues* et plus particulièrement les triangles *métaparallèles* et les triangles *orthologiques* ³:

¹ V. THÉBAULT, *Annales de la Société scientifique de Bruxelles*, 1921, loc. cit. — *L'Education mathématique*, 1921, p. 129. — R. GOORMAGHTIGH, *Mathesis*, 1932, p. 6.

² R. MARCHAY, *Journal de VUIBERT*, 40^{me} année, p. 70.

³ V. THÉBAULT, *Annales de la Société scientifique de Bruxelles*, loc. cit.

Quand deux triangles ABC , $A'B'C'$ sont tels que les obliques menées de A , B , C sous un angle donné θ aux côtés $B'C'$, $C'A'$, $A'B'$ sont concourantes, les obliques menées de A' , B' , C' aux côtés BC , CA , AB sous l'angle $\pi - \theta$ de même sens, sont également concourantes.

Remarques. Le cas où le triangle $A'B'C'$, par exemple, est aplati, mérite un examen particulier.

Les droites $\beta\gamma$, $\gamma\alpha$, $\alpha\beta$ sont alors parallèles sans que, en général, $\beta'\gamma'$, $\gamma'\alpha'$, $\alpha'\beta'$ se coupent en un même point. Ces dernières droites déterminent, par leurs intersections deux à deux, un triangle $\alpha'\beta'\gamma'$ semblable à ABC et, si l'on désigne par λ et μ les angles de la droite $\Delta \equiv (A', B', C')$ avec BC et CA ,

$$\left(\frac{\alpha'\beta'}{AB}\right)^2 = \frac{\text{aire } \alpha'\beta'\gamma'}{\text{aire } ABC} = \left(\frac{ab' \sin \lambda + a'b \sin \mu}{2ABC}\right)^2,$$

a , b , c et a' , b' , c' étant les longueurs des côtés BC , CA , AB et $B'C'$, $C'A'$, $A'B'$ des triangles ABC et $A'B'C'$.

Trois points A' , B' , C' étant donnés en ligne droite, la condition nécessaire et suffisante pour que les droites $\beta'\gamma'$, $\gamma'\alpha'$, $\alpha'\beta'$, issues de A' , B' , C' et coupant les côtés BC , CA , AB du triangle ABC sous le même angle θ , soient concourantes, est que les longueurs des segments rectilignes $B'C'$, $C'A'$, $A'B'$ soient proportionnelles aux projections d'angle $\pi - \theta$, dans le même sens que θ , des côtés BC , CA , AB sur la droite Δ ¹. Dans ce cas, d'ailleurs, si on trace les parallèles à BC , CA , AB des points A' , B' , C' , le triangle $\alpha'\beta'\gamma'$ déterminé est tel que

$$ab' \sin \lambda + a'b \sin \mu = 2ABC,$$

de sorte que

$$\text{aire } \alpha'\beta'\gamma' = \text{aire } ABC. \quad (6)$$

On retrouve ainsi la propriété fondamentale de l'*isopôle* d'une droite Δ , par rapport à un triangle ABC , et ce théorème important dû à J. NEUBERG²:

¹ V. THÉBAULT, *Mathesis*, 1922, p. 410.

² *Wiskundig Tydsskrift*, t. 10, p. 80. — Ce théorème nous a suggéré d'intéressantes propriétés de l'*isopôle* et de l'*orthopôle* d'une transversale Δ par rapport à un triangle ABC , ainsi que du quadrilatère complet (ABC, Δ) . (*Mathesis*, 1934, p. 270 et 397; 1938, p. 236; 1937, p. 183 et 242) (V. T.)

Par les sommets d'un triangle ABC , on mène trois parallèles $A\alpha$, $B\beta$, $C\gamma$ qui rencontrent une transversale quelconque Δ en α , β , γ . Les parallèles aux côtés BC , CA , AB , menées par α , β , γ , forment un triangle $A'B'C'$ égal à ABC .

3. — PROUHET a publié l'analogue du théorème de PILATTE pour deux polyèdres convexes homothétiques, intérieurs l'un à l'autre ¹.

THÉORÈME III. — Soient P et P' deux polyèdres convexes semblables et semblablement placés, le premier intérieur au second. Prenons sur chaque face de P' un point et joignons-le aux sommets de la face homologue du polyèdre P . Nous formerons ainsi un polyèdre Q , à faces triangulaires, inscrit dans le polyèdre P' et circonscrit au polyèdre P . Soit Q' un quatrième polyèdre formé en joignant un point pris sur chaque face de P aux sommets de la face homologue de P' . En désignant par P , P' , Q , Q' les volumes des quatre polyèdres, on aura

$$Q = \sqrt[3]{P^2 P'} , \quad Q' = \sqrt[3]{P P'^2} , \quad (7)$$

d'où l'on déduira

$$QQ' = PP' \quad \text{et} \quad \frac{Q}{Q'} = \sqrt[3]{\frac{P}{P'}} . \quad (8)$$

Une démonstration synthétique de ce théorème a été donnée dans la solution de la question n° 652 (*Nouvelles Annales de Mathématiques*, 1863, p. 368).

En 1913, J. NEUBERG a énoncé un théorème analogue concernant deux tétraèdres $ABCD$, $A'B'C'D'$, intérieurs l'un à l'autre, et ayant les faces homologues parallèles. Si l'on prend dans les faces de $A'B'C'D'$ quatre points quelconques A'' , B'' , C'' , D'' et si on appelle V'' la somme des volumes des tétraèdres $ABCD$, $A''BCD$, $B''CDA$, $C''DAB$, V et V' les volumes $ABCD$, $A'B'C'D'$, on a la relation

$$V'' = \sqrt[3]{V^2 V'} . \quad (9)$$

En intervertissant les rôles des tétraèdres $ABCD$ et $A'B'C'D'$ et appelant V''' la somme des volumes des tétraèdres $A'B'C'D'$,

¹ *Nouvelles Annales de Mathématiques*, 1863, p. 390.

$A'''B'C'D'$, $B'''C'D'A'$, $C'''D'A'B'$, A''' , B''' , C''' , D''' étant des points quelconques dans les faces de ABCD, on a la relation ¹

$$V''' = \sqrt[3]{VV'^2}. \quad (10)$$

Il en résulte que

$$(11) \quad V''V''' = VV' \quad \text{et} \quad \frac{V''}{V'''} = \sqrt[3]{\frac{V}{V'}}. \quad (12)$$

Le géomètre belge a donné de ses relations (9) et (10) une élégante démonstration en utilisant sa formule *nouvelle* ²

$$\frac{V'}{V} = \left(1 - \frac{d_1}{h_1} - \frac{d_2}{h_2} - \frac{d_3}{h_3} - \frac{d_4}{h_4}\right)^3. \quad (13)$$

Dans cette formule, h_1, h_2, h_3, h_4 représentent les longueurs des hauteurs du tétraèdre ABCD, et d_1, d_2, d_3, d_4 sont les distances des plans des faces homologues α et α' , β et β' , γ et γ' , δ et δ' de ABCD, $A'B'C'D'$; la distance d_1 , par exemple, est positive ou négative suivant que A et α' sont ou non du même côté de α .

Remarque. Si $A_1B_1C_1D_1$ est un tétraèdre, de volume V_1 , circonscrit au tétraèdre ABCD et inscrit au tétraèdre $A'B'C'D'$, on peut prendre pour A'' , B'' , C'' , D'' les points A_1 , B_1 , C_1 , D_1 , mais la relation (9) ne permet pas de substituer V_1 à V'' , car $V_1 > V''$.

Les considérations qui précèdent permettent de résoudre facilement le problème suivant:

Par les sommets A, B, C, D d'un tétraèdre ABCD on mène les plans $\Delta_a, \Delta_b, \Delta_c, \Delta_d$ parallèles aux plans $B'C'D'$, $C'D'A'$, $D'A'B'$, $A'B'C'$ des faces d'un tétraèdre $A'B'C'D'$, de même sens que ABCD et par A', B', C', D' on mène les plans $\Delta'_a, \Delta'_b, \Delta'_c, \Delta'_d$ parallèles à ceux des faces BCD, CDA, DAB, ABC du tétraèdre ABCD. Trouver une relation entre les volumes des tétraèdres ABCD, $A'B'C'D'$ et des deux tétraèdres formés par les quadruples de plans $(\Delta_a, \Delta_b, \Delta_c, \Delta_d)$ et $(\Delta'_a, \Delta'_b, \Delta'_c, \Delta'_d)$.

¹ Mathesis, 1914, p. 32 et 1922, p. 242.

² The Tohoku Mathematical Journal, t. IV, n° 3 (1913).