

UN SYSTÈME NON-LINÉAIRE INTÉGRO-DIFFÉRENTIEL DE LA DYNAMIQUE DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES

Autor(en): **Nohel, John A.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **L'Enseignement Mathématique**

Band (Jahr): **12 (1966)**

Heft 3: **L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE**

PDF erstellt am: **27.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-40737>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

UN SYSTÈME NON-LINÉAIRE INTÉGRO-DIFFÉRENTIEL DE LA DYNAMIQUE DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES

par John A. NOHEL *)

Considérons le système

$$(1) \quad u'(t) = - \int_{-\infty}^{\infty} \alpha(x) T(x, t) dx, \quad \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \eta(x) g(u(t)),$$

$-\infty < x < \infty, 0 < t < \infty$, avec les valeurs initiales

$$(2) \quad u(0) = u_0, \quad T(x, 0^+) = f(x) \quad (-\infty < x < \infty).$$

Les fonctions α, η, f, g et la constante u_0 sont données; on cherche les fonctions $u(t), T(x, t)$ définies sur $0 < t < \infty, -\infty < x < \infty$ et satisfaisant (1) et (2).

Nous nous intéressons aux problèmes d'existence globale, d'unicité et de comportement qualitatif des solutions quand $t \rightarrow \infty$. En effet, on peut étudier le système (1), (2) en se servant de la théorie qualitative pour certaines équations du type de Volterra que nous avons déjà exposée [1]. Mais cette théorie n'est pas suffisante pour toute l'analyse; dès lors nous présentons un exposé presque tout à fait indépendant. Cet exposé est basé sur un article [2] que le Professeur Jacob J. Levin et moi avons récemment complété.

Nous supposons que

$$(3) \quad g(u) \in C(-\infty, \infty), \quad ug(u) > 0 \quad (u \neq 0),$$

$$G(u) = \int_0^u g(\sigma) d\sigma \rightarrow \infty \quad (|u| \rightarrow \infty),$$

et

$$(4) \quad \begin{cases} \alpha, \eta, f \in L_2(-\infty, \infty) \\ \eta \text{ satisfasse localement une condition de Hölder;} \end{cases}$$

dans les problèmes nucléaires $g(u) = e^u - 1$.

*) The preparation of this lecture was supported by the Air Force Office of Scientific Research Grant AF - AFOSR - 925 - 65.

Avec $g(u) \in C(-\infty, \infty)$ et (4) on peut préciser le calcul formel suivant et démontrer l'existence d'une solution locale (par rapport à t). Soit $u(t)$, $T(x, t)$ une solution du problème (1), (2) sur $0 \leq t \leq t_0$, $-\infty < x < \infty$, $t_0 > 0$.

La théorie de l'équation de la chaleur et (4) donnent que la fonction

$$(5) \quad T(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t) f(\xi) d\xi + \\ + \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t - \tau) \eta(\xi) g(u(\tau)) d\xi d\tau$$

où

$$K(x, t) = (4\pi t)^{-\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right);$$

satisfait la deuxième équation de (1) et $T(x, 0^+) = f(x)$ en chaque point de continuité de f (et aussi dans L_2). Substituant (5) dans la première équation de (1) on arrive à l'équation:

$$(6) \quad u'(t) = - \int_0^t a(t - \tau) g(u(\tau)) d\tau - b(t) \quad (0 < t \leq t_0),$$

où

$$(7) \quad \begin{cases} a(t) = \int_0^{\infty} \exp(-x^2 t) h_1(x) dx, & b(t) = \int_0^{\infty} \exp(-x^2 t) h_2(x) dx \\ h_1(x) = \operatorname{Re} \hat{\alpha}(-x) \hat{\eta}(x), & h_2(x) = \operatorname{Re} \hat{\alpha}(-x) \hat{f}(x) \end{cases}$$

et $\hat{}$ désigne la transformation de Fourier; évidemment, les fonctions $a(t)$, $b(t)$ sont continues, $0 \leq t < \infty$.

La rigueur du calcul précédent est basée sur le fait (voir par exemple [3]) que (6) a (au moins) une solution $u(t)$ satisfaisant $u(0) = u_0$ et la solution existe sur $0 < t \leq t_0$ pour un $t_0 > 0$; ensuite toutes les opérations précédentes sont réversibles.

On montre facilement (voir [4] pour le cas linéaire) le résultat suivant concernant l'unicité.

Théorème 1.

Si (4) est satisfaite et l'équation (6) a au plus une solution $u(t)$, ($u(0) = u_0$), qui existe sur $0 < t \leq t_0$ pour un $t_0 > 0$, il existe au plus une solution $u(t)$, $T(x, t)$, $0 < t \leq t_0$, $-\infty < x < \infty$, telle que

$$u'(t) \text{ existe sur } 0 < t \leq t_0, \lim_{t \rightarrow 0+} u(t) = u_0,$$

$$T(x, t), T_t(x, t), T_{xx}(x, t) \in C(-\infty < x < \infty, 0 < t \leq t_0),$$

$$T(x, t) \in L_2(-\infty, \infty) \text{ et } \sup_{0 < t \leq t_0} \int_{-\infty}^{\infty} T^2(x, t) dx < \infty,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \int_{-\infty}^{\infty} |T(x, t) - f(x)|^2 dx.$$

Pour le comportement qualitatif, supposons

$$(8) \begin{cases} \text{qu'il existe une fonction } h_3(x), 0 \leq x < \infty \text{ et une constante } \Lambda \text{ telle que} \\ h_2^2(x) \leq h_1(x) h_3(x), h_1(x) \geq 0, h_3(x) \geq 0, \\ \int_0^{\infty} h_1(x) dx > 0, h_3(x) \in L_1(0, \infty), \Lambda > 0 : \\ h_1(x) \xi^2 + 2 h_2(x) \xi + h_3(x) \geq \Lambda [|\hat{\eta}(x)|^2 \xi^2 \\ + 2 \operatorname{Re}(\hat{f}(x) \hat{\eta}(-x) \xi + |(\hat{f}(x)|^2)], \end{cases}$$

et montrons le résultat principal:

Théorème 2.

Si les conditions (3), (4), (8) sont satisfaites, il existe une solution de (1), (2) sur $-\infty < x < \infty$, $0 \leq t < \infty$ et

$$(9) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} u^{(k)}(t) = 0, (k = 0, 1, 2)$$

$$(10) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \sup_{-\infty < x < \infty} |T(x, t)| = 0.$$

Démonstration.

Pour rendre cette démonstration plus facile, supposons aussi

$$\alpha' \in L_2(-\infty, \infty).$$

Quelle que soit la démonstration, le but est premièrement de prolonger la solution locale à l'intervalle $0 \leq t < \infty$ et deuxièmement d'établir (9) et (10). C'est dans la démonstration de (9), que cette démonstration est différente.

Soit $u(t)$ une solution locale de (6) satisfaisant $u(0) = u_0$. Définissons

$$(11) \quad V(t) = G(u(t)) + \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty [h_1(x) \gamma^2(x, t) + 2h_2(x) \gamma(x, t) + h_3(x)] \exp(-2x^2 t) dx,$$

où

$$\gamma(x, t) = \int_0^t g(u(s)) \exp(x^2 s) ds.$$

Alors $V(t)$ est définie sur un intervalle $0 \leq t \leq t_0$ et $V(t) \geq 0$.

Il s'ensuit de (6) et (11) que

$$(12) \quad V'(t) = -\frac{1}{\pi} \int_0^\infty [h_1(x) \gamma^2(x, t) + 2h_2(x) \gamma(x, t) + h_3(x)] x^2 \exp(-2x^2 t) dx,$$

et $V'(t) \leq 0$, $0 \leq t \leq t_0$. Dès lors on a

$$(12^*) \quad V(t) \leq V(0) = G(u_0) + \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty h_3(x) dx,$$

une constante indépendante de t_0 . A l'aide d'un lemme [3, lemma 1.2] il s'ensuit qu'on peut prolonger la solution $u(t)$ de (6) à l'intervalle $0 \leq t < \infty$ et en employant (5) on obtient l'existence d'une solution globale. Bien entendu les formules (11), (12), (12*) sont valables sur $0 \leq t < \infty$; d'ailleurs l'hypothèse (3) et (12*) impliquent qu'il existe une constante $k = k(u_0)$ (indépendante de t_0) telle que

$$(13) \quad |u(t)| \leq k \quad (0 \leq t < \infty).$$

Dès lors on peut aussi montrer qu'il existe une constante k_1 telle que

$$(14) \quad V''(t) \leq k_1 \quad (v \leq t < \infty),$$

où v est un nombre assez grand. Il s'ensuit de $V(t) \geq 0$, $V'(t) \leq 0$ et (14):

$$(15) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} V'(t) = 0.$$

Nous montrons (10) en utilisant l'inégalité (facilement montrée)

$$(16) \quad \sup_{-\infty < x < \infty} T^4(x, t) \leq 4 \int_{-\infty}^{\infty} T^2(x, t) dx \int_{-\infty}^{\infty} T_x^2(x, t) dx.$$

On a de (5)

$$\hat{T}(x, t) = \hat{f}(x) \exp(-x^2 t) + \hat{\eta}(x) \int_0^t g(u(\tau)) \exp[-x^2(t-\tau)] d\tau$$

et

$$\begin{aligned} |\hat{T}(x, t)|^2 &= \{ |\hat{\eta}(x)|^2 \gamma^2(x, t) + 2 \operatorname{Re} \hat{f}(x) \hat{\eta}(-x) \gamma(x, t) \\ &\quad + |\hat{f}(x)|^2 \} \exp(-2x^2 t). \end{aligned}$$

Une comparaison avec (11), les résultats précédents et (8) donnent:

$$\begin{aligned} V(0) &\geq V(t) \geq \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} [h_1(x) \gamma^2(x, t) + h_2(x) \gamma(x, t) + \\ &\quad + h_3(x)] \exp(-2x^2 t) dx \\ &\geq \frac{A}{2\pi} \int_0^{\infty} [|\hat{\eta}(x)|^2 \gamma^2(x, t) + 2 \operatorname{Re} \hat{f}(x) \hat{\eta}(-x) \gamma(x, t) \\ &\quad + |\hat{f}(x)|^2] \exp(-2x^2 t) dx = \frac{A}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{T}(x, t)|^2 dx; \end{aligned}$$

dès lors

$$(17) \quad \int_{-\infty}^{\infty} T^2(x, t) dx \leq \frac{2V(0)}{A}.$$

Un calcul similaire donne

$$(18) \quad \int_{-\infty}^{\infty} T_x^2(x, t) dx \leq -\frac{V'(t)}{A},$$

et on obtient (10) de (15), (16), (17), (18).

Pour montrer (9) on commence avec le cas $k = 1$. Etant donné $\varepsilon > 0$, il existe $X > 0$, tel que

$$\int_X^\infty \alpha^2(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{-X} \alpha^2(x) dx \leq \varepsilon.$$

Employant l'inégalité de Schwarz et (17) on a:

$$\left| \int_X^\infty \alpha(x) T(x, t) dx \right|^2, \quad \left| \int_{-\infty}^{-X} \alpha(x) T(x, t) dx \right|^2 \leq \frac{2}{A} V(0) \varepsilon, \quad (0 \leq t < \infty);$$

et aussi

$$\left| \int_{-X}^X \alpha(x) T(x, t) dx \right| \leq \sup_{-\infty < x < \infty} |T(x, t)| \left\{ 2X \int_{-\infty}^\infty \alpha^2(x) dx \right\}^{1/2}$$

Il s'ensuit de la première équation (1) et de (10) (déjà démontrée) qu'il existe un nombre $t_1 = t_1(\varepsilon)$ tel que

$$|u'(t)| = \left| \int_{-\infty}^\infty \alpha(x) T(x, t) dx \right| \leq 3 \left[\frac{2}{A} V(0) \varepsilon \right]^{1/2} \quad (t_1 \leq t < \infty);$$

c'est ce qui démontre (9) pour $k = 1$.

En employant le théorème de Parseval dans la première équation de (1), on obtient:

$$u'(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \hat{\alpha}(-x) \hat{T}(x, t) dx$$

et en faisant la différentiation et utilisant la formule pour $\hat{T}_t(x, t)$, on obtient

$$(19) \quad u''(t) + \gamma g(u(t)) = \frac{1}{2\pi} I(t) \quad (0 < t < \infty)$$

avec

$$(20) \quad \gamma = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \hat{\eta}(x) \hat{\alpha}(-x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty h_1(x) dx > 0,$$

$$(21) \quad \begin{aligned} I(t) &= \int_{-\infty}^\infty x^2 \hat{\alpha}(-x) \hat{T}(x, t) dx \\ &= -2\pi \int_{-\infty}^\infty \alpha(x) T_{xx}(x, t) dx \quad (0 \leq t < \infty). \end{aligned}$$

L'estimation (18) donne

$$\begin{aligned} I^2(t) &\leq \int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\hat{\alpha}(-x)|^2 dx \int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\hat{T}(x, t)|^2 dx \\ &\leq -\frac{4\pi^2}{A} V'(t) \int_{-\infty}^{\infty} (\alpha'(x))^2 dx, \end{aligned}$$

dès lors (15) et $\alpha' \in L_2$ donnent

$$(22) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 0.$$

Supposons que $u(t) \not\rightarrow 0$ quand $t \rightarrow \infty$. Puisque u est bornée, il existe un nombre $u^* \neq 0$, $|u^*| \leq k$ (k définie par (13)) et une suite $\{t_n\} \rightarrow \infty$ quand $n \rightarrow \infty$ tels que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u(t_n) = u^*.$$

Pour fixer les idées, supposons que $u^* > 0$. Par la formule des accroissements finis et (9, $l=1$), déjà démontrée, on trouve qu'il existe une suite $\Delta_n \rightarrow \infty$ quand $n \rightarrow \infty$ et un nombre entier $N_1 \geq 1$ tels que

$$\frac{1}{2} u^* \leq u(t) \leq k \quad (t_n \leq t < t_n + \Delta_n, \quad n \geq N_1).$$

Définissons

$$\begin{aligned} \mu &= \min_{\frac{1}{2} u^* \leq u \leq k} g(u) > 0, \\ \frac{1}{2} u^* &\leq u \leq k \end{aligned}$$

où l'inégalité suit de l'hypothèse $u^* > 0$ et la condition (3) est satisfaite. On a aussi

$$\gamma g(u(t)) \geq \gamma \mu \quad (t_n \leq t \leq t_n + \Delta_n, \quad n \geq N_1)$$

et, employant (19), (22),

$$u''(t) \leq -\frac{1}{2} \gamma \mu \quad (t_n \leq t \leq t_n + \Delta_n, \quad n \geq N_2),$$

pour un $N_2 \geq N_1$. Faisant l'intégration de cette inégalité on arrive à

$$u'(t_n + \Delta_n) - u'(t_n) \leq -\frac{1}{2} \gamma \mu \Delta_n \quad (n \geq N_2),$$

ce qui n'est pas compatible avec $u'(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow \infty$ et $\Delta_n \rightarrow \infty$ quand $n \rightarrow \infty$; donc, on conclut que $\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = 0$. Employant (19), (22) on

obtient $\lim_{t \rightarrow \infty} u''(t) = 0$, ce qui démontre (9) et le Théorème 2.

Remarquons que le théorème donne des conditions suffisantes pour la stabilité globale (aussi absolue) de la solution équilibre $u(t) \equiv 0, T(x, t) \equiv 0$ de (1). La condition (8) est satisfaite dans plusieurs cas des réacteurs nucléaires, un cas très simple mais important étant $\alpha(x) = k \eta(x)$, $k > 0$ constant.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] LEVIN, J. J. and J. A. NOHEL, Perturbations of a nonlinear Volterra equation. *Mich. Math.*, 12 (1965), 431-447.
- [2] ——— and J. A. NOHEL, A system of nonlinear integro-differential equations, *Mich. Math. J.* 13 (1966), 257-270.
- [3] NOHEL, J. A., Some problems in nonlinear Volterra integral equations. *Bull. Amer. math. Soc.*, 68, (1962), 323-9.
- [4] LEVIN, J. J. and J. A. NOHEL, On a system of integro-differential equations occurring in reactor dynamics II. *Arch. Rat. Mech. Anal.*, 11, (1962), 210-43.

(Reçu le 1^{er} août 1966.)

University of Wisconsin
Madison, Wis.